

# راهنمای استفاده از کتاب

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه و کنکور گام‌های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید.

## فیلم آموزشی

گام  
اول

۱. هر فصل به تعدادی جلسه تقسیم شده است.
۲. برای استفاده از فیلم‌های آموزشی هر جلسه QR-Code‌های صفحه بعد را اسکن کنید.
۳. در هر جلسه مطالب کتاب درسی درس به درس تدریس شده است.
۴. تمرین‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی به صورت کامل تدریس شده است.

## درسنامه آموزشی

گام  
دوم

۱. هر فصل به تعدادی قسمت تقسیم شده است.
۲. در هر قسمت آموزش کاملی به همراه مثال و تست ارائه شده است.
۳. سطح تست‌ها عموماً کمی بالاتر از مثال‌ها است. اگر دانش آموز وقت کافی ندارد یا می‌خواهد فقط در سطح امتحانات مدرسه درس بخواند، می‌تواند بدون این که مطلبی را زدست دهد از تست‌ها عبور کند.

## پرسش‌های تشریحی

گام  
سوم

۱. هر فصل به تعدادی قسمت (دقیقاً منطبق بر قسمت‌بندی گام دوم) تقسیم شده است.
۲. سوالات از ساده به دشوار و موضوعی مرتب شده‌اند.
۳. سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند.

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

گام  
چهارم

۱. هر فصل به تعدادی قسمت (دقیقاً منطبق بر قسمت‌بندی گام دوم و سوم) تقسیم شده است.
۲. هر قسمت نیز دارای ریز‌طبقه‌بندی است.
۳. تست‌ها از ساده به دشوار و موضوعی مرتب شده‌اند.
۴. تمامی تست‌های کنکور داخل و خارج از کشور قابل استفاده و منطبق بر کتاب درسی جدید آورده شده است.
۵. اگر وقت کافی برای حل همه تست‌ها را ندارید، سوال‌های (★) و اگر دنبال تست‌های خفن تر و درصد ۱۰۰ هستی، سوال‌های (★★) را حتماً حل کنید.
۶. تست‌های دارای پاسخ تشریحی هستند.

به جای آنکه چندین کتاب بخوانید، کتاب‌های گاج را چندین بار بخوانید

# FILM

## فصل اول: آشنایی با نظریه اعداد

80 min	جلسه دهم: حل تمرین‌های کتاب درسی	37 min	جلسه اول: استدلال ریاضی
52 min	جلسه یازدهم: همنزه‌شی در اعداد صحیح (قسمت اول)	25 min	جلسه دوم: اثبات‌ها در نظر گرفتن همه حالت‌ها
42 min	جلسه دوازدهم: همنزه‌شی در اعداد صحیح (قسمت دوم)	24 min	جلسه سوم: اثبات‌های غیرمستقیم
37 min	جلسه سیزدهم: همنزه‌شی در اعداد صحیح (قسمت سوم)	40 min	جلسه چهارم: اثبات‌های بازگشتی - گزاره‌های هم‌ارز
14 min	جلسه چهاردهم: معادله همنزه‌شی	36 min	جلسه پنجم: حل تمرین‌های کتاب درسی
8 min	جلسه پانزدهم: حل معادلات سیاله و کاربردهای آن	85 min	جلسه ششم: بخش‌پذیری در اعداد صحیح
28 min	جلسه شانزدهم: تبدیل یک معادله سیاله به یک معادله همنزه‌شی	32 min	جلسه هفتم: بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک و...
84 min	جلسه هفدهم: حل تمرین‌های کتاب درسی	21 min	جلسه هشتم: قضیه تقسیم
		33 min	جلسه نهم: افزار مجموعه $\mathbb{Z}$ به کمک تقسیم

## فصل دوم: گراف و مدل‌سازی

82 min	جلسه بیست و یکم: مدل‌سازی با گراف (قسمت اول)	75 min	جلسه هجدهم: گراف (قسمت اول)
70 min	جلسه بیست و دوم: مدل‌سازی با گراف (قسمت دوم)	92 min	جلسه نوزدهم: گراف (قسمت دوم)
90 min	جلسه بیست و سوم: حل تمرین‌های کتاب درسی	68 min	جلسه بیستم: حل تمرین‌های کتاب درسی

## فصل سوم: ترکیبیات (شمارش)

42 min	جلسه بیست و نهم: حل تمرین‌های کتاب درسی (قسمت اول)	28 min	جلسه بیست و چهارم: یادآوری و تکمیل
54 min	جلسه سیام: حل تمرین‌های کتاب درسی (قسمت دوم)	86 min	جلسه بیست و پنجم: جایگشت‌های با تکرار
49 min	جلسه سی و یکم: اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول)	55 min	جلسه بیست و ششم: مربع لاتین
61 min	جلسه سی و دوم: اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم)	67 min	جلسه بیست و هفتم: دو مربع لاتین متعامد
71 min	جلسه سی و سوم: اصل لانه کبوتری		جلسه بیست و هشتم: یک روش برای ساختن دو مربع لاتین متعامد از مرتبه یک عدد فرد
72 min	جلسه سی و چهارم: حل تمرین‌های کتاب درسی	24 min	

# فهرست مطالب

امتحان	کنکور	آموزش
۱۸۵	۸۱	۱۰
۱۸۷	۸۳	۱۳
۱۸۸	۸۴	۲۰
۱۸۹	۸۶	۲۳
۱۹۰	۸۷	۲۶
۱۹۱	۹۰	۳۰
۱۹۲	۹۴	۳۶

## فصل اول: آشنایی با نظریه اعداد

قسمت اول: استدلال ریاضی

قسمت دوم: بخش‌پذیری در اعداد صحیح

قسمت سوم: بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک (بpm)

قسمت چهارم: قضیه تقسیم

قسمت پنجم: همنهشتی در اعداد صحیح. کلاس‌های ...

قسمت ششم: قوانین بخش‌پذیری. باقی‌مانده اعداد ...

قسمت هفتم: معادله همنهشتی. تقویم‌نگاری ...

## فصل دوم: گراف و مدل‌سازی

قسمت اول: مقدمات گراف. تعاریف اولیه. دنباله درجات

قسمت دوم: شمارش گراف‌ها

قسمت سوم: گراف کامل. مکمل گراف. گراف منتظم

قسمت چهارم: مسیر. دور. گراف همبند

قسمت پنجم: مدل‌سازی در گراف و احاطه‌گری

## فصل سوم: ترکیبیات (شمارش)

قسمت اول: جایگشت

قسمت دوم: توزیع  $n$  شیء یکسان

قسمت سوم: مربع لاتین

قسمت چهارم: اصل شمول و عدم شمول. تعداد توابع

قسمت پنجم: اصل لانه کبوتری

## قسمت دوم

## بخش پذیری در اعداد صحیح

## فصل

بخش پذیری

تقسیم، ابزاری است برای قرار دادن تعدادی شیء، در دسته‌های مساوی. چه بهتر که در دسته‌بندی ما باقی‌مانده‌ای وجود نداشته باشد.  $10 = 2 \times 5$  یعنی  $10$  شیء را می‌توان به  $5$  دسته دوتایی تقسیم کرد ( $10$  بر  $2$  بخش‌پذیر است). این تقسیم‌بندی را می‌توان به این شکل نگاه کرد که:  $10$  شیء را می‌توان در  $5$  دسته دوتایی شمرد، به بیان دیگر می‌گوییم عدد  $2$ ، عدد  $10$  را می‌شمارد.

$a = bq$

**تعريف** عدد صحیح  $a$  را بر عدد صحیح و ناصفر  $b$  بخش‌پذیر گوییم، هرگاه عددی صحیح مانند  $q$  چنان یافت شود که:

بخش‌پذیری  $a$  بر  $b$  را می‌توان به صورت  $b | a$  نشان داد و به یکی از صورت‌های زیر خواند:

(۱) عدد  $b$ ، عدد  $a$  را می‌شمارد (اعد می‌کند).

(۲) بر  $b$  بخش‌پذیر است (ا) مضرب  $b$  است یا  $b$  مقسوم‌علیه  $a$  است).

**تذکر** در تمام مباحث نظریه اعداد، با اعداد صحیح کار می‌کنیم و همواره منظور از عدد، عدد صحیح است.

**تذکر** اگر عدد  $b$ ، عدد  $a$  را عاد نکند (بر  $b$  بخش‌پذیر نباشد)، می‌نویسیم  $b \nmid a$ .

تست کدام گزینه صحیح نیست؟

$7 | 91$  (۴)

$14 | 72$  (۳)

$6 | 72$  (۲)

$7 | 42$  (۱)

**پاسخ:** بررسی گزینه‌ها:

$$1) 42 = 6 \times 7 \Rightarrow 7 | 42 \quad \checkmark$$

$$2) 72 = 6 \times 12 \Rightarrow 6 | 72 \quad \checkmark$$

۳) مقسوم‌علیه  $7$  نیست و این رابطه نادرست است

$$4) 91 = 7 \times 13 \Rightarrow 7 | 91 \quad \checkmark$$

پس جواب گزینه (۳) است.

 تست به ازای چند عدد طبیعی  $n$ ، داریم  $n - 2 | 6 - n$ ؟

$3$  (۴)

$4$  (۳)

$5$  (۲)

$6$  (۱)

**پاسخ:** برای آن که  $6 - n$ ، باید  $2 | 6 - n$  مقسوم‌علیه  $6$  باشد. یعنی:

+2	$n - 2$	-1	1	-2	2	-3	3	-6	6
	$n$	①	③	○	④	-1	⑤	-4	⑧

در نتیجه برای  $n$ ،  $5$  مقدار طبیعی  $\{1, 3, 4, 5, 8\}$  وجود دارد و جواب گزینه (۲) است.

 تست اگر  $ac = bd$  باشد، کدام گزینه درست است؟

$a | bd$  (۴)

$ac | b$  (۳)

$a | b$  (۲)

$a | c$  (۱)

**پاسخ:** در تساوی  $ac = bd$  اگر فرض کنیم  $c = q$ ، در این صورت داریم:

$bd = a \times q \Rightarrow a | bd$

پس جواب گزینه (۴) است. اما برای رد سایر گزینه‌ها تساوی  $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$  را در نظر بگیرید:

$$1) 2 | 3 \Rightarrow a | c \quad , \quad 2) 2 | 1 \Rightarrow a | b \quad , \quad 3) 6 | 1 \Rightarrow ac | b$$

$$\circ |a \Rightarrow a = 0$$

$$(\forall a \in \mathbb{Z}) : a | 0$$

$$\forall a \in \mathbb{Z} : a | a$$

$$\forall a \in \mathbb{Z} : \pm 1 | a$$

$$a | 1 \Rightarrow a = \pm 1 \quad \text{یا} \quad a | -1 \Rightarrow a = \pm 1$$

$$\circ | 0$$

**ویژگی (۱):** عدد صفر، هیچ عددی را نمی‌شمارد، جز خودش. به عبارت دیگر:

**توضیح:** هر عددی صفر را عاد می‌کند:

**ویژگی (۲):** هر عددی خودش را می‌شمارد. یعنی:

**ویژگی (۳):** اعداد ۱ و -۱ هر عددی را می‌شمارند. یعنی:

**ویژگی (۴):** اگر عددی ۱ یا -۱ را بشمارد، آن‌گاه آن عدد برابر با  $\pm 1$  است، یعنی:

**ویژگی (۵):**

$$\text{منحنی به معادله } y = \frac{-1}{5 - 2x} \text{ از چند نقطه با مختصات صحیح (طول و عرض صحیح) می‌گذرد؟}$$

۴) صفر

۱) ۳

۲) ۲

۳) ۱

**پاسخ:** برای این‌که  $y \in \mathbb{Z}$  باشد، باید  $y = \frac{-1}{5 - 2x} \in \mathbb{Z}$  باشد و به عبارت دیگر  $5 - 2x = \pm 1$  (برای آن‌که حاصل یک کسر عددی صحیح شود، باید صورت آن بر مخرجش بخش‌پذیر باشد). پس داریم:

$$5 - 2x = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} 5 - 2x = 1 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = -1 \\ 5 - 2x = -1 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 1 \end{cases}$$

پس این منحنی از دو نقطه (۱، ۳) و (۳، ۱) عبور می‌کند. پس جواب گزینه (۳) است.

$$a | b \Rightarrow \begin{cases} a | -b \\ -a | b \\ -a | -b \end{cases}$$

**ویژگی (۵):** هر یک از طرفین رابطه عاد کردن را می‌توان در یک منفی ضرب کرد. یعنی:

$$a | b \Rightarrow \begin{cases} a | b^m & (m \in \mathbb{N}) \\ a | mb & (m \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

**ویژگی (۶):** سمت راست رابطه عاد کردن را در هر عددی می‌توان ضرب کرد (یا به توان هر عدد طبیعی رساند). یعنی:

**تذکر:** عکس رابطه فوق لزوماً برقرار نیست. برای مثال:  $2 | 4 \times 3 \rightarrow 2 | 4 \rightarrow 2 | 3 \rightarrow 2 | 1$  اما  $2 | 4 \times 3 \rightarrow 4 | 2^3 \rightarrow 4 | 8 \rightarrow 2 | 8$  اثبات ۶:

$$a | b \Rightarrow b = aq \Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{\text{به توان}} b^m = a^m q^m = a \underbrace{(a^{m-1} q^m)}_{q'} \Rightarrow b^m = aq' \Rightarrow a | b^m \\ \xrightarrow{\text{ضرب در}} mb = maq = a \underbrace{(mq)}_{q'} \Rightarrow mb = aq' \Rightarrow a | mb \end{cases}$$

**ویژگی (۷):** طرفین رابطه عاد کردن را می‌توان در هر عدد صحیح ضرب کرد یا به هر توانی رساند و بالعکس، یعنی:

$$a | b \Leftrightarrow ma | mb \quad (m \in \mathbb{Z})$$

$$a | b \Leftrightarrow a^n | b^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

اثبات ۷:

$$a | b \Rightarrow b = aq \Rightarrow \begin{cases} b^n = a^n q^n \Rightarrow a^n | b^n \\ mb = maq \Rightarrow ma | mb \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} a | b \\ n \leq m \end{array} \right\} \Rightarrow a^n | b^m \quad \text{نتیجه ۱:}$$

$$2 | 6 \xrightarrow{3 > 2} 2 | 6^3$$

اثبات نتیجه ۱:

$$a | b \Rightarrow b = aq \xrightarrow{\text{طرفین به توان}} b^m = a^m q^m = a^n \underbrace{a^{m-n} q^m}_{q'} \Rightarrow a^n | b^m$$

$$\left. \begin{array}{l} a^n | b^m \\ n \geq m \end{array} \right\} \Rightarrow a | b \quad \text{نتیجه ۲:}$$

$$576 = 64 \times 9 \Rightarrow 4^3 | 24^3 \xrightarrow{3 > 2} 4 | 24 \quad \text{مثال:}$$

$$a^n | b^m \xrightarrow{s=n-m} a^{m+s} | b^m \xrightarrow{b^s} a^{m+s} | b^{m+s} \Rightarrow a | b$$

اثبات نتیجه ۲:

$$\left. \begin{array}{l} a^n | b^m \\ \frac{m}{n} \leq \frac{q}{p} \text{ یا } mp \leq nq \end{array} \right\} \Rightarrow a^p | b^q$$

اثبات نتیجه ۳:

$$\frac{12^5}{12^5 \times 2^5} | \frac{18^3}{18^3 \times 3^3} \Rightarrow \frac{12^3}{12^3 \times 3^3} | \frac{18^7}{18^7 \times 3^7} \quad (\frac{1}{5} < \frac{7}{3}) \quad (\text{چراکه مثال})$$

۱۵

$$mp \leq nq \Rightarrow 0 \leq nq - mp \xrightarrow{\text{می توان نوشت}} nq - mp = t \Rightarrow mp = nq - t \quad (t \geq 0)$$

$$a^n | b^m \xrightarrow{\text{به توان } p} a^{np} | b^{mp} \xrightarrow{\text{سمت راست ضرب در } b^t} a^{np} | b^{nq-t} \xrightarrow{\text{طبق فرض}} a^{np} | b^{nq} \Rightarrow a^p | b^q$$

نتیجه ۴:

$$m \geq n \Rightarrow a^m = a^n \times \underbrace{a^{m-n}}_q \Rightarrow a^n | a^m$$

اثبات نتیجه ۴:

**نیست** از رابطه  $a^p | b^q$  کدام رابطه را همواره می توان نتیجه گرفت؟

$$a^2 | b^3 \quad (4)$$

$$a^2 | b^2 \quad (2)$$

$$a^3 | b^2 \quad (1)$$

**پاسخ:** روش اول: طبق نتیجه ۳ در رابطه بالا زمانی می توان از رابطه  $a^p | b^q$  را نتیجه گرفت که  $mp \leq nq$  باشد. پس می توان نوشت:

$$\left. \begin{array}{l} a^5 | b^7 \\ 5 \times 3 \geq 7 \times 2 \end{array} \right\} \Rightarrow a^2 | b^3$$

پس جواب گزینه (4) است.  
روش دوم:

$$a^5 | b^7 \xrightarrow{\text{طرفین به توان } 14} a^1 | b^{14} \xrightarrow{\text{سمت راست را در } b \text{ ضرب می کنیم}} a^1 | b^{15}$$

پس می توانیم بگوییم  $(a^2)^5 | (b^3)^5$  و با توجه به ویژگی ۷ داریم:

**نیست** کدام نتیجه گیری در حالت کلی نادرست است؟

$$a^2 | b^2 \Rightarrow 2a | b \quad (4)$$

$$a | b \Rightarrow 2a | 4b \quad (3)$$

$$a^2 | b^2 \Rightarrow a | 2b \quad (2)$$

$$a^3 | b^2 \Rightarrow a | 3b \quad (1)$$

$$(1) \quad a^3 | b^3 \Rightarrow a | b \xrightarrow[\text{ضرب در } 3]{\text{سمت راست}} a | 3b \quad \checkmark$$

$$(2) \quad a^3 | b^2 \Rightarrow a | b \xrightarrow[\text{ضرب در } 2]{\text{سمت راست}} a | 2b \quad \checkmark$$

$$(3) \quad a | b \Rightarrow 2a | 2b \xrightarrow[\text{ضرب در } 2]{\text{سمت راست}} 2a | 4b \quad \checkmark$$

$$a=3, b=9 \Rightarrow \frac{3}{9} | \frac{9}{81} \xrightarrow{\text{اما}} \frac{2 \times 3}{6} | \frac{9}{81}$$

گزینه (4) نادرست است؛ برای رد آن مثال نقض ارائه می کنیم:  
پس جواب گزینه (4) است.

$$ab | c \Rightarrow \begin{cases} a | c \\ b | c \end{cases}$$

**ویژگی (۸):** سمت چپ رابطه عاد کردن را می توان با مقسوم علیه آن جایگزین کرد. به عبارت دیگر:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 | 4 \\ 4 | 4 \end{array} \right\} \Rightarrow 8 / 4$$

**تذکر:** عکس رابطه، لزوماً برقار نیست. برای مثال:  $\frac{2}{4} | \frac{4}{4}$

**ویژگی (۹):** طرفین رابطه عاد کردن را می توان در هم ضرب کرد. یعنی:

**تذکر:** این ویژگی در رابطه با جمع، تفریق و تقسیم لزوماً صدق نمی کند.

**ویژگی (۱۰) (بسیار مهم):** هرگاه عددی دو عدد را بشمارد، آن گاه مجموع و تفاضل و حاصل ضرب آن دو عدد را نیز می شمارد.

$$\left. \begin{array}{l} a | b \\ a | c \end{array} \right\} \Rightarrow a | b+c, a | b-c, a | b \times c$$

و به طور کلی هر ترکیب خطی آن دو عدد را می شمارد.

$$a | mb \pm nc \quad (m, n \in \mathbb{Z})$$

**نتیجه:** اگر  $a | b + na$  آن گاه  $a | b$

## نیست

از درستی رابطه  $z | xy$  کدام نتیجه را نمی‌توان گرفت؟

$y^4 | z^4$

$x^3 | z^4$

$y | z^2$

$x | z - x^4$

۱۶

## نیست

$$xy | z \Rightarrow \begin{cases} y | z & (\text{درستی گزینه ۲}) \\ x | z \xrightarrow{4 > 3} x^3 | z^4 & (\text{درستی گزینه ۳}) \end{cases}$$

از هم کم می‌کنیم

$$\begin{cases} x | z \\ x | x \xrightarrow{\text{سمت راست به توان ۴}} x | x^4 \end{cases} \xrightarrow{\text{درستی گزینه ۱}}$$

از هم کم می‌کنیم

$$\begin{array}{rcl} 9 \times 2 | 18 & \xrightarrow{\text{اما}} & 4 | 18 \\ x \quad y \quad z & & y^4 \end{array}$$

پاسخ: به جای سمت چپ رابطه می‌توانیم مقسوم‌علیه‌های آن را قرار دهیم:

از طرفی هم به کمک رابطه  $x | z$  و این‌که هر عددی خودش را می‌شمارد، داریم:

برای رد گزینه (۴)، مثال نقض زیر را ارائه می‌کنیم:

پس جواب گزینه (۴) است.

## (برگرفته از کتاب درسی)

به ازای چند عدد صحیح  $a$ ، عدد  $a$  دو عدد  $4m+3$  و  $5m+3$  را عاد می‌کند؟

۴ سه

دو

یک

صفر

$$a | 4m+3 \xrightarrow{\text{سمت راست ضرب در } 4} a | 20m+15 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{از هم کم می‌کنیم} \\ \text{سمت راست ضرب در } 5 \end{array} \right. \xrightarrow{a | 20m+16} a | -1 \Rightarrow a = \pm 1$$

پس دو مقدار صحیح برای  $a$  وجود دارد و جواب گزینه (۳) است.

توجه: در تمام مسائل به این سبک، هدف حذف متغیر از سمت راست رابطه عاد کردن است، به طوری‌که در سمت راست فقط عدد باقی بماند.

## نیست

چند عدد طبیعی مانند  $n$  وجود دارد، به طوری‌که حاصل کسر  $\frac{5n+17}{n-5}$  یک عدد طبیعی باشد؟

۴ بی‌شمار

دو

۷

۱۱

پاسخ: برای آن‌که  $\frac{5n+17}{n-5}$  عددی طبیعی باشد، باید:

اولاً: مثبت باشد، یعنی:

ثانیاً: مخرج، صورت کسر را بشمارد، یعنی  $5n+17 | 5n-5$ . پس داریم:

$$n-5 | 5n+17 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{از هم کم می‌کنیم} \\ \text{سمت راست ضرب در } 5 \end{array} \right. \xrightarrow{n-5 | 5n-25} n-5 | 42$$

پس از آن جایی‌که  $n-5 > 0$  است، باید  $n-5$  مقسوم‌علیه مثبت ۴۲ باشد، پس داریم:

+5	n-5	1	2	3	6	7	14	21	42
	n	6	7	8	11	12	19	26	47

پس برای ۸ مقدار طبیعی  $\{6, 7, 8, 11, 12, 19, 26, 47\}$ ، حاصل  $\frac{5n+17}{n-5}$  عددی طبیعی است؛ پس جواب گزینه (۳) است.نکته مهم: در حل مسائل به صورت  $x-a | f(x)$ ، کافی است رابطه  $x-a | f(a)$  را حل کنیم. (چرا که باقی‌مانده تقسیم  $f(x)$  بر  $x-a$  برابر است با  $f(a)$ )

## نیست

به ازای چند عدد صحیح  $n$ ، حاصل  $\frac{2n^3+3n+7}{n-1}$  یک عدد صحیح است؟

۱۶

دو

۸

۶

پاسخ: برای آن‌که حاصل  $\frac{2n^3+3n+7}{n-1}$  عددی صحیح باشد، باید مخرج کسر، صورت آن را بشمارد، یعنی  $7 | 2n^3+3n+7$ . ریشه عبارت  $f(n)$  سمت چپ را محاسبه کرده و در عبارت سمت راست قرار می‌دهیم:

$n-1=0 \Rightarrow n=1 \Rightarrow f(1)=2(1)^3+3(1)+7=12$

$\Rightarrow n-1|12 \Rightarrow n-1=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$

در نتیجه به ازای هر یک از این ۱۲ مقدار، عددی صحیح برای  $n$  به دست می‌آید. پس جواب گزینه (۳) است.

**تذکر** اگر ریشه عبارت سمت چپ (مقسوم‌علیه) عددی صحیح نشد، باز هم ریشه را در عبارت قرار می‌دهیم و عدد بهدست آمده را تا حد امکان ساده می‌کنیم. حال عبارت سمت چپ باید صورت این کسر را بشمارد.

**نیست** تعداد جواب‌های طبیعی معادله  $13 - 5x - y - 3xy = 0$  در اعداد طبیعی را بیابید.

$$3xy - y - 5x = 13 \Rightarrow y(3x - 1) = 5x + 13 \Rightarrow y = \frac{5x + 13}{3x - 1}$$

$$\frac{5x + 13}{3x - 1} > 0 \rightarrow 5x + 13 > 0 \rightarrow 3x - 1 > 0$$

حال برای آنکه  $y$  و  $x$  اعدادی طبیعی باشند، باید: اولاً  $y$  و  $x$  هر دو مثبت باشند؛ ثانیاً مخرج کسر، صورت آن را بشمارد، یعنی  $f(x) = 5x + 13 - 3x$ . حالا ریشه عبارت سمت چپ را در عبارت سمت راست قرار می‌دهیم:

$$3x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow f\left(\frac{1}{3}\right) = 5\left(\frac{1}{3}\right) + 13 = \frac{44}{3} \Rightarrow 3x - 1 = 44$$

$$3x - 1 = \begin{cases} 1 \Rightarrow x = \frac{2}{3} \notin \mathbb{N} & \times \\ 2 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 9 & \checkmark \\ 4 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \notin \mathbb{N} & \times \\ 11 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 3 & \checkmark \\ 22 \Rightarrow x = \frac{23}{3} \notin \mathbb{N} & \times \\ 44 \Rightarrow x = 15 \Rightarrow y = 2 & \checkmark \end{cases}$$

مقسوم‌علیه‌های مثبت ۴۴ برابر است با:

پس (۱۰۹)، (۴۰۳) و (۱۵۰۲) جواب‌های طبیعی هستند که برای  $(x, y)$  بهدست می‌آید. پس جواب گزینه (۴) است.

$$\left. \begin{array}{l} a | b \\ b | c \end{array} \right\} \Rightarrow a | c \quad (\text{خاصیت تعدی})$$

**ویژگی (۱۱):** اگر عدد  $a$ ، عدد  $b$  را بشمارد و  $b$  نیز  $c$  را بشمارد، آنگاه  $a, c$  را می‌شمارد. یعنی:

**اثبات (۱۱):**

$$a | b \Rightarrow b = aq \quad b | c \Rightarrow c = bq' \quad \text{را در عبارت پایینی جایگذاری می‌کنیم: } b = aq \rightarrow c = (aq)q' = aqq' \Rightarrow a | c$$

اگر  $a | 11$  و  $a | 780$ ، در این صورت برای  $a$ ، چند مقدار طبیعی وجود دارد؟

۸ (۴)

۲۴ (۳) ۲۴ (۳) صفر

$$\left. \begin{array}{l} 11 | a \\ a | 780 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{تعددی}} 11 | 780$$

اما این رابطه هرگز برقرار نیست، پس هیچ مقداری برای  $a$  وجود ندارد که هر دو رابطه برقرار باشد. پس جواب گزینه (۲) است.

**پاسخ:** با توجه به رابطه تعدی داریم:

**نیست** از درستی رابطه  $|a - b| \leq |a| + |b|$  کدام نتیجه‌گیری نادرست است؟

$$x - y | a - b \quad (۴)$$

$$x - y | a^3 - b^3 \quad (۳)$$

$$x + y | a^3 + b^3 \quad (۲)$$

$$x + y | a^3 - b^3 \quad (۱)$$

**پاسخ:** طبق اتحاد مزدوج داریم:

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x - y | x^3 - y^3 \quad (رابطه ۱) \\ x + y | x^3 - y^3 \quad (رابطه ۲) \end{array} \right.$$

حالا از رابطه  $|a - b| \leq |a| + |b|$  (فرض مسئله) و خاصیت تعدی در رابطه عاد کردن داریم:

$$\left. \begin{array}{l} x - y | x^3 - y^3 \\ x^3 - y^3 | a - b \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{تعددی}} x - y | a - b \quad (گزینه ۴) \quad \text{: رابطه ۱}$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y | x^3 - y^3 \\ x^3 - y^3 | a - b \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{تعددی}} x + y | a - b \quad \xrightarrow{\text{سمت راست ضرب در } (a^2 + ab + b^2)} x + y | a^3 - b^3 \quad (گزینه ۱) \quad \text{: رابطه ۲}$$

حالا به کمک رابطه گزینه (۴) داریم:

$$x - y | a - b \xrightarrow{\text{سمت راست ضرب در } (a + b)} x - y | a^3 - b^3 \quad (گزینه ۳)$$

$$5 = \frac{3}{x^3} - \frac{2}{y^3} \mid \frac{6}{a^3} - \frac{1}{b^3} = 5 \xrightarrow{\text{اما}} 5 = \frac{3}{x^3} + \frac{2}{y^3} \mid \frac{6}{a^3} + \frac{1}{b^3} = 217$$

اما برای رد گزینه (۲) داریم:

پس جواب گزینه (۲) است.

ویزگی (۱۲): اگر  $a \neq b$  باشد، در این صورت  $|a| \leq |b|$  (توجه داریم که  $b \neq 0$  است چرا که اگر  $b = 0$  باشد، همواره  $a | b$ )

**نتیجه** اگر  $a | b$  و آن‌گاه  $|a| = |b|$

**تذکر** در بخش پذیری لزوماً ویزگی تقارنی وجود ندارد. برای مثال  $2 | 4$  ولی  $4 | 2$

**نیست** به ازای چند عدد طبیعی  $n$ ، رابطه  $2 | 4n - 2 + 1 + n^2$  برقرار است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

$$\begin{aligned} n^2 + 1 | 4n - 2 &\Rightarrow n^2 + 1 \leq 4n - 2 \Rightarrow \underbrace{n^2 - 4n + 3}_{(n-1)(n-3)} \leq 0 \Rightarrow 1 \leq n \leq 3 \\ &\downarrow \\ \text{چون عبارت‌ها برای } n &= 1, 2, 3 \text{ در رابطه اصلی مقداری } 1 \text{ و } 3 \text{ قابل قبول می‌باشند و جواب گزینه (۳) است.} \\ \text{مشیت‌اند از قدر مطلق استفاده نمی‌کنیم.} \end{aligned}$$

**پاسخ:** طبق ویزگی شماره (۱۲) داریم:

هر عدد طبیعی و بزرگ‌تر از یک که هیچ شمارنده مثبتی به جز یک و خودش نداشته باشد، عدد اول نامیده می‌شود. مجموعه اعداد اول را با  $P$  نمایش می‌دهیم:

**تذکر** عددی که اول نباشد را مرکب می‌گوییم.

**تذکر** عدد ۱ نه اول است و نه مرکب.

**نکته** اگر  $p$  عددی اول باشد و  $p | a$  آن‌گاه  $a = p$  یا  $a | p$  باشد.

**نیست** اگر عدد طبیعی  $a$  دو عدد  $5k+4$  و  $7k+3$  را عاد کند، آن‌گاه  $a$  کدام است؟

۱۳ (۴)

۹ (۳)

۱۱ (۲)

۳ (۱)

$$\begin{aligned} a | 7k + 3 &\xrightarrow{\text{سمت راست ضرب در } 5} a | 35k + 15 \\ a | 5k + 4 &\xrightarrow{\text{سمت راست ضرب در } 7} a | 35k + 28 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{از هم کم می‌کنیم} \\ \hline a | 13 \end{array} \right.$$

چون ۱۳ عددی اول است و  $a$  عددی طبیعی پس  $a = 13$  یا  $a = 1$  است. و در نتیجه جواب گزینه (۴) است.

**نکته** اگر تجزیه عدد طبیعی  $n$  به عوامل اول به صورت  $n = P_1^{\alpha_1} P_2^{\alpha_2} \cdots P_k^{\alpha_k}$  باشد، آن‌گاه تعداد مقسوم‌علیه‌های طبیعی آن برابر است با:

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

**نتیجه** تعداد مقسوم‌علیه‌های صحیح  $n$  برابر است با:  $2(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$

**نیست** تعداد مقسوم‌علیه‌های طبیعی  $2700$  کدام است؟

۶۳ (۴)

۵۴ (۳)

۲۷ (۲)

۲۶ (۱)

$$2700 = (2+1)(3+1)(2+1) = 36$$

**پاسخ:** تجزیه  $2700$  برابر  $2^3 \times 3^3 \times 5^2$  می‌باشد، پس و جواب گزینه (۱) است.

**بخش پذیری و اتحادها**

در بخش پذیری عبارات جبری، اتحادها نقش زیادی دارند. دو تا از آن‌ها را که کاربردهای بیشتری دارند، یادآوری می‌کنیم:

(آ) اتحاد مزدوج

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \Rightarrow \begin{cases} a-b | a^2 - b^2 \\ a+b | a^2 - b^2 \end{cases}$$

(ب) اتحاد چاق و لاغر

$$(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3 \Rightarrow a-b | a^3 - b^3$$

$$(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3 \Rightarrow a+b | a^3 + b^3$$

**نیست** کدام نتیجه‌گیری لزوماً برقرار نیست؟

$$c | a-b \Rightarrow c^2 | (a^2 - b^2)^2$$

$$c | a+b \Rightarrow c | a^2 - b^2$$

**پاسخ:** درستی هر یک از گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.

$$\begin{aligned} c | a-b &\xrightarrow{\text{تعدد}} c | a^2 - b^2 \\ \left. \begin{array}{l} c | a+b \\ a-b | a^2 - b^2 \end{array} \right\} &\xrightarrow{\text{به توان ۲ می‌رسانیم.}} c^2 | (a^2 - b^2)^2 \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} c | a+b \\ a+b | a^3 + b^3 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{تعددی}} c | a^3 + b^3 \quad \checkmark \\ \left. \begin{array}{l} c | a+b \\ a+b | a^3 - b^3 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{تعددی}} c | a^3 - b^3 \end{array}$$

(۲) گزینه:  $c | a+b$   
(۳) گزینه:  $a+b | a^3 + b^3$

$$4 | \underbrace{5+3}_{8} \xrightarrow{\text{اما}} 4 | \underbrace{5^3 - 3^3}_{98}$$

برای رد گزینه (۴) فرض کنیم  $a = 5$ ,  $b = 3$ ,  $c = 4$  باشد:

پس جواب گزینه (۴) است.

۱۹

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$$

$$a^m - b^m | a^n - b^n$$

در کتاب حسابان تعمیم‌های اتحاد چاق و لاغر آمده است:

(۵) برای هر عدد طبیعی  $n$  داریم:

پس می‌توان گفت:  $\forall n \in \mathbb{N}, a-b | a^n - b^n$   
**نتیجه** اگر  $\frac{n}{m}$  عددی طبیعی باشد، آنگاه:

عدد  $2^{14} - 3^{21}$  بر کدام عدد بخش پذیر است؟

۲۵ (۴)

۲۱ (۳)

۱۷ (۲)

۲۳ (۱)

$$3^{21} - 2^{14} = (3^3)^7 - (2^2)^7 = 27^7 - 4^7 \Rightarrow \underbrace{27 - 4}_{23} | 27^7 - 4^7$$

**پاسخ:** ابتدا توان‌های اعداد داده شده را یکسان می‌کنیم.

پس  $3^{21} - 2^{14}$  بر کدام عدد بخش پذیر است؟

$$a^n - b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots - b^{n-1})$$

$$a^m + b^m | a^n + b^n$$

(۶) اگر  $n$  عددی زوج باشد آنگاه:

پس می‌توان گفت:  $n = 2k$ ,  $a+b | a^n + b^n$   
**نتیجه** اگر  $\frac{n}{m}$  عددی زوج باشد آنگاه:

عدد  $2^{36} - 3^{36}$  بر کدامیک از اعداد زیر بخش پذیر نیست؟

۱۹ (۴)

۶۵ (۳)

۳۵ (۲)

۴۲ (۱)

**پاسخ:** با توجه به نتایج تعمیم اتحادهای چاق و لاغر داریم:

$$\frac{36}{3} = 12 \xrightarrow{\text{زوج است.}} \left\{ \begin{array}{l} 3^3 - 2^3 | (3^3)^{12} - (2^3)^{12} \Rightarrow 19 | 3^{36} - 2^{36} \\ 3^3 + 2^3 | (3^3)^{12} - (2^3)^{12} \Rightarrow 35 | 3^{36} - 2^{36} \end{array} \right.$$

$$\frac{36}{4} = 9 \xrightarrow{\text{فرد است.}} 3^4 - 2^4 | (3^4)^9 - (2^4)^9 \Rightarrow 65 | 3^{36} - 2^{36}$$

پس جواب گزینه (۱) است.

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$$

(۷) اگر  $n$  عددی فرد باشد آنگاه:

پس می‌توان گفت:  $n = 2k+1$ ;  $a+b | a^n + b^n$

**نتیجه** اگر  $\frac{n}{m}$  عددی فرد باشد آنگاه:

نتیجه

به ازای چند عدد  $n$  کوچک‌تر از  $5^0$ , رابطه  $1 | 5^n + 1 | 5^0 + 1 | 126$  برقرار است؟

۸ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)

$$5^3 + 1 | 5^n + 1 \Rightarrow \frac{n}{3} = 2k+1 \Rightarrow n = 6k+3 \Rightarrow 1 \leq 6k+3 \leq 50 \Rightarrow 0 \leq k \leq 7$$

**پاسخ:** با توجه به این‌که  $5^3 + 1 = 126$  است برای آن‌که رابطه  $1 | 5^n + 1 | 5^0 + 1 | 126$  درست باشد، باید  $\frac{n}{3}$  عددی فرد باشد. پس می‌توان نوشت:

به ازای هر مقدار صحیح  $k$ , یک مقدار برای  $n$  به دست می‌آید یعنی  $8$  مقدار صحیح کوچک‌تر از  $5^0$  داریم که  $1 | 5^n + 1 | 126$ . پس جواب گزینه (۴) است.

- .۲۴ در اثبات نامساوی  $x^3 + y^3 + z^3 \geq xy - xz + yz$  به کدام عبارت بدینه زیر می‌رسیم؟
- $$(x+y-z)^3 \geq 0 \quad (x-y)^3 + (x+z)^3 + (z-y)^3 \geq 0 \quad (1)$$
- $$(x-y)^3 + (x-z)^3 + (y+z)^3 \geq 0 \quad (x+y)^3 + (x-z)^3 + (y-z)^3 \geq 0 \quad (3)$$

## قسمت دوم: بخش‌پذیری در اعداد صحیح

## بخش‌پذیری در اعداد صحیح

- .۲۵ به ازای چند عدد طبیعی  $n$  داریم  $? 2n+2 | 4$
- ۱) ۴      ۲) ۳      ۳) ۲      ۴) ۱
- .۲۶ اگر  $a \in \mathbb{Z}$  باشد، آن‌گاه بزرگ‌ترین عدد طبیعی که  $a^5 + a^4 - a^3 - a^2$  را می‌شمارد، کدام است؟
- ۲۴) ۴      ۱۲) ۳      ۴) ۲      ۳) ۱
- .۲۷ اگر  $x | y^3$  و  $x | z^3$ ، کدام گزینه در حالت کلی نادرست است؟
- $x^4 | y^3 z^3$  (۴)       $x^3 | z^4$  (۳)       $x | z^2$  (۲)       $x^2 | yz^2$  (۱)
- .۲۸ اگر  $5 | a + 3b$ ، در این صورت عبارت  $a^2 + 9b^2 + 3ab$  بر کدام گزینه بخش‌پذیر است؟
- ۳۰) ۴      ۲۵) ۳      ۲۰) ۲      ۱۵) ۱
- .۲۹ به ازای چند عدد طبیعی  $n$  داریم  $? 0 | 2n^3 - 3n^2 - 2n$
- ۴) صفر      ۱) ۳      ۲) ۲      ۳) ۱
- .۳۰ به ازای کدام مقادیر  $n$ ، رابطه  $2n^3 - n - 1 | 0$  برقرار است؟
- $\mathbb{Z}$  (۴)       $\{1, \pm \frac{1}{2}\}$  (۳)       $\{0, 1\}$  (۲)       $\{1\}$  (۱)
- .۳۱ به ازای چند عدد صحیح  $n$  داریم  $? 2n^2 + n - 2 | 1$
- ۴) ۴      ۳) ۳      ۲) ۲      ۱) ۱
- .۳۲ اگر  $a | a - b$ ، آن‌گاه داریم:
- $a - b | b$  (۴)       $a | b$  (۳)       $b | a - b$  (۲)       $a | a - b$  (۱)
- .۳۳ به ازای چند عدد طبیعی و دو رقمی  $a$  رابطه  $17 | 4a - 3$  برقرار است؟
- ۸) ۴      ۷) ۳      ۶) ۲      ۵) ۱
- .۳۴ تعداد اعداد صحیح و مثبت که هر دو عدد  $2 - 3a^2 + 8a$  و  $2 - 3a^2 + 8a - 2$  را بشمارد، کدام است؟
- ۸) ۴      ۴) ۳      ۲) ۲      ۱) ۱
- .۳۵ کدام گزینه درست است؟
- $a + b | (a+b)^3 - 3a^2b - 3ab^2$  (۱)       $a + b | (a+b)^3 - 2ab$  (۱)
- $a + b | (a-b)^3 + 2ab$  (۴)       $a + b | (a-b)^3 + 3a^2b - 3ab^2$  (۳)
- .۳۶ اگر  $a$  و  $b$  اعداد صحیح فرد باشند، آن‌گاه کدام گزینه درست است؟
- $8 | a^2b^2$  (۴)       $4 | a^4 - b^2$  (۳)       $6 | a^3 + b^3 + 4$  (۲)       $8 | a^3 + b^3$  (۱)
- .۳۷ اگر  $a^3 | b^3$  حداقل مقدار طبیعی  $n$  که  $a^{7n-3} | b^{4n+3}$  کدام است؟
- ۸) ۴      ۷) ۳      ۶) ۲      ۵) ۱
- .۳۸ کدام گزینه همواره صحیح نیست؟
- $ab^3 | c \Rightarrow a | c, b | c$  (۲)       $a - b | a \Rightarrow a - b | b^3$  (۱)
- $a | bc \Rightarrow a | b, a | c$  (۴)       $a^2 | b \Rightarrow a^3 | b^5$  (۳)

.۳۹★ براي چند عدد طبیعی  $n$  رابطه  $2n^2 - 3n + 3 \mid 2n^2 - 3n + 1$  برقرار است؟

۱) (۴)

۲) (۳)

۴) (۲)

۱) صفر

.۴۰★ چند نقطه با مختصات صحیح و طول طبیعی در معادله  $3x^2 - 2xy + 3y - 8x + 3 = 0$  صدق می‌کنند؟

۶) (۴)

۴) (۳)

۳) (۲)

۲) (۱)

.۴۱★ اگر رابطه  $\left(\frac{n}{2}\right)^n \mid n^2 - 2n$  کدام است؟

۱۵) (۴)

۱۱) (۳)

۷) (۲)

۳) (۱)

## اعداد اول

۸۴

(برگرفته از کتاب درسن)  
اگر  $a > 1$  و  $a | \Delta k + 3$  و  $a | 4k + 3$ ، در این صورت  $a$  بر چند عدد اول بخش‌پذیر است؟

۳) (۴)

۲) (۳)

۱) (۲)

۱) صفر

.۴۳★ اگر  $p$  یک عدد اول و  $p | 30! + p$  برای  $p$  چند مقدار متمایز وجود دارد؟

۱۲) (۴)

۱۰) (۳)

۷) (۲)

۵) (۱)

.۴۴★ عدد  $A = 18^x \times 12^{x+1}$  دارای ۷۲ مقسوم‌علیه مثبت است.  $x$  کدام است؟

۲) (۴)

۳) (۳)

۴) (۲)

۵) (۱)

.۴۵★ تفاضل تعداد مقسوم‌علیه‌های طبیعی دو عدد طبیعی  $N = 2^\alpha \times 3^\beta$  و  $M = 2^\alpha \times 3^\beta \times 5^\gamma$  مساوی ۱۴ است. کمترین مقدار  $N$  کدام است؟ (سراسری پافن)

۴۳۲) (۴)

۲۸۸) (۳)

۲۱۶) (۲)

۱۴۴) (۱)

## اتحادها و عاد کردن

فصل اول (اشتباه با انتزاع اعداد) | پایان تست

.۴۶★ اگر  $a - c$  و  $b + c$   $| a^3 - c^3$  آن‌گاه کدام نتیجه‌گیری درست است؟

a | c (۴)

b | c (۳)

c | a (۲)

c | b (۱)

.۴۷★ اگر روابط  $a^3 + b^3 \mid (x-3)(x-2)$  و  $a^2 - b^2 \mid (x-2)(x-1)$  برقرار باشند، حاصل  $a+b$  کدام است؟

±۱) (۴)

±۲) (۳)

±۳) (۲)

±۴) (۱)

.۴۸★ تعداد عضوهای مجموعه  $\{n : 65 \mid 2^n + 1\}$  در مجموعه اعداد طبیعی کمتر از ۱۰۰ کدام است؟

۹) (۴)

۸) (۳)

۷) (۲)

۶) (۱)

.۴۹★ عدد  $3^{21} - 2^{35}$  بر کدام یک از اعداد زیر بخش‌پذیر است؟

۷) (۴)

۵) (۳)

۳) (۲)

۲) (۱)

.۵۰★ عدد  $3^{92} + 5^{69}$  بر کدام عدد بخش‌پذیر است؟

۴۴) (۴)

۸) (۳)

۲۰۶) (۲)

۱۹۸) (۱)

.۵۱★ عدد  $7^{200} - 1$  بر کدام یک از اعداد زیر بخش‌پذیر است؟

۱۸) (۴)

۲۱) (۳)

۱۴) (۲)

۱۲) (۱)

## قسمت سوم: بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک (بم م) -

## کوچک‌ترین ضرب مشترک (ککم)

۳۵۰ ب

.۵۲★ بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک سه عدد ۹۰۰، ۹۶۰ و ۱۶۸۰ کدام است؟

۶۰) (۴)

۱۲۰) (۳)

۱۵۰) (۲)

۹۰) (۱)

(مشابه سراسری فارج از کشتو) ب م دو عبارت  $9n + 2$  و  $11n - 5$  کدام است؟

۴۵) (۴)

۴۵) (۳)

۶۷) (۲)

۱) (۱)

(سراسری فارج از کشتو) به ازای چند عدد طبیعی  $n$ ، هر دو عدد  $5 + 7n$  و  $2 + 11n$  مقسوم‌علیه مشترک برابر ۳ دارند؟

۴) بی شمار عدد

۳) دو عدد

۲) یک عدد

۱) هیچ عدد

- .۵۵ براى عدد صحیح  $a$ ، بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک  $a - 2$  و  $5a - 4$  کدام است؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳  
 ۳) ۲ ۴) ۳
- .۵۶ اگر عدد طبیعی  $n$  مضرب ۷ نباشد، بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک  $n^2 + 9n + 21$  و  $7n + 5$  کدام است؟  
 ۱) ۱ و ۳ ۲) ۱ و ۵ ۳) ۱ و ۷

## اعداد متباین

- .۵۷ اگر به ازای برخی از اعداد طبیعی  $n$ ، دو عدد  $12n + 2$  و  $5n - 4$  نسبت به هم اول باشند، آن‌گاه بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک این دو عدد، کدام است؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳ ۳) ۱ یا ۵ ۴) ۱ یا ۷  
 (سراسری فارج از کشیده) (۸۸)
- .۵۸ به ازای چند عدد طبیعی و دو رقیقی  $n$ ، اعداد  $25n + 4$  و  $11n + 9$  نسبت به هم اولند؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳ ۳) ۱ یا ۵ ۴) ۱ یا ۷  
 (سراسری فارج از کشیده) (۹۹)
- .۵۹ در مجموعه اعداد طبیعی اگر  $d = d(n^2 - 2n + 6, 3n + 5)$  و  $1 \neq d \neq n$  باشد، عدد  $d$  کدام است؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳ ۳) ۱ یا ۵ ۴) ۱ یا ۷  
 (سراسری فارج از کشیده) (۸۷)
- .۶۰ به ازای اعداد طبیعی  $1 \leq n \leq 5$  در چند حالت دو عدد  $4n + 7$  و  $5n + 9$  نسبت به هم اولند؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳ ۳) ۱ یا ۵ ۴) ۱ یا ۷  
 (سراسری فارج از کشیده) (۸۵)
- .۶۱ به ازای هر عدد طبیعی  $n \leq m$  دو عدد  $7n - 4$  و  $n + 9$  نسبت به هم اولند. بیش‌ترین مقدار  $m$  کدام است؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳ ۳) ۱ یا ۵ ۴) ۱ یا ۷  
 (سراسری فارج از کشیده) (۸۵)
- .۶۲ به ازای هر عدد طبیعی  $n \leq n$ ، دو عدد  $7n - 3$  و  $11n + 2$  نسبت به هم اولند. بیش‌ترین مقدار  $n$  کدام است؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳ ۳) ۱ یا ۵ ۴) ۱ یا ۷  
 (سراسری فارج از کشیده) (۸۵)
- .۶۳ اگر  $n$  عدد طبیعی و دو عدد  $5 - 9n$  و  $9n + 4$  دارای مقسوم‌علیه مشترک غیر ۱ باشند، تعداد اعداد دو رقیقی  $n$  کدام است؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳ ۳) ۱ یا ۵ ۴) ۱ یا ۷  
 (برگرفته از کتاب درسی)

- .۶۴ چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟  
 ۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳  
 $(a+4, a+5) = 1$   
 $(4a+2, 4a+4) = 2$   
 $(4a+2, 4a+6) = 3$   
 $(3a+2, 3a+4) = 4$
- .۶۵ اگر  $a$  عددی تک‌رقیقی و طبیعی و  $1 = (a, 18)$  باشد، بزرگ‌ترین مقدار ممکن برای  $a$  کدام است؟  
 ۱) ۱ یا ۲ ۲) ۱ یا ۳ ۳) ۱ یا ۵ ۴) ۱ یا ۷  
 (سراسری فارج از کشیده) (۸۵)
- .۶۶ اگر دو عدد  $a$  و  $90$  نسبت به هم اول باشند، بزرگ‌ترین عددی که همواره  $-1 = a^4 - A$  را می‌شمارد، کدام است؟  
 ۱) ۲۴۰ ۲) ۲۸۸ ۳) ۳۲۴ ۴) ۴۸۰
- .۶۷ اگر  $4^n - 16^n$  بر  $23^{10}$  بخش پذیر باشد، کم‌ترین مقدار  $n$  کدام است؟  
 ۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷
- .۶۸ اگر اعداد صحیح  $b$  و  $a$  چنان باشند که  $280 = (a^2, b^2) + (6a, 6b) = (a, b)^2$ ، آن‌گاه  $(a, b)$  کدام است؟  
 ۱) ۱۶ ۲) ۲۲ ۳) ۲۸ ۴) ۱۴
- .۶۹ اگر  $(a^5, 243b^5) = (a^5, 243b^5) = (a, 3b)^5$  باشد، آن‌گاه  $(a, 3b)$  کدام است؟  
 ۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۶ ۴) ۳
- .۷۰ اگر  $(a^2, b^2) = (-a, b) + 12$  باشد، آن‌گاه  $(a^2, b^2) = (-a, b) + 12$  کدام است؟  
 ۱) ۱۲ ۲) ۲۷ ۳) ۴۸ ۴) ۷۲
- .۷۱ اگر  $((a, b), a - b) | b^3 - a^3 + 4$  کدام می‌تواند باشد؟  
 ۱) ۹ ۲) ۲۵ ۳) ۲۵ ۴) ۳۳

## کم و ویژگی‌های آن

- .۷۲ اگر  $[a, b] = 2^3 \times 5^2 \times 7$  باشد، چند عدد چهار رقیقی داریم که  
 ۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

## معادله سیاله

**۲۳۰.** به ازای کدام مقدار  $n$  معادله سیاله  $1 - 60x + 84y = 5n$  در مجموعه  $\mathbb{Z}$  دارای جواب است؟

۳۵ (۴)

۲۳ (۳)

۲۹ (۲)

۲۴ (۱)

**۲۳۱.** معادله  $a + 8x + 12y = a$  در مجموعه  $\mathbb{Z}$  جواب دارد؟

۱۸ (۴)

۱۶ (۳)

۹ (۲)

۶ (۱)

**۲۳۲.** به ازای کدام عدد طبیعی  $n$ ، معادله خطی  $1 + 24x + 39y = 2n + 1$  در مجموعه  $\mathbb{Z}$  جواب دارد؟

۴۱ (۴)

۳۷ (۳)

۲۳ (۲)

۲۹ (۱)

**۲۳۳.** اگر معادله سیاله  $1 = ax + 6y$  فاقد جواب باشد، کدام معادله زیر قطعاً جواب دارد؟

 $(6a + 1)x + 6y = 1$  (۴) $(3a + 1)x + 6y = 1$  (۳) $(2a + 1)x + 6y = 1$  (۲) $(a + 1)x + 6y = 1$  (۱)

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

**۲۳۴.** معادله  $1 = n + 7x + (5n + k)y$  به ازای تمام مقادیر طبیعی  $n$ ، در مجموعه اعداد صحیح دارای جواب است.  $k$  کدام می‌تواند باشد؟

کدام می‌تواند باشد؟ (۱)

## حل معادله سیاله

**۲۳۵.** معادله سیاله خطی  $105x + 14y = 1050$  در مجموعه اعداد طبیعی چند جواب دارد؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

**۲۳۶.** معادله سیاله خطی  $7x + 5y = 130$  در مجموعه اعداد طبیعی چند جواب دارد؟

۲ (۴)

۳ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

**۲۳۷.** معادله سیاله  $90 = 11x + 23y$  چند جواب صحیح با شرط  $|y| < 50$  دارد؟

۷ (۴)

۸ (۳)

۹ (۲)

۱۰ (۱)

**۲۳۸.** معادله سیاله  $28 = 7x + 21y$  چند جواب صحیح در بازه  $(-20, 20)$  دارد؟

۹ (۴)

۱۱ (۳)

۱۲ (۲)

۱۵ (۱)

**۲۳۹.** اعداد صحیح  $a$  و  $b$  در معادله  $15a + 23b = 12$  صدق می‌کند. باقی‌مانده تقسیم عدد  $b$  بر  $15$  کدام است؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۶ (۲)

۳ (۱)

**۲۴۰.** مجموع ارقام کوچک‌ترین عدد طبیعی سه رقمی  $x$  که در معادله  $57x - 87y = 342$  صدق کند، کدام است؟

۸ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

۵ (۱)

**۲۴۱.** معادله سیاله  $725 = 9x + 13y$  در مجموعه اعداد طبیعی چند دسته جواب دارد؟

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

**۲۴۲.** معادله  $8 = 4x - 5y$  چند دسته جواب طبیعی دارد، که مجموع هر دسته جواب از  $30$  بیشتر نباشد؟

۴ (۴)

۲ (۳)

۲ (۲)

۵ (۱)

**۲۴۳.** اگر  $(221, 357) = 221x + 357y$  باشد، تعداد اعداد طبیعی  $x$  که در معادله  $221x + 357y = 221, 357$  دارد؟

۷ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

**۲۴۴.** اگر  $(357, 629) = 357x + 629y = 357, 629$ ، آن‌گاه کوچک‌ترین عدد مثبت  $y$  که در معادله  $357x + 629y = 357, 629$  دارد، چند دسته جواب دارد؟

۱۳ (۴)

۱۲ (۳)

۱۱ (۲)

۱۰ (۱)

**۲۴۵.** معادله سیاله  $1110 = 25x + 12y$  بر روی مجموعه اعداد طبیعی  $\mathbb{N}$  چند زوج جواب دارد؟

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

**۲۴۶.** برای خرید کتاب به قیمت  $7500$  تومان به تعداد  $A$  بن دویست تومانی و  $B$  بن یکصد و پنجاه تومانی پرداخت نموده‌ایم. حداقل  $A + B$  کدام است؟

(۸۴) سراسری

۳۸ (۴)

۳۷ (۳)

۳۶ (۲)

۳۵ (۱)

**۲۴۷.** قیمت هر واحد از دو نوع کالای متمایز به ترتیب  $220$  و  $140$  تومان، به چند طریق می‌توان از این دو نوع کالا خریداری کرد؟

(۹۸) سراسری

۱۳ (۴)

۱۲ (۳)

۱۱ (۲)

۱۰ (۱)

**۲۴۸.** به چند طریق می‌توان با  $3700$  ریال تمبرهای  $150$  و  $250$  ریالی خرید؟

(۹۱) سراسری

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

**۲۴۹.** کم‌ترین تعداد تمبر لازم برای بسته‌ای که نیاز به  $850$  ریال تمبر دارد با تمبرهای  $90$  و  $50$  ریالی کدام است؟

۱۴ (۴)

۱۳ (۳)

۱۲ (۲)

۱۱ (۱)

۲۸

از آن جایی که  $a + 3b \mid a + 2b$  پس داریم:

$$\begin{aligned} a + 3b &= 5q \xrightarrow{\text{توان ۲}} a^2 + 9b^2 + 6ab = 25q^2 \\ &\xrightarrow{+25ab} a^2 + 9b^2 + 6ab + 25ab = 25q^2 + 25ab \\ \Rightarrow a^2 + 31ab + 9b^2 &= 25(q^2 + ab) \end{aligned}$$

پس  $a^2 + 9b^2 + 31ab$  مضرب ۲۵ است.

**نکته:** اگر  $f(n) = 0$  آن‌گاه:

$$\begin{aligned} 0 &= 2n^3 - 3n^2 - 2n \Rightarrow 2n^3 - 3n^2 - 2n = 0 \Rightarrow n(2n^2 - 3n - 2) = 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} n = 0 \notin \mathbb{N} \times \\ 2n^2 - 3n - 2 = 0 \xrightarrow{\Delta=25} \begin{cases} n = \frac{3+5}{4} = 2 \in \mathbb{N} \checkmark \\ n = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{N} \times \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

پس فقط یک عدد طبیعی برای  $n$  داریم.

**نکته:** هر عددی صفر را می‌شمارد:

می‌دانیم برای هر مقدار صحیح  $a$  رابطه  $\mid a$  برقرار است. پس  $n$  هر مقدار صحیحی می‌تواند باشد.

۳۰

**نکته:** اگر  $\mid a$  آن‌گاه  $a = \pm 1$

می‌دانیم اگر  $\mid f(n)$  آن‌گاه  $f(n) = \pm 1$  است. پس داریم:

$$\begin{aligned} 2n^2 + n - 2 &= 1 \Rightarrow 2n^2 + n - 3 = 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} n = 1 \checkmark \\ n = \frac{c}{a} = \frac{-3}{2} \notin \mathbb{Z} \times \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2n^2 + n - 2 &= -1 \Rightarrow 2n^2 + n - 1 = 0 \\ \Rightarrow (2n - 1)(n + 1) &= 0 \Rightarrow \begin{cases} n = -1 \checkmark \\ n = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z} \times \end{cases} \end{aligned}$$

پس دو مقدار صحیح برای  $n$  داریم.

**نکته:** اگر  $a \mid b$  و  $a \mid c$  آن‌گاه برای هر داریم  $a \mid mb + nc$  هر ترکیب خطی  $b$  و  $c$  را عاد می‌کند. و به طور ویژه  $a \mid b - c$  و  $a \mid b + c$  را عاد می‌کند، به عبارت دیگر برای هر عدد صحیح  $a$  داریم

$$\begin{aligned} a - b \mid a - b &\quad \text{از هم کم می‌کنیم} \\ a - b \mid a &\quad \text{از طرفی} \\ \Rightarrow a - b \mid -b &\Rightarrow a - b \mid b \\ (\text{برای رد سایر گزینه‌ها، } a = 3 \text{ و } b = 2 \text{ را در نظر بگیرید}) \end{aligned}$$

۲۵

**تعريف:** عدد صحیح  $a$  بر عدد صحیح و ناصل  $b$  بخش‌پذیر گوییم،

هرگاه عددی صحیح مانند  $q$  چنان یافت شود که  $a = bq$

\* می‌توانیم بنویسیم  $b \mid a$  و بخوانیم  $b$  را عاد می‌کند.

\* مضرب  $b$  است ( $b$  مقسوم‌علیه  $a$  است).

برای آن که  $4 \mid 2n + 2$  باید  $2n + 2$  مقسوم‌علیه ۴ باشد، یعنی:

-۲	۲n	-۱	۱	-۲	۲	-۴	۴
-۲	n	-۳	-۱	-۴	۰	-۶	۲
-۲		-۳	$\frac{-1}{2}$	-۲	۰	-۳	۱

یک مقدار طبیعی برای  $n$  وجود دارد.

۲۶

**نکته:** ۱- حاصل ضرب هر دو عدد متوالی مضرب ۲ است.

۲- حاصل ضرب هر سه عدد متوالی مضرب ۶ است.

۳- حاصل ضرب هر  $n$  عدد متوالی مضرب  $n!$  است.

با تجزیه عبارت داده شده در سؤال داریم:

$$a^5 + a^4 - a^3 - a^2 = a^4(a+1) - a^3(a+1) = (a+1)(a^4 - a^3)$$

$$a^4(a+1) - a^3(a+1)$$

$$= (a+1) a^3 (a^2 - 1) \\ axa (a+1)(a-1)$$

اما عبارت داده شده را می‌توان به صورت زیر نیز بازنویسی کرد:

$$a(a+1) \times (a-1)a(a+1)$$

حاصل ضرب سه عدد  
متوالی مضرب ۶ است.

در نتیجه عبارت داده شده مضرب ۱۲ است.

۲۷

**نکته:** برخی ویژگی‌های مهم عاد کردن:

$$1) a \mid b \Rightarrow \begin{cases} a \mid b^m \\ a \mid mb \end{cases}$$

$$2) a \mid b \Leftrightarrow a^n \mid b^n$$

$$3) \forall n \geq m \Rightarrow a^m \mid a^n$$

$$4) \begin{cases} a \mid b \\ b \mid c \end{cases} \Rightarrow a \mid c \quad (\text{خاصیت تعدی})$$

به کمک ویژگی تعدی در رابطه عاد کردن به بررسی گزینه‌ها می‌پردازیم:

$$\left. \begin{array}{l} x \mid y^2 \xrightarrow{\text{توان ۲}} x^2 \mid y^4 \\ y^3 \mid z^2 \xrightarrow{\text{xy}} y^4 \mid yz^2 \end{array} \right\} \text{تعدی} \rightarrow x^2 \mid yz^2 \quad (\text{درستی گزینه ۱})$$

$$\left. \begin{array}{l} x \mid y^2 \xrightarrow{\text{سمت راست ضرب در } y} x \mid y^3 \\ y^3 \mid z^2 \end{array} \right\} \text{تعدی} \rightarrow x \mid z^3 \quad (\text{درستی گزینه ۲})$$

$$\left. \begin{array}{l} x \mid y^2 \xrightarrow{\text{توان ۳}} x^3 \mid y^6 \\ y^3 \mid z^2 \xrightarrow{\text{توان ۲}} y^6 \mid z^4 \end{array} \right\} \text{تعدی} \rightarrow x^3 \mid z^4 \quad (\text{درستی گزینه ۳})$$

پس گزینه (۴) نادرست است.

$$x = 16, y = 4, z = 8$$

مثال نقط گزینه‌ها:

(نهایی - فرداد ۸۷)

$$d) \text{ اگر } a \text{ و } b \text{ دو عدد حقیقی مثبت باشند، ثابت کنید } \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} \geq \frac{4}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

(نهایی - دی ۹۰)

$$z) \text{ اگر } x \text{ و } y \text{ دو عدد حقیقی مثبت باشند، درستی رابطه } x^4 + y^4 \geq x^3y + xy^3 \text{ را ثابت کنید.}$$

r) اگر  $a$  و  $b$  اعداد حقیقی و مثبت باشند، نامساوی  $a^3 + b^3 \geq ab(a + b)$  را اثبات کنید.

$$z) \text{ با فرض اینکه } a \text{ و } b \text{ دو عدد حقیقی غیرصفر و هم علامت هستند، حکم } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b} \text{ را اثبات کنید.}$$

$$s) \text{ اگر } a \text{ و } b \text{ دو عدد حقیقی مثبت باشند، حکم } a^5 + b^5 > a^3b + b^3a \text{ را ثابت کنید.}$$

۱۸۷

## قسمت دوم: بخش پذیری در اعداد صحیح

جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

b) اگر عددی ۱ یا  $-1$  را بشمارد آن‌گاه آن عدد برابر ..... است.

آ) اعداد ..... و ..... هر عددی را می‌شمارند.

t) برای  $n$  های ..... ، رابطه  $a^n - b^n | a + b$  برقرار است.پ) اگر  $|a| = 1$  آن‌گاه ..... است.ث) اگر  $p$  عددی اول باشد و  $p | a$  آن‌گاه ..... یا .....

۲۱

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

آ) فقط به ازای اعداد مثبت  $1 | n^3 + 1$ 

ب) تنها عددی که دقیقاً دو مقسوم‌علیه دارد ۱ می‌باشد.

پ) اگر  $2 | a + b$  آن‌گاه .....ت) اگر  $a + b | a$  آن‌گاه .....ثابت کنید اگر  $b | a$  آن‌گاه ..... ۲۳

۲۲

ثابت کنید اگر عدد  $a$  عدد  $b$  را بشمارد و عدد  $c$  نیز عدد  $a$  را بشمارد، آن‌گاه عدد  $a$  عدد  $c$  را می‌شمارد.

موارد زیر را ثابت کنید.

$$\forall m, n \in \mathbb{N}; m \leq n \Rightarrow a^m | a^n \quad (\bar{a} \\ (k \neq 0), (k \in \mathbb{Z}), a | b \Leftrightarrow ka | kb)$$

موارد زیر را اثبات کنید.

$$a | b \Rightarrow a | b^n \quad (\bar{a} \\ (b \neq 0), a | b \Rightarrow |a| \leq |b| \\ a | b, b | a \Rightarrow a = \pm b)$$

۲۶

ثابت کنید هرگاه عددی، دو عدد را بشمارد، آن‌گاه مجموع و تفاضل آن دو عدد را نیز می‌شمارد.

موارد زیر را ثابت کنید.

$$a | b \Rightarrow a | b^n \quad (\bar{a} \\ a | b, c | d \Rightarrow ac | bd \\ a | b, a | c \Rightarrow a | mb \pm nc)$$

۲۷

موارد زیر را در صورت امکان اثبات کنید و یا با ارائه مثال نقض آن‌ها را رد کنید.

آ) هر دو عدد صحیح و متواالی نسبت به هم اول‌اند.

$$a | b, c | d \Rightarrow a + c | b + d$$

$$(a \neq b), a, b \in P \Rightarrow (a, b) = 1$$

ت) هر دو عدد صحیح و فرد متواالی نسبت به هم اول‌اند.

$$(m, n \in \mathbb{N}, a, b \in \mathbb{Z}) m \leq n, a | b \Rightarrow a^m | b^n$$

۲۸

۲۹

- .۳۰ اگر  $a$  عددی صحیح و مخالف صفر و اعداد  $6n+11$  و  $5n+6$  بر  $a$  بخش پذیر باشند، ثابت کنید  $a = \pm 1$  است.
- .۳۱ اگر  $1 < a < 5$  و  $a | 7k+8$  و  $a | 3k+5$  ثابت کنید  $a$  عددی اول است.
- .۳۲ عدد طبیعی  $a$ ، دو عدد  $4n^3 + 12n^2 + 3n + 2$  را می‌شمارد. مقدار  $a$  را به دست آورید.
- .۳۳ اگر  $3 | c+b+7$  و  $c | a+b+7$  باقی‌مانده تقسیم  $17ab - 17$  بر  $c$  چقدر است؟
- .۳۴ اگر  $a$  و  $b$  دو عدد صحیح باشند و  $3a - 8b | 11a + 9b$  آن‌گاه  $23 | 11a + 9b$  را ثابت کنید.
- .۳۵ اگر  $4 | 3k+9$  به طوری‌که  $k$  عددی صحیح باشد،  $20 - 3k^2 - 81 | 9k^2$  را ثابت کنید.
- .۳۶ به ازای چند عدد طبیعی  $n$ ، رابطه  $n+3 | 8n+9$  برقرار است؟

### قسمت سوم: بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک (بمم) – کوچک‌ترین مضرب مشترک (کم)

- .۳۷ جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.
- (آ)  $\text{بم} = \text{دو عدد } 48 \text{ و } 84 \text{ برابر .....}$  است.
- (ب) اگر  $p$  عددی اول باشد و  $p/a$  و  $a \in \mathbb{Z}$  آن‌گاه  $\text{بم} = p$  و  $a$  برابر ..... است.
- (پ)  $\text{کم} = \text{دو عدد } 18 \text{ و } 32 \text{ برابر .....}$  است.
- (ت) اگر  $a$  و  $b$  نسبت به هم اول باشند، در این صورت  $\text{کم} = a$  برابر ..... است.
- .۳۸ درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.
- (آ) اگر  $a | b$  آن‌گاه  $(a, b) = a$  و  $b = (a, b)$
- (ب) اگر  $a$  عددی زوج باشد  $2 | (a, a+2)$
- (پ) اگر  $a$  عددی فرد باشد  $1 = (a-1, a+1)$
- .۳۹ اگر  $a$  و  $b$  دو عدد صحیح و  $(a^3, b^2) = 280$  باشد، آن‌گاه حاصل  $(a, b)$  را به دست آورید.
- .۴۰ اگر  $a$  و  $b$  اعداد مثبت باشند، بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک دو عدد  $a$  و  $b$  را به دست آورید.
- .۴۱ اگر  $d = (5a+4, 2a+3)$  آن‌گاه مقادیر ممکن برای  $d$  را به دست آورید.
- .۴۲ به ازای چند عدد طبیعی و دو رقمی  $n$ ، اعداد  $25n+4$  و  $11n+9$  نسبت به هم اول‌اند؟
- .۴۳ اگر  $d = (8a+6, 6a-4)$  آن‌گاه  $d$  دارای چند مقدار متمایز است؟
- .۴۴ اگر  $a$  عددی صحیح و  $p$  عددی اول و  $p | a$  ثابت کنید  $1 = (p, a)$
- .۴۵ با استفاده از تعاریف  $\text{بم}$  و  $\text{کم}$  موارد زیر را ثابت کنید.
- (آ)  $a | b \Rightarrow (a \cdot b) = | a |$
- (ب)  $a | b \Rightarrow [a, b] = | b |$
- .۴۶ اگر  $b | a$  آن‌گاه حاصل عبارت  $((a^3, b^2), (a^2, b^3))$  را به دست آورید.
- .۴۷ حاصل عبارت  $[(a^3, a), (a, b)]$  را به دست آورید.
- .۴۸ حاصل عبارت  $((a, (a, b)) - (a, [a, b]))$  را به دست آورید.
- .۴۹ حاصل هر یک از موارد زیر را به دست آورید.
- (آ)  $(4a+2, 4a+3)$
- (ب)  $[(a^5, a^9), a^6]$
- (پ)  $((3^0 b^7, 3^1 b), b^8)$
- (ت)  $(([b^3, b], b^4), b^5)$

$$a|b \xrightarrow{a|mb} a|(-1)b \Rightarrow a|-b$$

$$-a|a, a|b \xrightarrow{\text{تعددی}} -a|b$$

$$a|b \Rightarrow (-1)a|(-1)b \Rightarrow -a|-b$$

۲۳

$$a|b \wedge b|c \Rightarrow a|c$$

$$a|b \Rightarrow b = aq \quad (\text{۱})$$

$$b|c \Rightarrow c = bq' \quad (\text{۲})$$

$$\xrightarrow{(\text{۱}), (\text{۲})} c = aqq' \xrightarrow{qq'=q''} c = aq'' \Rightarrow a|c$$

۲۴

اثبات رابطه مقابل به صورت زیر است:

$$a^n = a^m \times a^{n-m} \Rightarrow a^n = a^m \times q$$

$$\Rightarrow a^m | a^n \quad (m, n \in \mathbb{N}, m \leq n)$$

$$\begin{cases} a|b \Rightarrow b = aq \xrightarrow{\text{ک}} kb = kaq \Rightarrow ka|kb \\ ka|kb \Rightarrow kb = kaq \xrightarrow{\text{ک}} b = aq \Rightarrow a|b \end{cases} \quad (\text{۳})$$

۲۵

$$\left. \begin{array}{l} a|b \\ b|b^n \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{تعددی}} a|b^n$$

$$a|b \Rightarrow a = bq, b \neq 0 \Rightarrow q \neq 0 \xrightarrow{q \in \mathbb{Z} - \{0\}} 1 \leq |q|$$

$$\xrightarrow{\text{طرفین را در } |a| \text{ ضرب می کنیم}} |a| \times 1 \leq |a| |q|$$

$$\Rightarrow |a| \leq |aq| \xrightarrow{b=aq} |a| \leq |b|$$

$$\begin{cases} a|b \Rightarrow |a| \leq |b| \\ b|a \Rightarrow |b| \leq |a| \end{cases} \Rightarrow |a| = |b| \Rightarrow a = \pm b$$

۲۶

$$a|b \wedge a|c \Rightarrow a|b \pm c$$

اثبات رابطه فوق به صورت زیر است:

$$\begin{cases} a|b \Rightarrow b = a \times q \\ a|c \Rightarrow c = a \times q' \end{cases} \Rightarrow b \pm c = a(q \pm q')$$

$$\Rightarrow b \pm c = aq'' \Rightarrow a|b \pm c$$

۲۷

$$a|b \Rightarrow b = aq \Rightarrow b^n = a^n q^n$$

$$\xrightarrow{q^n=q'} b^n = a^n q' \Rightarrow a^n | b^n$$

$$\begin{cases} a|b \Rightarrow b = aq \\ c|d \Rightarrow d = cq' \end{cases} \Rightarrow b \times d = (a \times c)(q \times q')$$

$$\Rightarrow b \times d = a \times c \times q'' \Rightarrow ac|bd$$

$$\begin{cases} a|b \Rightarrow a|mb \\ a|c \Rightarrow a|nc \end{cases} \xrightarrow{a|b \wedge a|c \Rightarrow a|b \pm c} a|mb \pm nc$$

۲۸

(آ) درست. اثبات: اگر  $a + 1$  اعداد صحیح متولی باشند، آنگاه:

$$(a, a+1) = d \Rightarrow \begin{cases} d|a \\ d|a+1 \end{cases} \xrightarrow{-} d|(a+1)-a$$

$$\Rightarrow d|1 \xrightarrow{d>1} d=1$$

$$2|2, 2|4 \rightarrow 2+2|2+4$$

(ب) نادرست. مثال نقض:

$$\frac{a}{b^\gamma} + \frac{b}{a^\gamma} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \Leftrightarrow \frac{a^\gamma + b^\gamma}{a^\gamma b^\gamma} \geq \frac{a+b}{ab}$$

$$\Leftrightarrow a^\gamma + b^\gamma \geq ab(a+b) \Leftrightarrow a^\gamma + b^\gamma - a^\gamma b - ab^\gamma \geq 0$$

$$\Leftrightarrow a^\gamma (a-b) - b^\gamma (a-b) \geq 0 \Leftrightarrow (a-b)(a^\gamma - b^\gamma) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a-b)(a+b) \geq 0 \Leftrightarrow (a-b)^2(a+b) \geq 0$$

بنابراین نامساوی فوق بدیهی است.  $a, b \in \mathbb{R}^+$ 

$$\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} \geq \frac{4}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{b} + \sqrt{a}}{\sqrt{a} \sqrt{b}} \geq \frac{4}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \geq 4\sqrt{ab} \Leftrightarrow a + 2\sqrt{ab} + b \geq 4\sqrt{ab}$$

$$\Leftrightarrow a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \Leftrightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است})$$

$$x^\gamma + y^\gamma \geq x^\gamma y + xy^\gamma \Leftrightarrow x^\gamma + y^\gamma - x^\gamma y - xy^\gamma \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^\gamma (x-y) - y^\gamma (x-y) \geq 0 \Leftrightarrow (x^\gamma - y^\gamma)(x-y) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x-y)(x^\gamma + xy + y^\gamma)(x-y) \geq 0 \Leftrightarrow (x-y)^\gamma (x^\gamma + xy + y^\gamma) \geq 0$$

با توجه به این که  $x$  و  $y$  دو عدد حقیقی و مشت هستند، نامساوی فوق بدیهی است.

$$a^\gamma + b^\gamma \geq ab(a+b) \Leftrightarrow (a+b)(a^\gamma - ab + b^\gamma) \geq ab(a+b)$$

$$\xrightarrow{a+b>0} a^\gamma - ab + b^\gamma \geq ab \Leftrightarrow a^\gamma - 2ab + b^\gamma \geq 0$$

همواره درست

$$(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4 \Leftrightarrow 1 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1 \geq 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{a^\gamma + b^\gamma}{ab} \geq 2 \xrightarrow{ab>0} a^\gamma + b^\gamma \geq 2ab$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^\gamma \geq 0$$

چون به یک رابطه بدیهی رسیدیم می توان گفت حکم برقرار است.

$$a^\alpha + b^\alpha > a^\beta b + b^\beta a \Leftrightarrow a^\alpha + b^\alpha - a^\beta b - b^\beta a > 0 \quad (\text{س})$$

$$\Leftrightarrow a^\alpha (a-b) - b^\beta (a-b) > 0 \Leftrightarrow (a-b)(a^\alpha - b^\beta) > 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a^\alpha - b^\beta)(a^\beta + b^\beta) > 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a-b)(a+b)(a^\beta + b^\beta) > 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^\gamma (a+b)(a^\beta + b^\beta) > 0$$

سمت چپ نامساوی همواره درست است پس چون به یک رابطه بدیهی رسیدیم می توان گفت حکم برقرار است.

(ب)

(ب)

(آ)

|a|=p, |a|=1

طبیعی زوج

(ت)

۲۱

(ب)

(آ)

(ب)

(آ) نادرست (برای هر عدد حقیقی  $a$  پس برای هر  $n \in \mathbb{R}$   $(n^3 + 1) \mid 0$ )(ب) نادرست (هر عدد صحیحی مانند  $a$ ، بر اعداد صحیح ۱ و -۱ و خود عد  $a$  بخش پذیر است. پس برای آن که عدد  $a$  فقط دو مقسوم علیه داشته باشد، باید  $a = \pm 1$ (ب) درست (۲،  $a+b$  زوج است. پس هر دوی  $a$  و  $b$  یازوج هستند یا هر دو فرد. پس  $a-b$  زوج است).

$$\begin{cases} a+b|a \\ a+b|a+b \end{cases} \xrightarrow{-} a+b|b$$

(ت) درست

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	سوالات امتحان درس: ریاضیات گسسته
آزمون شماره (۱)	امتحان خرداد ۹۸		سال دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	سوالات	نمره
۱	ثابت کنید میانگین حسابی دو عدد نامنفی از میانگین هندسی آنها کمتر نیست.	۱
۲	در جاهای خالی عبارت ریاضی مناسب قرار دهید. آ) یک گراف کامل ۸ رأسی، ..... یال دارد. ب) در یک گراف از مرتبه $10 = 3 \Delta$ حداقل ..... رأس برای احاطه همه رؤوس لازم است. پ) اگر در گراف $G$ از مرتبه $p$ داشته باشیم $= 1$ در این صورت $\Delta(G)$ برابر ..... است. ت) مجموع درایه‌های سطر اول یک مربع لاتین ۵ در ۵ برابر با ..... است.	۲
۳	اگر باقی‌مانده تقسیم $m$ و $n$ بر ۱۳ به ترتیب اعداد ۲ و ۹ باشد، در این صورت باقی‌مانده تقسیم عدد $3m - 5n$ بر ۱۳ را به دست آورید.	۱/۵
۴	اگر در یک سال، شنبه روز اول مهر باشد، در این صورت با استفاده از همنهشتی تعیین کنید ۱۲ بهمن، در همان سال چه روزی از هفته است؟	۱
۵	با تبدیل معادله سیاله خطی $18 = 2y + 5x$ به معادله همنهشتی و حل آن، جواب‌های عمومی این معادله را بیابید.	۱/۵
۶	شکل مقابل نمودار گراف $G$ می‌باشد. آ) مرتبه و اندازه گراف $G$ را بنویسید. ب) مجموعه $N_G(b)$ را بنویسید. پ) مجموع درجه‌های رأس‌های گراف $\bar{G}$ را مشخص کنید.	۱/۵
۷	گراف $C_7$ را در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید. آ) یک مجموعه احاطه‌گر ۴ عضوی بنویسید. پ) دو مجموعه احاطه‌گر مینیمم متمایز بنویسید.	۱/۵
۸	آ) ثابت کنید هر مجموعه احاطه‌گر دلخواه غیرمینیمال را می‌توان با حذف برخی از رؤوسش به یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال تبدیل کرد? ب) در گراف رویه رو یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال ۵ عضوی را مشخص کنید.	۱/۵
۹	آ) یک گراف ۶ رأسی با عدد احاطه‌گری ۲ رسم کنید که یک مجموعه احاطه‌گر <u>یکتا</u> با اندازه ۲ داشته باشد. ب) یک گراف ۶ رأسی با عدد احاطه‌گری ۲ رسم کنید که بیش از یک مجموعه احاطه‌گر با اندازه ۲ داشته باشد.	۱
۱۰	با ارقام ۵، ۴، ۵، ۱، ۱۰، ۲، ۲۰، ۳۰، ۲۰، ۳۰، ۲۰، ۴۰، ۵۰، ۹۰ چند عدد ۹ رقمی می‌توان نوشت؟	۱
۱۱	۶ دانش‌آموز پایه دوازدهم و ۵ دانش‌آموز پایه یازدهم به چند طریق می‌توانند کنار هم در یک ردیف قرار گیرند، به طوری که: آ) به صورت یک در میان قرار بگیرند. پ) یک دانش‌آموز خاص یازدهم و یک دانش‌آموز خاص دوازدهم در کنار هم باشند.	۱/۵
۱۲	تعداد جواب‌های صحیح و نامنفی معادله $10 = x_5 + \dots + x_2 + x_1 + x_0$ با شرط $x_i > 0$ را محاسبه کنید.	۱
۱۳	اگر سه دوست هم سایز، سه کت و سه پیراهن داشته باشند و بخواهند در سه روز اول هفته از این لباس‌ها به گونه‌ای استفاده کنند که هر فرد هر یک از کت‌ها و هر یک از پیراهن‌ها را دقیقاً یک بار استفاده کرده باشد و هر کت با هر پیراهن نیز دقیقاً یک بار مورد استفاده قرار بگیرد، چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند؟	۱/۵
۱۴	در بین اعداد ۱ تا ۹۰ چند عدد وجود دارد که بر ۲ یا ۳ بخش‌پذیر باشند.	۱/۲۵
۱۵	ثابت کنید اگر در یک دبیرستان حداقل ۵۰ دانش‌آموز مشغول به تحصیل باشند، لاقل ۷ نفر از آنها روز هفته و ماه تولدشان یکسان است.	۱/۲۵
	جمع نمره	۲۰

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	سوالات امتحان درس: ریاضیات گسسته
آزمون شماره (۲)	امتحان شهریور ۹۸		سال دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	سوالات	نمره
۱	درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید. آ) مجموع هر دو عدد فرد، عددی زوج است.	۰/۵
۲	جاهای خالی را پُر کنید. آ) $a c, b c \Rightarrow m > 0$ ..... ب) گراف $G$ را ..... می‌نامیم هرگاه بین هر دو رأس آن حداقل یک مسیر وجود داشته باشد. پ) مقدار $(C_n)^7$ به ازای هر عدد طبیعی $n$ برابر است با: ..... ت) هرگاه $(kn+1)$ کبوتر با بیشتر در ..... لانه قرار بگیرند، در این صورت لانه‌ای وجود دارد که حداقل ..... کبوتر در آن قرار گرفته است.	۱/۵
۳	برای هر سه عدد حقیقی $x, y$ و $z$ ثابت کنید:	۱/۵
۴	اگر باقی‌مانده تقسیم $a$ بر دو عدد ۶ و ۵ به ترتیب ۳ و ۲ باشد، باقی‌مانده تقسیم عدد $a$ را بر ۳۰ بیابید.	۱/۵
۵	باقی‌مانده تقسیم $19^7$ (۲۷) را بر ۱۳ بیابید.	۱/۵
۶	با تبدیل معادله سیاله خطی $29000x + 5000y = 20000$ به معادله همنهشتی و حل آن، جواب‌های عمومی این معادله را بیابید.	۱/۵
۷	گراف $G$ با مجموعه رأس‌های $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ و مجموعه یال‌های زیر را در نظر بگیرید: $E = \{ab, bc, cd, ed, ae, cf, ef\}$ آ) نمودار گراف رارسم کنید.      ب) $[b]_G$ را مشخص کنید.      پ) یک مسیر به طول ۵ از $b$ به $d$ بنویسید.	۲
۸	یک گراف ۵ رأسی غیرتنهای $k$ -منتظم رسم کنید، به طوری که: آ) $k$ بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد.	۱
۹	آ) گراف $P_8$ رارسم کنید. ب) یک ۷-مجموعه از آن را مشخص کنید. پ) یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال ۴ عضوی از آن را مشخص نمایید.	۱/۵
۱۰	در گراف شکل مقابل یک مجموعه احاطه‌گر غیرمینیمال انتخاب کنید؛ سپس با حذف برخی از رأس‌ها، آن را به یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال تبدیل نمایید.	۱
۱۱	۴ کتاب فیزیک متفاوت و ۵ کتاب ریاضی متفاوت را می‌توانیم به چند طریق در قفسه‌ای و در یک ردیف بچینیم به طوری که: آ) همواره کتاب‌های فیزیک کنار هم باشند. پ) هیچ دو کتاب ریاضی کنار هم نباشند.	۱/۵
۱۲	تعداد جواب‌های صحیح و نامنفی معادله $12 = 6x_1 + x_2 + \dots + x_5$ با شرط $x_1 > 2$ را محاسبه کنید.	۱
۱۳	قرار است چهار مدرس $T_1, T_2, T_3, T_4$ در چهار جلسه متوالی در چهار کلاس $C_1, C_2, C_3, C_4$ به گونه‌ای تدریس کنند که هر مدرس در هر کلاس دقیقاً یک جلسه تدریس کند، برای این منظور برنامه‌ریزی نمایید.	۱
۱۴	چند عدد طبیعی مانند $n$ به طوری که $1 \leq n \leq 350$ و وجود دارد که بر هیچ یک از اعداد ۴ و ۶ بخش‌پذیر نباشد؟	۱/۵
۱۵	۱۳ نقطه درون یک مستطیل $8 \times 6$ قرار دارند؛ نشان دهید که حداقل ۲ نقطه از این ۱۳ نقطه وجود دارند که فاصله آن‌ها از هم کمتر از $\sqrt{8}$ باشد.	۱/۵
	جمع نمره	۲۰



مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	سوالات امتحان درس: ریاضیات گسسته
آزمون شماره (۳)	امتحان خرداد ۹۹		سال دوازدهم دوره دوم متوسطه

۲۴۰

ردیف	سوالات	نمره
۱	گزاره درست را اثبات کنید و برای گزاره نادرست، مثال نقض ارائه دهید. آ) مجموع هر دو عدد گنگ، عددی گنگ است. ب) اگر از مربع عددی فرد یک واحد کم کنیم، حاصل همواره بر ۸ بخش‌پذیر است.	۱/۷۵
۲	اگر باقی‌مانده تقسیم عدد $a$ بر ۴ برابر ۳ باشد، در این صورت باقی‌مانده تقسیم عدد $3+2a$ بر ۸ را به دست آورید.	۱/۲۵
۳	اگر $n \in \mathbb{N}$ ، $n   7k+6$ ، $n   9k+7$ ، ثابت کنید $1 = n = 5$ یا	۱
۴	باقی‌مانده تقسیم $7^3$ بر ۱۵ را به دست آورید.	۱/۵
۵	معادله همنهشتی $\frac{11}{5x} = 2$ را حل کرده و جواب عمومی آن را بنویسید.	۱/۲۵
۶	جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. آ) مجموع درجه‌های رأس‌های هر گراف ..... تعداد یال‌ها است. ب) در یک گراف $k$ -منتظم، ماکزیمم درجه رأس برابر با ..... است. پ) در بین تمام مجموعه‌های احاطه‌گر گراف $G$ ، مجموعه یا مجموعه‌های احاطه‌گری که کمترین تعداد عضو را دارند، مجموعه احاطه‌گر گراف $G$ می‌نامیم. ت) یک مجموعه احاطه‌گر را که با حذف هر یک از رأس‌هایش، دیگر احاطه‌گر نباشد، احاطه‌گر ..... می‌نامیم.	۱
۷	گراف $G$ را در نظر گرفته و به سوالات زیر پاسخ دهید. آ) $N_G[a]$ را با اعضا مشخص کنید. ب) یک دور به طول ۴ در این گراف مشخص کنید. پ) یک مسیر به طول ۳ و یک مسیر به طول ۴ از $a$ به $c$ بنویسید.	۱/۲۵
۸	در گراف $G$ ، درجه رأس ۷ برابر ۹ است و درجه رأس ۷ در گراف $\bar{G}$ برابر با ۱۲ است. مرتبه گراف $G$ را مشخص کنید.	۰/۷۵
۹	گرافی ۶ رأسی با عدد احاطه‌گری ۲ رسم کنید، به طوری که: آ) مجموعه احاطه‌گر یکتا با اندازه ۲ داشته باشد. ب) بیش از یک مجموعه احاطه‌گر با اندازه ۲ داشته باشد.	۱
۱۰	عدد احاطه‌گری گراف مقابل را مشخص و ادعای خود را ثابت کنید.	۱/۲۵
۱۱	با ارقام عدد ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۱، ۰، ۲، ۰، ۳، ۰، ۴ چند عدد ۷ رقمی می‌توان نوشت؟	۰/۷۵
۱۲	به چند طریق می‌توان از بین ۵ نوع گل، ۱۱ شاخه گل انتخاب کرد، اگر بخواهیم، از گل نوع دوم حداقل ۲ شاخه و از گل نوع پنجم بیش از ۳ شاخه انتخاب کنیم.	۱/۲۵
۱۳	مربع لاتین مقابل را در نظر بگیرید و با اعمال یک جایگشت بر روی ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۲، ۰، ۳، ۰، ۴ یک مربع لاتین جدید به دست آورید.	۱

۲	۱	۴	۳
۴	۳	۲	۱
۳	۴	۱	۲
۱	۲	۳	۴

رشته: ریاضی و فیزیک		راهنمای تصحیح سوالات امتحان درس: ریاضیات گسسته
آزمون شماره (۳)	امتحان خرداد ۹۹	سال دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	راهنمای تصحیح	ردیف																
نمره																		
۱	$\sqrt{2}, -\sqrt{2} \in Q^C$ (۰/۲۵) , $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \notin Q^C$ (۰/۲۵) $(4k+1)^2 - 1 = \underbrace{4k^2}_{(۰/۲۵)} + \underbrace{4k+1}_{(۰/۲۵)} - 1 = \underbrace{4k(k+1)}_{(۰/۲۵)} = \underbrace{4 \times 2q}_{(۰/۲۵)} = \lambda q$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵) نادرست (۰/۲۵) درست																
۲	$a = 4q + 3$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 2a + 3 = \underbrace{\lambda q + 9}_{(۰/۲۵)} = \underbrace{\lambda(q+1)+1}_{(۰/۲۵)} = \lambda q' + 1$ (۰/۲۵) $\Rightarrow r = 1$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)																
۳	$n \mid 9k+7 (x(-7))$ (۰/۲۵) $\Rightarrow n \mid -63k - 49 + 63k + 54$ (۰/۲۵) $\Rightarrow n \mid 5$ (۰/۲۵) $\xrightarrow{n \in \mathbb{N}}$ $n = 1$ یا $5$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)																
۴	$\gamma^2 = 49 \equiv 4$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \gamma^4 \equiv 16 \equiv 1$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \gamma^{28} \equiv 1$ (۰/۲۵) $\xrightarrow{\times \gamma^2 \equiv 4}$ $\gamma^{30} \equiv 4$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)																
۵	$2 \equiv 35$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 5x \equiv 35$ (۰/۲۵) $\xrightarrow{(5, 11)=1}$ $x \equiv 7$ (۰/۲۵) $\Rightarrow x = 11k + 7$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)																
۶	(۰/۲۵) k (۰/۲۵) دو برابر (۰/۲۵) مینیمم	(۰/۲۵) پ																
۷	$a, b, e, d, a$ : (۰/۲۵) دور به طول ۴ $a, d, e, b, c$ : (۰/۲۵) مسیر به طول ۳ و مسیر به طول ۴	(۰/۲۵) $N_G[a] = \{a, b, e, d\}$ (۰/۲۵) $\gamma(G) = 3$																
۸	$\deg_G(v) + \deg_{\bar{G}}(v) = p - 1$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 9 + 12 = p - 1$ (۰/۲۵) $\Rightarrow p = 22$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)																
۹	<p>ا) گراف روبرو از مرتبه ۶ و دارای تنها یک مجموعه احاطه‌گر یکتا <math>\{a, b\}</math> است.</p>  <p>رسم گراف (۰/۲۵)</p> <p>ب) گراف مقابله دارای سه مجموعه احاطه‌گری به اندازه ۲ است که عبارتند از <math>\{a, d\}</math>, <math>\{f, c\}</math>, <math>\{e, b\}</math>.</p>  <p>رسم گراف (۰/۲۵)</p>	(۰/۲۵)																
۱۰	<p>برای گراف مورد سوال داریم <math>\{g, h, d\}</math>. از طرفی مجموعه <math>\{g, h, d\}</math> یک مجموعه احاطه‌گر برای گراف است (۰/۲۵). لذا <math>\gamma(G) \leq 3</math> (۰/۲۵).</p> <p>بنابراین <math>\gamma(G) = 3</math> (۰/۲۵).</p>	(۰/۲۵)																
۱۱	$\frac{7!}{2! \times 3!} = 420$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)																
۱۲	$x_1 + \dots + x_5 = 11$ , $x_2 \geq 2$ , $x_5 \geq 4$ (۰/۲۵) $x_1 + y_1 + 2 + x_3 + x_4 + y_5 + 4 = 11$ (۰/۲۵) $\Rightarrow x_1 + y_1 + x_3 + x_4 + y_5 = 5$ (۰/۲۵) $\Rightarrow$ جواب = $\binom{5+5-1}{5-1} = \binom{9}{4}$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)																
۱۳	<p>با استفاده از جایگشت ۱ <math>\rightarrow 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4</math> (۰/۲۵) مربع لاتین به صورت مقابله داریم:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td><td>۴</td></tr> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۳</td><td>۲</td></tr> <tr> <td>۴</td><td>۱</td><td>۲</td><td>۳</td></tr> <tr> <td>۲</td><td>۳</td><td>۴</td><td>۱</td></tr> </table> <p>(۰/۲۵)</p>	۳	۲	۱	۴	۱	۴	۳	۲	۴	۱	۲	۳	۲	۳	۴	۱	(۰/۲۵)
۳	۲	۱	۴															
۱	۴	۳	۲															
۴	۱	۲	۳															
۲	۳	۴	۱															

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	سوالات امتحان درس: ریاضیات گسسته
آزمون شماره (۴)	امتحان شهریور ۹۹		سال دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	سوالات	نمره
۱	<p>درست یا نادرست بودن گزاره‌های زیر را تعیین کنید.</p> <p>(آ) برای هر دو عدد حقیقی <math>x</math> و <math>y</math>، داریم <math>\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}</math></p> <p>(ب) اگر <math>a</math> و <math>b</math> دو عدد حقیقی باشند و <math>a = b</math> آن‌گاه <math>a^2 = b^2</math> یا <math>a &lt; b \Leftrightarrow a^2 &lt; b^2</math></p> <p>(ت) حاصل جمع هر دو عدد گنگ، عددی گنگ است.</p>	۱
۲	<p>ثابت کنید اگر <math>a</math> و <math>b</math> دو عدد حقیقی نامنفی باشند، داریم <math>\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}</math></p>	۱/۲۵
۳	<p>فرض کنیم <math>a</math> و <math>n</math> دو عدد طبیعی باشند به طوری که <math>a   2n+3</math> و <math>a   3n+4</math>. نشان دهید <math>a = 1</math></p>	۱/۲۵
۴	<p>ثابت کنید اگر <math>p &gt; 3</math> عددی اول باشد، آن‌گاه به یکی از دو صورت <math>p = 6k+1</math> یا <math>p = 6k+5</math> (که <math>k \in \mathbb{W}</math>) دارد.</p>	۱/۵
۵	<p>اگر باقی‌مانده تقسیم اعداد <math>m</math> و <math>n</math> بر ۱۷ به ترتیب ۵ و ۳ باشد، در این صورت باقی‌مانده تقسیم عدد <math>(2m - 5n)</math> بر ۱۷ را محاسبه کنید.</p>	۱/۲۵
۶	<p>رقم یکان عدد <math>(2^{11} + 7)</math> را به دست آورید.</p>	۱/۲۵
۷	<p>معادله سیاله <math>2x + 5y = 19</math> را حل کنید.</p>	۱
۸	<p>گراف <math>G</math> به صورت مقابل رسم شده است. به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(آ) <math>\Delta(G)</math> و <math>\delta(G)</math> را مشخص کنید.</p> <p>(ب) سه دور به طول ۳ بنویسید.</p> <p>(پ) ماکریم درجه در مکمل گراف <math>G</math> چند است؟</p> <p>(ت) <math>N_G(e)</math> را با اعضاء بنویسید.</p> <p>(ث) آیا گراف <math>G</math> همبند است؟</p>	۲/۵
۹	<p>گراف کامل <math>K_p</math> دارای ۱۰ یال است. ابتدا <math>p</math> را به دست آورید، سپس گراف را رسم کنید.</p>	۱
۱۰	<p>عدد احاطه‌گری گراف داده شده را مشخص کنید.</p>	۱/۵
۱۱	<p>هشت نفر به چند طریق می‌توانند در سه اتاق سه نفره، چهار نفره و یک نفره قرار بگیرند؟</p>	۰/۷۵
۱۲	<p>معادله <math>14 = x_1 + x_2 + \dots + x_5</math> چند جواب صحیح و نامنفی دارد به شرط آن‌که <math>x_1 \geq 1</math> و <math>x_3 &gt; 3</math> باشند؟</p>	۱/۲۵
۱۳	<p>یک مربع لاتین چرخشی <math>4 \times 4</math> بنویسید.</p>	۰/۵
	<p>بخش انتخابی: دانش‌آموزان عزیز جهت کسب ۴ نمره باقی‌مانده فقط به ۴ سؤال به دلخواه پاسخ دهید.</p>	
۱۴	<p>فرض کنیم <math>a^n \equiv_m b^n</math> اگر <math>a, b \in \mathbb{Z}</math>، <math>n \in \mathbb{N}</math>، <math>m \in \mathbb{N}</math> ثابت کنید.</p>	۱
۱۵	<p>آیا گراف ۷ رأسی ۳-منتظم وجود دارد؟ برای پاسخ خود دلیل ارائه کنید.</p>	۱
۱۶	<p>گراف <math>P_5</math> را رسم کرده و تمام مسیرهای به طول ۳ را مشخص کنید.</p>	۱

رشته: ریاضی و فیزیک		راهنمای تصحیح سوالات امتحان درس: ریاضیات گسسته
آزمون شماره (۴)	امتحان شهریور ۹۶	سال دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	راهنمای تصحیح	ردیف
۱	ب) درست ( $۰/۲۵$ ) ت) نادرست ( $۰/۲۵$ ) پ) نادرست ( $۰/۲۵$ )	۱
۲	$\frac{a+b}{\sqrt{ab}} \geq \sqrt{ab} \Leftrightarrow a+b \geq 2\sqrt{ab}$ ( $۰/۲۵$ ) $\Leftrightarrow a+b - 2\sqrt{ab} \geq ۰$ ( $۰/۲۵$ ) $\Leftrightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq ۰$ ( $۰/۲۵$ ) نابرابری آخر برای $a$ و $b$ نامنفی همیشه درست است ( $۰/۲۵$ ). اثبات بازگشتی و حکم برقرار است. ( $۰/۲۵$ )	۲۴۶
۳	$a \mid 3n+4 \Rightarrow a \mid \underbrace{-2(3n+4)}_{(۰/۲۵)} + \underbrace{2(2n+3)}_{(۰/۲۵)} \Rightarrow a \mid 1$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow a = \pm 1$ ( $۰/۲۵$ ) $\xrightarrow{n \in \mathbb{N}} a = ۱$ ( $۰/۲۵$ )	۳
۴	هرگاه $p$ را بر ۶ تقسیم کنیم، خواهیم داشت: $p = ۶k(۱)$ ، $p = ۶k+1(۲)$ ، $p = ۶k+2 = ۲(3k+1)$ ( $۳$ ) $p = ۶k+3 = ۲(2k+1)$ ( $۴$ ) ، $p = ۶k+4 = ۲(3k+2)$ ( $۵$ ) ، $p = ۶k+5$ ( $۶$ ) $p$ در حالات ( $۱$ )، ( $۳$ ) و ( $۵$ ) زوج و در ( $۴$ ) بر ۳ بخشیده است ( $۰/۲۵$ ) که با اول بودن $p$ تناقض دارد. ( $۰/۲۵$ ) بنابراین فقط در حالات ( $۲$ ) یا ( $۶$ ) $p$ می‌تواند عددی اول باشد که حکم اثبات می‌شود. ( $۰/۲۵$ )	۴
۵	$m = ۱۷q + ۵$ ( $q \in \mathbb{Z}$ ) $n = ۱۷q' + ۳$ ( $q' \in \mathbb{Z}$ ) $\Rightarrow (2m - 5n) = ۱۷(2q - 5q' - ۱) + ۱۲$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow r = ۱۲$ ( $۰/۲۵$ )	۵
۶	$۷^{\Delta} \stackrel{۱}{\equiv} ۲$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow ۷^{\Delta} \stackrel{۱}{\equiv} ۴$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow ۷^{11} \stackrel{۱}{\equiv} ۸$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow ۷^{11} + ۷ \stackrel{۱}{\equiv} ۱ \Delta \equiv ۵$ ( $۰/۲۵$ ) رقم بکان برابر ۵ است. ( $۰/۲۵$ )	۶
۷	$۲x \stackrel{\Delta}{\equiv} ۱۹ \stackrel{\Delta}{\equiv} ۴$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow x \stackrel{(۲\Delta)=1}{\equiv} ۲$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow x = ۵k + ۲$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow y = -۲k + ۳$ ( $۰/۲۵$ )	۷
۸	(۰/۲۵) $\delta(G) = ۰$ ، $\Delta(G) = ۴$ (۰/۲۵) c,a,b,c ( $۰/۲۵$ ) ، c,a,e,c ( $۰/۲۵$ ) ، c,e,d,c ( $۰/۲۵$ ) ث) خیر ( $۰/۲۵$ ) ت) ( $۰/۲۵$ ) $N_G(e) = \{a, c, d\}$ (۰/۲۵) پ) $\Delta$ ( $۰/۲۵$ )	۸
۹	$\frac{p(p-1)}{2} = ۱۰$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow p^2 - p - ۲۰ = ۰$ ( $۰/۲۵$ ) $\Rightarrow p = ۵$ ( $۰/۲۵$ ) رسم گراف ( $۰/۲۵$ )	۹
۱۰	با توجه به اینکه $\gamma(G) \leq ۲$ داریم $\gamma(G) \geq ۲$ . لذا حداقل عدد احاطه‌گری ۲ است. ( $۰/۲۵$ ) از طرفی $\{e, c\}$ یک مجموعه احاطه‌گر است. ( $۰/۵$ ). پس $\gamma(G) = ۲$ در نتیجه ( $۰/۲۵$ ) $\gamma(G) \leq ۲$ ( $۰/۲۵$ ) (عدد احاطه‌گری). ( $۰/۲۵$ )	۱۰
۱۱	$\frac{\Delta!}{3! \times 4!}$ ( $۰/۷۵$ ) به راه حل $\binom{\Delta}{4} \binom{4}{3} \binom{3}{1} \binom{1}{1}$ نیز نمره داده شود. ( $۰/۲۵$ ) ( $۰/۲۵$ ) ( $۰/۲۵$ )	۱۱