

فهرست

FILM	پاسخ	درسنامه و سوالات
187 min	۱۰۰	۶ تا ۳۵
147 min	۱۲۳	۳۶ تا ۶۷
178 min	۱۴۱	۶۸ تا ۹۷

فصل اول: آشنایی با نظریه اعداد

فصل دوم: گراف و مدل سازی

فصل سوم: ترکیبیات (شمارش)

امتحان نهایی



بارم‌بندی درس ریاضیات گسسته			
نوبت دوم	نوبت اول	شماره فصل	
۵	۱۵	اول	
۲	۵	تا صفحه ۴۲	دوم
۵	-	صفحه ۴۲ به بعد	
۸	-	سوم	
۲۰	۲۰	جمع	

۱۷۴	آزمون ۱: خرداد ماه ۱۳۹۹
۱۷۵	آزمون ۲: شهریور ماه ۱۳۹۹
۱۷۷	آزمون ۳: دی ماه ۱۳۹۹
۱۷۸	آزمون ۴: خرداد ماه ۱۴۰۰
۱۷۹	آزمون ۵: شهریور ماه ۱۴۰۰
۱۸۰	آزمون ۶: دی ماه ۱۴۰۰
۱۸۱	آزمون ۷: خرداد ماه ۱۴۰۱
۱۸۳	آزمون ۸: شهریور ماه ۱۴۰۱
۱۸۴	پاسخ نامه تشریحی آزمون ۱ تا ۸

۱

بخش



درستامه

و سؤالات تشریحی

فصل اول

آشنایی با نظریه اعداد

فصل اول ریاضیات گسسته دارای ۷ بسته است که در آن‌ها مباحثی همچون استدلال استنتاجی، مثال نقض، برهان خلف، اثبات بازگشتی، بخش پذیری، مقسوم علیه مشترک، هم‌نهمی، باقیمانده تقسیم اعداد و معادله هم‌نهمی مطرح شده است. از این فصل در نوبت اول ۱۵ نمره و در نوبت دوم ۵ نمره سؤال مطرح می‌شود.

فصل ۱

برای استفاده از فیلم آموزشی شب امتحان این فصل QR-code مقابل را اسکن کنید.

فیلم شب امتحان

استدلال استنتاجی و مثال نقض و اثبات با در نظر گرفتن همه حالت‌ها

صفحه ۴ تا ۲۰ کتاب درسی

بسته اول



استدلال ریاضی

استدلال و اثبات در ریاضیات جایگاه ویژه‌ای دارد. درک و فهم ریاضی بدون توجه به استدلال، امکان ندارد و آموزش ریاضیات را محدود به حفظ کردن رویه‌ها و الگوریتم‌ها خواهد کرد. آشنایی با روش‌های استدلال و اثبات در ریاضیات، هم به فهم ریاضیات و هم به بسط و درک آن کمک می‌نماید. حال به بررسی بعضی از روش‌های استدلال و اثبات در ریاضیات می‌پردازیم.

اثبات مستقیم (استدلال استنتاجی)

اثبات مستقیم ممکن است کاملاً پیچیده باشد ولی روش نتیجه‌گیری با استفاده از حقایق است که درستی آن‌ها را از قبل پذیرفته‌ایم.

نکته! وقتی از استدلال استنتاجی استفاده می‌کنیم، مطمئن هستیم که نتیجه همیشه درست است.

سؤال با استفاده از اثبات مستقیم نشان دهید مجموع هر دو عدد فرد، عددی زوج است.

پاسخ فرض می‌کنیم که دو عدد فرد به صورت $a = 2k + 1$ و $b = 2k' + 1$ که $k, k' \in \mathbb{Z}$ باشند.

$$a + b = (2k + 1) + (2k' + 1) = 2k + 2k' + 2 = 2(k + k' + 1) = 2k''$$

"۲k عددی زوج است.

سؤال با استفاده از اثبات مستقیم نشان دهید حاصل ضرب سه عدد صحیح متوالی، همواره مضرب ۶ است.

پاسخ فرض می‌کنیم $a, a+1, a+2$ سه عدد متوالی باشند. از هر دو عدد متوالی یکی به ۲ بخش پذیر است. بنابراین یکی از دو عدد a یا $a+1$ زوج است، بنابراین $a(a+1)(a+2)$ مضرب ۲ است. هم‌چنین از هر سه عدد صحیح متوالی یکی بر ۳ بخش پذیر است، بنابراین $a(a+1)(a+2)$ مضرب ۳ می‌باشد. عدد $a(a+1)(a+2)$ هم به ۲ و هم به ۳ بخش پذیر است، بنابراین مضرب ۶ می‌باشد.

سؤال با استفاده از استدلال استنتاجی ثابت کنید، اگر به سه برابر عددی فرد، یک واحد اضافه شود، عددی زوج به دست می‌آید.

پاسخ فرض می‌کنیم که $a = 2k + 1$, ($k \in \mathbb{Z}$) عددی فرد است.

$$3a + 1 = 3(2k + 1) + 1 = 6k + 3 + 1 = 6k + 4 = 2(3k + 2) = 2k'$$

بنابراین سه برابر عددی فرد به اضافه یک، عددی زوج است.

مثال نقض

استدلال مستقیم به ما اطمینان می‌دهد که نتیجه به دست آمده حتماً درست است. گاهی اتفاق می‌افتد که با مثالی، عمومیت نتیجه‌ای که حدس می‌زنیم نقض می‌شود.

مثال نقض: به مثالی که نشان می‌دهد نتیجه‌گیری کلی غلط است، مثال نقض می‌گویند.

سؤال برای اثبات نادرستی هریک از گزاره‌های زیر یک مثال نقض ارائه دهید.

آ توان دوم یک عدد همیشه از آن بزرگ‌تر است.

ب اگر x و y اعداد گنگی باشند، آن‌گاه x^y یک عدد گنگ است.

پاسخ **آ** مثال نقض $x = \frac{1}{4}$ و $x^2 = \frac{1}{16}$ برای رد این گزاره کافی است، زیرا: $x^2 = \frac{1}{16} < x = \frac{1}{4}$

ب مثال نقض $x = 2^{\sqrt{2}}$ و $y = \sqrt{2}$ را در نظر می‌گیریم. (اعداد گویا) $x^y = (2^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 2^2 = 4 \in \mathbb{Q}$

اثبات با در نظر گرفتن همه حالت‌ها (روش اشباع)

گاهی برای اثبات یک گزاره لازم است که همه موارد ممکن در مورد مسئله را در نظر بگیریم و هر حالت را به طور مستقیم اثبات کنیم. سپس با توجه به هم‌ارزی $(p \vee q \Rightarrow r) \equiv (p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)$ ، حکم کلی مسئله اثبات می‌شود.

سؤال با استفاده از روش اشباع نشان دهید حاصل ضرب دو عدد صحیح متوالی، همواره عددی زوج است.

پاسخ فرض کنیم a و $a+1$ دو عدد صحیح متوالی باشند. دو حالت وجود دارد:

حالت اول a عددی زوج است، بنابراین داریم: $a = 2k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow a(a+1) = 2k(2k+1) = 2 \underbrace{k(2k+1)}_{k'} = 2k', k' \in \mathbb{Z}$
پس $a(a+1)$ زوج است.

حالت دوم a عددی فرد است، بنابراین داریم:

$a = 2k+1, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow a(a+1) = (2k+1)(2k+2) = 2 \underbrace{(2k+1)}_{2(k+1)} \underbrace{(k+1)}_{k'} = 2k', k' \in \mathbb{Z}$
پس $a(a+1)$ زوج است.

اگر زوج بودن a را با p و فرد بودن a را با q و زوج بودن $a(a+1)$ را با r نمایش دهیم، در بالا ثابت کردیم که $(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)$ و با توجه به هم‌ارزی $p \vee q \Rightarrow r \equiv (p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)$ حکم ثابت می‌شود.

سؤال برای هر عدد طبیعی n ، $5 + 7n + n^2$ عددی فرد است.

پاسخ هر عدد طبیعی زوج یا فرد است. بنابراین دو حالت در نظر می‌گیریم:

حالت اول n زوج است، بنابراین داریم: $n = 2k, k \in \mathbb{N} \Rightarrow n^2 + 7n - 5 = (2k)^2 + 7(2k) - 5 = 4k^2 + 14k - 5 = 4k^2 + 14k - 6 + 1$
 $\xrightarrow{\text{فاکتور}} 2(2k^2 + 7k - 3) + 1 = 2k' + 1, k' \in \mathbb{Z}$
که حاصل $5 + 7n + n^2$ یک عدد فرد است.

حالت دوم n فرد است، بنابراین داریم: $n = 2k-1, k \in \mathbb{N} \Rightarrow n^2 + 7n - 5 = (2k-1)^2 + 7(2k-1) - 5$
 $= 4k^2 - 4k + 1 + 14k - 7 - 5 = 4k^2 + 10k - 11 \xrightarrow{\text{فاکتور}} 2(2k^2 + 5k - 6) + 1 = 2k' + 1, k' \in \mathbb{Z}$
که حاصل $5 + 7n + n^2$ باز هم یک عدد فرد است.

لذا در دو حالت برای هر عدد طبیعی n ، $5 + 7n + n^2$ عددی فرد است.

● جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۱. عبارت «مربع هر عدد گنگ، عددی گویا است.» نادرست است و مثال نقض آن عدد می باشد. (خرداد ۹۶)
۲. مثال نقض، مثالی است که نشان می دهد نتیجه کلی است.
۳. هنگامی از استدلال استفاده می کنیم که مطمئن هستیم، نتیجه مسأله همیشه درست است.

● درستی یا نادرستی عبارات در سؤال‌های ۴ تا ۱۶ را مشخص کنید.

۴. حاصل ضرب هر سه عدد طبیعی متوالی بر ۶ بخش پذیر است. (خرداد ۱۴۰۰)
۵. مجموع هردو عدد فرد، عددی زوج است. (شهریور ۹۸)
۶. برای هر عدد طبیعی n بزرگ‌تر از ۱، $2^n - 1$ اول است. (شهریور ۹۸ و دی ۹۹)
۷. مربع هر عدد حقیقی مثبت است.
۸. اگر از مربع یک عدد فرد یک واحد کم کنیم، یک عدد زوج حاصل می شود.
۹. بین هردو عدد گنگ، عدد گویا وجود دارد.
۱۰. عدد $3^n + 4$ برای هر عدد طبیعی n ، عدد اول است.
۱۱. اگر $|a| = |b|$ باشد، آن‌گاه $a = b$
۱۲. برای هردو عدد حقیقی x و y داریم: $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ (شهریور ۹۹)
۱۳. اگر a و b دو عدد حقیقی باشند و $ab = 0$ ، آن‌گاه $a = 0$ یا $b = 0$. (شهریور ۹۹)
۱۴. اگر $a, b \in \mathbb{R}$ ، داریم: $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$ (شهریور ۹۹)
۱۵. حاصل جمع هردو عدد گنگ، عددی گنگ است. (خرداد ۹۹ و شهریور ۹۹)
۱۶. اگر از مربع عددی فرد یک واحد کم کنیم، حاصل همواره بر ۸ بخش پذیر است. (خرداد ۹۹)
۱۷. با استفاده از استدلال استنتاجی ثابت کنید حاصل ضرب سه عدد زوج متوالی مضرب ۸ است. (دی ۹۵)
۱۸. کدام یک از احکام زیر درست است؟ احکام درست را اثبات کنید و برای رد احکام نادرست یک مثال نقض بیاورید. (شهریور ۹۳)

[آ] توان دوم یک عدد، همیشه از آن عدد بزرگ‌تر است.

[ب] حاصل ضرب دو عدد صحیح زوج متوالی، مضرب ۸ است.

۱۹. با استفاده از استدلال استنتاجی نشان دهید مجموع مربعات هردو عدد فرد همواره عددی زوج است. (خرداد ۹۳)
۲۰. با استدلال استنتاجی ثابت کنید:

[آ] تفاضل مربعات دو عدد فرد، همواره مضرب ۴ است.

- [ب] اگر x یک عدد صحیح و مضرب ۳ باشد، آن‌گاه $x(x+3)$ مضرب ۱۸ است. (دی ۹۰)

۲۱. با استفاده از استدلال استنتاجی نشان دهید مجموع سه عدد صحیح متوالی همواره مضرب ۳ است.

۲۲. با استفاده از استدلال استنتاجی نشان دهید اگر P و $P+2$ ، $P \geq 5$ (دو عدد اول باشند، آن‌گاه $P+1$ مضرب ۶ است.

۲۳. با استفاده از استدلال استنتاجی نشان دهید حاصل ضرب چهار عدد صحیح متوالی به اضافه یک، مربع کامل است. 🌟

۲۴. ثابت کنید، برای هر عدد طبیعی n :

[آ] $n^2 + 5n - 9$ یک عدد فرد است.

[ب] $2n^2 + 6n - 12$ عددی زوج است.

۲۵. ثابت کنید برای هر عدد طبیعی زوج n ، $n^2 - 5n + 7$ عددی فرد است. (خرداد ۱۴۰۱)

۲۶. $A = \{2, 3, 5\}$ یک زیرمجموعه از مجموعه $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ است و $n \in S$ اگر $\frac{n^2(n+1)^2}{3}$ یک عدد زوج باشد، ثابت کنید $n \in A$

(مشابه تمرین کار در کلاس صفحه ۵ کتاب درسی)

۲۷. اگر a و b دو عدد صحیح باشند و ab عددی فرد باشد، ثابت کنید $a^2 + b^2 + 4$ زوج است. (مشابه تمرین کار در کلاس صفحه ۵ کتاب درسی)

۲۸. با استفاده از استدلال استنتاجی نشان دهید مربع هر عدد صحیح فرد به صورت $8k + 1$ است که در آن $k \in \mathbb{Z}$.

۲۹. با استفاده از استدلال استنتاجی نشان دهید حاصل ضرب هر دو عدد به صورت $6q + 5$ ، عددی به صورت $6q + 1$ است. ($q \in \mathbb{Z}$)

۳۰. آیا هر عدد طبیعی را می توان به صورت مجموع اعداد طبیعی متوالی نوشت؟

● برای اثبات نادرستی هریک از احکام سوالات ۳۱ تا ۴۲ یک مثال نقض ارائه دهید.

۳۱. مجموع، تفاضل، حاصل ضرب و حاصل تقسیم دو عدد گنگ، گنگ است.

۳۲. همیشه ارتفاع یک مثلث داخل آن قرار می گیرد.

۳۳. اگر $(a-1)(b-1) = 0$ آن گاه $a = 1 \wedge b = 1$ می باشد.

۳۴. برای هر عدد حقیقی مثبت x ، داریم $3^x \geq 3$.

۳۵. اگر x و y دو عدد گنگ باشند، آن گاه $\frac{2x+y}{2x-y}$ نیز عدد گنگ است.

۳۶. به ازای هر عدد طبیعی n ، $n^2 + n + 41$ عددی اول است.

۳۷. اگر a ، b و c سه عدد گنگ باشند، آن گاه abc^3 یک عدد گنگ است.

۳۸. محیط دایره همواره عددی گنگ است.

(دی ۹۲)

۳۹. مجموع هر دو عدد گنگ، عددی گنگ است.

(دی ۹۲)

۴۰. برای هر عدد طبیعی n ، عدد $3^n + 2$ اول است.

(دی ۸۹)

۴۱. اگر $xy = 0$ ، آن گاه $x = 0$ و $y = 0$.

(خرداد ۹۱)

۴۲. اگر a ، b و c اعداد طبیعی باشند، آن گاه $b\sqrt{ac}$ یک عدد گنگ است.

(شهریور ۱۴۰۱)

۴۳. هریک از گزاره های زیر را اثبات و یا با ارائه مثال نقض کنید.

ا) برای هر عدد طبیعی n ، عدد $2^n + 1$ اول است.

ب) مربع هر عدد فرد، عددی فرد است.

(شهریور ۹۴)

۴۴. کدام یک از احکام زیر درست است؟ احکام درست را اثبات کنید و برای رد احکام نادرست یک مثال نقض بیاورید.

ا) اگر $x > 2$ ، آن گاه $x > \frac{5}{4}$

ب) اگر x و y هر دو گویا باشند، آن گاه $x + y$ گویا است.

(خرداد ۹۰)

۴۵. درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با ذکر دلیل بررسی کنید.

ا) به ازای هیچ دو عدد اول a و b ، عدد $a + b$ اول نیست.

ب) اگر x فرد باشد، آن گاه $x(x+2)$ هم فرد است.



الف اثبات غیرمستقیم (برهان خلف)

همان طور که در دو سال گذشته و در هندسه (۱) با اثبات غیرمستقیم آشنا شدید، گاهی اوقات برای اثبات یک قضیه، ابتدا فرض می‌کنیم که حکم قضیه درست نباشد (فرض خلف)، آن‌گاه با استفاده از روش اثبات مستقیم به یک تناقض می‌رسیم. از این تناقض معلوم می‌شود که فرض خلف نادرست بوده است و در نتیجه حکم اولیه درست است. این روش استدلال را برهان خلف می‌گوییم.

سؤال نشان دهید که با فرض صحیح بودن n ، اگر n^2 فرد باشد، n نیز فرد است.

پاسخ فرض می‌کنیم که n یک عدد صحیح و n^2 عددی فرد است. اگر n عدد فرد نباشد، یک عدد زوج است (فرض خلف). یعنی $n = 2k$ ، $(k \in \mathbb{Z})$

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2) = 2k'$$

n^2 یک عدد صحیح زوج است. بنابراین با فرض مسئله در تناقض است. در نتیجه فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

مراحل اثبات به روش برهان خلف

- ۱ فرض می‌کنیم نتیجه مطلوب درست نباشد (فرض خلف).
- ۲ با استفاده از استدلال استنتاجی نشان می‌دهیم که این فرض نتیجه‌ای به دست می‌دهد که حقایق دانسته شده را نقض می‌کند.
- ۳ حال که به یک تناقض رسیده‌ایم، معلوم می‌شود که فرض خلف نادرست است. بنابراین نتیجه مطلوب درست است.

سؤال ثابت کنید اگر x گویا و y گنگ باشد، آن‌گاه $x - y$ گنگ است.

پاسخ فرض کنیم که x گویا و y گنگ است. نشان می‌دهیم $x - y$ یک عدد گنگ است.

فرض خلف: فرض کنیم $x - y$ گویا باشد (گنگ نباشد). چون تفاضل دو عدد گویا نیز گویا است، پس $x - y - x \in \mathbb{Q}$ یعنی $-y \in \mathbb{Q}$ و $y \in \mathbb{Q}$ و این با فرض گنگ بودن y تناقض دارد. پس فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

سؤال می‌دانیم $\sqrt{3}$ یک عدد گنگ است. ثابت کنید $\sqrt{3+2}$ یک عدد گنگ است.

پاسخ فرض می‌کنیم که $\sqrt{3+2}$ یک عدد گنگ نباشد، بنابراین یک عدد گویا است (فرض خلف).

گنگ = گویا $\Rightarrow \sqrt{3} = a^2 - 2 \Rightarrow a^2 = \sqrt{3} + 2 \Rightarrow a^2 = (\sqrt{3+2})^2 = \sqrt{3+2}$ مربع عدد گویا $\rightarrow$ عددی گویا است.

چون تفاضل دو عدد گویا، عددی گویا است و طبق فرض مسئله $\sqrt{3}$ گنگ است پس در این تساوی به تناقض می‌رسیم و فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

سؤال با استفاده از برهان خلف ثابت کنید اگر x و y دو عدد حقیقی، $x = 3$ و $x + 4y^2 = 7$ آن‌گاه $y \neq -1$ است. شهریور ۹۳

پاسخ ابتدا حکم مسئله را نقض می‌کنیم. فرض می‌کنیم که $y = -1$ باشد (فرض خلف).

$$y = -1 \Rightarrow x + 4(-1)^2 = 7 \Rightarrow x = 3$$

که با فرض مسئله تناقض دارد. پس فرض خلف باطل و حکم $y \neq -1$ برقرار است.

سؤال با استفاده از برهان خلف ثابت کنید $\sqrt{5}$ عددی گنگ است. خرداد ۹۶

پاسخ فرض کنیم $\sqrt{5}$ گنگ نباشد، یعنی گویا باشد (فرض خلف). در این صورت اعداد صحیح a و b وجود دارند به طوری که a و b نسبت به هم اول هستند و داریم:

$$\sqrt{5} = \frac{a}{b}, (a, b) = 1, a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$$

a مضرب ۵ است. $\Rightarrow a^2$ مضرب ۵ است. $\Rightarrow a^2 = 5b^2 \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = 5 \Rightarrow \frac{a}{b} = \sqrt{5}$ به توان ۲ می‌رسانیم.

b مضرب ۵ است. $\Rightarrow b^2$ مضرب ۵ است. $\Rightarrow b^2 = 5k^2 \Rightarrow 2\delta k^2 = 5b^2 \Rightarrow 2\delta k^2 = 5b^2 \Rightarrow a = \delta k, a^2 = \delta b^2 \Rightarrow 2\delta k^2 = 5b^2 \Rightarrow b^2 = \delta k^2 \Rightarrow b = \delta k^2$

لذا a و b هر دو مضرب ۵ هستند که با فرض اول بودن a و b نسبت به هم، در تناقض است. بنابراین فرض خلف باطل و در نتیجه حکم درست است، یعنی $\sqrt{5}$ عددی گنگ است.

نکته! البته توجه کنید که گاهی اوقات برای رد ادعایی فرض می‌کنیم که آن ادعا درست است و با استفاده از دانسته‌ها به مطالب نادرست می‌رسیم، در این حالت نیز از فرض خلف استفاده کرده‌ایم.

ب اثبات بازگشتی - گزاره‌های هم‌ارز

اگر ارزش دو گزاره یکسان باشد، آن‌ها را گزاره‌های هم‌ارز (هم‌ارزش) می‌نامیم. اگر P و Q دو گزاره هم‌ارز (یعنی همواره هر دو درست یا هر دو نادرست) باشند، آن‌گاه گزاره‌های $P \Rightarrow Q$ و $Q \Rightarrow P$ هر دو درست هستند و در نتیجه $P \Leftrightarrow Q$ یک گزاره درست است.

برعکس اگر ترکیب دو شرطی $P \Leftrightarrow Q$ درست باشد، آن‌گاه P و Q دو گزاره هم‌ارز خواهند بود و اگر ارزش یکی از آن‌ها را بدانیم، ارزش دیگری نیز همان خواهد بود.

به کمک این موضوع می‌توانیم درستی یا نادرستی یک گزاره را بررسی کنیم، به طوری که اگر P و Q سه گزاره باشند و $Q \Leftrightarrow R$ و $P \Leftrightarrow Q$ یعنی ارزش سه گزاره یکسان است و اثبات درستی یا نادرستی هر یک تکلیف دو گزاره دیگر را معلوم خواهد کرد. با تکرار این کار و با استفاده از درستی حکم به یک رابطه بدیهی و یا فرض مسئله می‌رسیم.

در هنگام استفاده از این روش اثبات (که گاهی به آن روش بازگشتی هم می‌گویند)، توانایی ارائه ترکیب دو شرطی درست و مناسب بسیار اساسی است.

مثال $a^2 + 2ab + b^2 \geq 0 \Leftrightarrow (a+b)^2 \geq 0$ یک ترکیب دو شرطی درست است. ولی $a^2 = b^2 \Leftrightarrow a = b$ یک ترکیب دو شرطی درست نیست، زیرا:

$$a^2 = b^2 \Rightarrow a = \pm b$$

سؤال اگر a و b دو عدد مثبت باشند، به روش بازگشتی ثابت کنید:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$$

پاسخ فرض کنیم که حکم درست است، پس باید به یک رابطه بدیهی برسیم.

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 \xrightarrow[\text{ab} > 0]{\times ab} a^2 + b^2 \geq 2ab \Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2ab \geq 0 \Leftrightarrow (a-b)^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}).$$

آخرین گزاره یعنی $(a-b)^2 \geq 0$ همواره برقرار است، به عبارت دیگر حکم، هم‌ارز گزاره‌ای است که همواره برقرار است. پس حکم ثابت شده است.

سؤال اگر a, b, c سه عدد حقیقی باشند، ثابت کنید $a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a+b+c)$

$$a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a+b+c)$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 3 - 2a - 2b - 2c \geq 0 \Leftrightarrow (a^2 - 2a + 1) + (b^2 - 2b + 1) + (c^2 - 2c + 1) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a-1)^2 + (b-1)^2 + (c-1)^2 \geq 0$$

نامساوی اخیر بدیهی است.

سؤال اگر a و b دو عدد حقیقی باشند، با استفاده از استدلال بازگشتی درستی رابطه زیر را بررسی کنید:

$$a^2 + 1 \geq b(2-b)$$

پاسخ نامساوی اخیر بدیهی است.

$$a^2 + 1 \geq b(2-b) \Leftrightarrow a^2 + 1 \geq 2b - b^2 \Leftrightarrow a^2 + (b^2 - 2b + 1) \geq 0 \Leftrightarrow a^2 + (b-1)^2 \geq 0$$

● جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۴۶. در روش برهان خلف فرض می کنیم که حکم باشد و سپس با استفاده از قوانین منطق گزاره ها و دنباله ای از استدلال های و مبتنی بر فرض به یک نتیجه با فرض می رسیم و از آن جا معلوم می شود که فرض بودن حکم باطل است و حکم ثابت می گردد.
۴۷. حاصل جمع یک عدد گویا و یک عدد گنگ، عددی است.
۴۸. حاصل ضرب هر عدد گویای ناصفر در یک عدد گنگ، عددی (گنگ، گویا) است.
۴۹. اگر ارزش دو گزاره یکسان باشد، آن ها را گزاره های می نامند.
۵۰. میانگین حسابی دو عدد نامنفی، از میانگین هندسی آن ها نیست.

(دی ۱۴۰۰)

● درستی یا نادرستی هریک از عبارات زیر را مشخص کنید.

۵۱. اگر n یک عدد طبیعی باشد، آن گاه زوج بودن n و زوج بودن n^2 هم ارز هستند.
۵۲. اگر α و β دو عدد گنگ باشند ولی $\alpha + \beta$ گویا باشد، آن گاه $\alpha - \beta$ گویا است.
۵۳. اگر $y \neq 1$ و $x^2 + 2y = 10$ ، آن گاه $x \neq 2$ است.
۵۴. اگر x و y دو عدد حقیقی (مخالف صفر) باشند، آن گاه $2 < \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ است.
۵۵. هیچ عدد صحیحی مانند x و y وجود ندارند که رابطه $x^2 + y^2 = (x + y)^2$ برقرار باشد.
۵۶. با استفاده از استدلال برهان خلف، ثابت کنید که با فرض صحیح بودن n ، اگر n^2 زوج باشد، n نیز زوج است.
۵۷. با استفاده از برهان خلف ثابت کنید اگر $\sqrt{5}$ گنگ باشد، $3 + \sqrt{5}$ هم گنگ است.
۵۸. اگر تابع f در $x = a$ پیوسته باشد ولی g در $x = a$ ناپیوسته باشد، ثابت کنید $f - g$ در $x = a$ ناپیوسته است. (برهان خلف)

(خرداد ۱۴۰۰)

(شهریور ۹۴)

(دی ۹۵)

(مشابه تمرین کار در کلاس قسمت (ب) صفحه ۶ کتاب درسی)

۵۹. با استفاده از برهان خلف، ثابت کنید اگر n یک عدد طبیعی و $3 + 5n$ زوج باشد، آن گاه n یک عدد فرد است.
۶۰. می دانیم $\sqrt{2}$ گنگ است، با استفاده از برهان خلف ثابت کنید $\sqrt{1} + \sqrt{2}$ نیز گنگ می باشد.
۶۱. ثابت کنید حاصل جمع یک عدد گویا و یک عدد گنگ، عددی گنگ است.
۶۲. می دانیم $\sqrt{5}$ و $\sqrt{2}$ اعداد گنگ هستند، با استدلال برهان خلف ثابت کنید $3\sqrt{2} + \sqrt{5}$ نیز گنگ است.
۶۳. با استفاده از روش برهان خلف، ثابت کنید اگر x یک عدد گنگ باشد، $\frac{1}{x}$ نیز عددی گنگ است.
۶۴. a_1, a_2, a_3 اعدادی صحیح هستند و b_1, b_2, b_3 هم همان اعداد ولی به ترتیب دیگری قرار گرفته اند. ثابت کنید $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2)(a_3 - b_3)$ عددی زوج است.

(خرداد ۹۱ و مشابه شهریور ۹۰)

(شهریور ۹۱)

(شهریور ۱۴۰۰)


(دی ۹۰)

(خرداد ۹۹ خارج)

(شهریور ۱۴۰۱)

(مشابه مثال صفحه ۶ کتاب درسی)

(تمرین ۲ صفحه ۸ کتاب درسی)



۶۵. a_1, a_2, a_3, a_4 و a_5 عددهایی صحیح هستند و b_1, b_2, b_3, b_4 و b_5 هم همان اعداد ولی به ترتیب دیگری قرار گرفته اند. ثابت کنید $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2)(a_3 - b_3)(a_4 - b_4)(a_5 - b_5)$ عددی زوج است.
۶۶. ثابت کنید عدد حقیقی مانند x وجود دارد که $x^2 < x^3$.
۶۷. اگر n^3 مضرب ۵ باشد، نشان دهید n نیز مضرب ۵ است. (برهان خلف)
۶۸. فرض کنید AD نیمساز زاویه $\hat{A}$ در مثل ABC باشد. اگر $BD \neq DC$ ، ثابت کنید $AB \neq AC$.
۶۹. اگر x یک عدد گویا و $\sqrt{3}$ یک عدد گنگ باشد، ثابت کنید $2x + \frac{\sqrt{3}}{2}$ یک عدد گنگ است.
۷۰. می دانیم $\sqrt{3}$ و $\sqrt{7}$ اعدادی گنگ هستند، با استدلال برهان خلف ثابت کنید $\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{7}}$ نیز گنگ است.



۷۱. با استفاده از برهان خلف ثابت کنید $\log_2 5$ عددی گنگ است.

۷۲. اگر α و β دو عدد گنگ باشند ولی $\alpha + \beta$ گویا باشد، ثابت کنید $\alpha - \beta$ و هم چنین $2\alpha + \beta$ گنگ هستند. (مشابه تمرین ۳ صفحه ۸ کتاب درسی، دی ۹۹ و ۱۴۰۰)

۷۳. با استفاده از برهان خلف و با فرض صحیح بودن n ، نشان دهید اگر n^2 مضربی از ۶ باشد، آن گاه n نیز مضربی از ۶ است.

۷۴. با استفاده از روش استدلالی برهان خلف، ثابت کنید:

ا) از یک نقطه خارج یک خط نمی توان بیش از یک خط بر آن عمود کرد.

ب) اگر سه خط راست d ، d' و d'' دویه دو متمایز باشند و $d \parallel d'$ و $d' \parallel d''$ ، آن گاه $d \parallel d''$.

۷۵. آیا اعداد صحیح مانند a و b وجود دارند که $a^2 + b^2 = (a - b)^2$. (مشابه تمرین ۴ صفحه ۸ کتاب درسی)

۷۶. با استفاده از اثبات بازگشتی برای هر دو عدد حقیقی مثبت x و y نشان دهید $x + y \geq 2\sqrt{xy}$. (شهریور ۹۵)

۷۷. به روش بازگشتی ثابت کنید، اگر $a > 0$ آن گاه $a + \frac{1}{a} \geq 2$. (دی ۹۸)

۷۸. اگر x و y دو عدد حقیقی مثبت باشند، ثابت کنید $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$. (خرداد ۹۹)

۷۹. ثابت کنید اگر a و b دو عدد حقیقی نامنفی باشند، داریم: $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. (شهریور ۹۹)

۸۰. ثابت کنید میانگین حسابی دو عدد نامنفی از میانگین هندسی آن ها کم تر نیست. (خرداد ۹۸)

۸۱. با استفاده از استدلال بازگشتی، ثابت کنید حاصل ضرب هر دو عدد حقیقی، کوچک تر یا مساوی نصف مجموع مربع های آن ها است. (شهریور ۹۴ و خرداد ۱۴۰۰)

۸۲. اگر a و b دو عدد حقیقی باشند، با استفاده از استدلال بازگشتی ثابت کنید $a^2 + b^2 \geq 2(b - 1)$. (شهریور ۹۳)

۸۳. آیا مقادیر حقیقی و ناصفر a و b چنان وجود دارند که: $\frac{1}{a+b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ ، $(a + b \neq 0)$. (تمرین ۵ صفحه ۸ کتاب درسی)

۸۴. اگر a و b دو عدد حقیقی مثبت باشند، با استفاده از اثبات بازگشتی ثابت کنید $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$. (خرداد ۹۳)

۸۵. اگر x و y دو عدد حقیقی باشند، با استفاده از اثبات بازگشتی ثابت کنید $x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y$. (خرداد ۹۲ و خارج دی ۹۸)

۸۶. اگر a و b دو عدد حقیقی مثبت باشند، با استفاده از اثبات بازگشتی ثابت کنید $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$. (دی ۹۲)

۸۷. اگر x ، y ، z سه عدد حقیقی باشند، آن گاه ثابت کنید: $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz$. (شهریور ۹۸)

۸۸. اگر a و b اعدادی حقیقی باشند، به طوری که $ab < 0$ ، ثابت کنید $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq -2$. (شهریور ۹۱)

۸۹. اگر x و y دو عدد حقیقی مثبت باشند، درستی رابطه $x^4 + y^4 \geq x^3y + xy^3$ را ثابت کنید. (دی ۹۰)

۹۰. با اثبات بازگشتی نشان دهید: $\frac{a}{b^2} + \frac{b}{a^2} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ ، $(a, b \in \mathbb{R}^+)$. (شهریور ۸۹)

۹۱. اگر a و b دو عدد حقیقی مثبت باشند، به روش بازگشتی ثابت کنید $\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} \geq \frac{4}{\sqrt{a+b}}$. (خرداد ۸۷)

۹۲. اگر x و y دو عدد حقیقی باشند، آن گاه ثابت کنید:

$$y^2 + 1 \geq 2x(y - x + 1)$$

۹۳. اگر x و y دو عدد حقیقی باشند، آن گاه ثابت کنید:

$$x^2 + y^2 - xy \geq x + y - 1$$

۹۴. اگر x ، y ، z سه عدد حقیقی مثبت باشند، آن گاه ثابت کنید:

$$\frac{xy}{z} + \frac{xz}{y} + \frac{yz}{x} \geq x + y + z$$

بخش پذیری در اعداد صحیح

صفحه ۱۲ تا ۱۹ کتاب درسی

بسته سوم

شمارنده

قرار دادن تعدادی شیء در دسته‌های مساوی یا دسته‌بندی کردن تعدادی شیء بدون آن‌که باقی‌مانده‌ای داشته باشد را، «عاد کردن» یا شمارش آن اشیاء توسط شمارنده‌ها می‌نامیم. به عنوان مثال ۱۸ شیء را می‌توان توسط شمارنده‌های ۱۸ یعنی ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ شمارش کرد. برای نمایش این مفهوم از نماد «|» به معنی عاد کردن یا همان شمردن استفاده می‌کنیم. به طوری که می‌نویسیم $۱۸ \mid ۳$ و می‌خوانیم:

۱ می‌شمارد عدد ۱۸ را

۲ عاد می‌کند عدد ۱۸ را

۳ عدد ۱۸ بر ۳ بخش پذیر است. (باقی مانده تقسیم صفر است.)

عاد کردن

عدد صحیح a که مخالف صفر است، شمارنده عدد b است (یا $a \mid b$ ، b را می‌شمارد یا b بر a بخش پذیر است یا $a \mid b$)، هرگاه عدد صحیحی چون q وجود داشته باشد به طوری که $b = aq$. (اگر b بر a بخش پذیر نباشد یا عدد a عدد b را عاد نکند، آن را به صورت $a \nmid b$ نمایش می‌دهیم.)

قرارداد چون بی‌شمار عدد صحیح مانند q وجود دارد که در $0 = 0 \times q$ صدق می‌کند، به معنی آن است که صفر عدد صفر را می‌شمارد و این به صورت یک قرارداد پذیرفته می‌شود.

نکته اگر a عددی طبیعی باشد، داریم $a \mid a$ و $a \mid ۱$ یعنی هر عدد بر خودش و عدد ۱ بخش پذیر است، مانند:

$$۱ \mid ۱ \xleftarrow{(q=۱)} ۱ = ۱ \times ۱, \quad ۵ \mid ۵ \xleftarrow{(q=۱۱)} ۵ = ۵ \times ۱$$

سؤال با توجه به تعریف رابطه عاد کردن، دلیل درستی رابطه‌های زیر را بیان کنید.

۱ $۵ \mid ۴۵$	۲ $-۳ \mid ۳۹$	۳ $۴ \mid -۳۲$	۴ $۵ \nmid ۱۷$
۱ پاسخ $۵ \mid ۴۵ \xleftarrow{q=۹} ۴۵ = ۵ \times ۹$	۲ $-۳ \mid ۳۹ \xleftarrow{q=-۱۳} ۳۹ = (-۳) \times (-۱۳)$	۳ $۴ \mid -۳۲ \xleftarrow{q=-۸} -۳۲ = ۴ \times (-۸)$	۴ $۵ \nmid ۱۷ \Rightarrow \frac{۱۷}{۵} \notin \mathbb{Z}$

خواص و ویژگی‌های رابطه عاد کردن

$$a \mid ۱ \Rightarrow a = \pm ۱$$

۱ اگر a عاد کند عدد ۱ را آن‌گاه $a = ۱$ یا $a = -۱$

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \Rightarrow a^m \mid a^n$$

۲ برای هر عدد طبیعی m و n که n بزرگ‌تر یا مساوی m باشد، داریم $a^m \mid a^n$.

مثال $۲^۴ \mid ۲^۹ \xrightarrow{q=۲^۵} ۲^۹ = ۲^۴ \times ۲^۵$

$$a \mid b \Rightarrow a \mid mb$$

۳ اگر عدد a عدد b را بشمارد، آن‌گاه هر مضرب عدد b را نیز می‌شمارد، یعنی:

مثال $۷ \mid ۱۴ \Rightarrow ۷ \mid ۱۴ \times ۵, ۷ \mid ۱۴ \times (-۳), ۷ \mid ۱۴ \times ۱۲$

۴ اگر a عدد b را بشمارد، آن‌گاه $b^۲$ را می‌شمارد و در حالت کلی b^n ، ($n \in \mathbb{N}$) را می‌شمارد.

$$a \mid b \Rightarrow a \mid b^۲, \quad a \mid b \Rightarrow a \mid b^n$$

مثال $۳ \mid ۶ \Rightarrow ۳ \mid ۶^۲, ۳ \mid ۶ \Rightarrow ۳ \mid ۶^n$

۵ اگر عدد a ، عدد b را بشمارد و نیز c را بشمارد، آن‌گاه a ، عدد c را می‌شمارد. این خاصیت را خاصیت تعدی برای رابطه عاد کردن می‌نامیم.

$$a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$$

مثال $۳ \mid ۹ \wedge ۹ \mid ۱۸ \Rightarrow ۳ \mid ۱۸$

۶ هرگاه عددی دو عدد را بشمارد، آن‌گاه مجموع و تفاضل آن دو عدد را نیز می‌شمارد.

$$a | b \wedge a | c \Rightarrow a | b \pm c$$

مثال $7 | 14 \wedge 7 | 21 \Rightarrow \begin{cases} 7 | 14 + 21 \Rightarrow 7 | 35 \\ 7 | 14 - 21 \Rightarrow 7 | -7 \end{cases}$

۷ اگر $a | b$ و $b \neq 0$ در این صورت $|a| \leq |b|$.

$$a | b \wedge b \neq 0 \Rightarrow |a| \leq |b|$$

از این خاصیت می‌توان نتیجه گرفت که اگر $a | b$ و $b | a$ ، آن‌گاه $a = \pm b$.

مثال $5 | 25 \Rightarrow 5 \leq 25$ ، $-5 | -25 \Rightarrow -5 \leq -25$ ، $5 | -25 \Rightarrow 5 \leq 25$ ، $-5 | 25 \Rightarrow -5 \leq 25$ ، $5 | 25 \Rightarrow 5 \leq 25$ ، $-5 | -25 \Rightarrow -5 \leq -25$.

۸ اگر $a | b$ ، آن‌گاه داریم $a^n | b^n$.

$$a | b \Rightarrow a^n | b^n$$

مثال $3 | -6 \Rightarrow \begin{cases} 3^2 | (-6)^2 \Rightarrow 9 | 36 \\ 3^3 | (-6)^3 \Rightarrow 27 | -216 \end{cases}$

۹ اگر $a | b$ و $c | d$ ، آن‌گاه داریم $ac | bd$.

$$a | b \wedge c | d \Rightarrow ac | bd$$

(دو طرف بخش پذیری را می‌توان در هم ضرب کرد).

مثال $4 | 12$ ، $5 | 15 \Rightarrow 4 \times 5 | 12 \times 15 \Rightarrow 20 | 180$.

۱۰ اگر $a | b$ و $a | c$ ، آن‌گاه $a | mb \pm nc$ (m و n اعداد صحیح‌اند).

$$a | b \wedge a | c \xrightarrow{\text{ترکیب خطی}} a | mb \pm nc, (n, m \in \mathbb{Z})$$

مثال $2 | 6$ ، $2 | 4 \xrightarrow{n=5, m=3} \begin{cases} 2 | 3 \times 6 + 5 \times 4 \Rightarrow 2 | 18 + 20 \Rightarrow 2 | 38 \\ 2 | 3 \times 6 - 5 \times 4 \Rightarrow 2 | 18 - 20 \Rightarrow 2 | -2 \end{cases}$

سؤال از رابطه $5n^2 - 8n + 4$ چند مقدار طبیعی برای n به دست می‌آید؟

پاسخ باتوجه به ویژگی شماره یک داریم:

$$5n^2 - 8n + 4 = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} 5n^2 - 8n + 4 = +1 \\ 5n^2 - 8n + 4 = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5n^2 - 8n + 3 = 0 \xrightarrow{\Delta = 64 - 4(5)(3) = 4} n_1 = 1, n_2 = \frac{3}{5} \notin \mathbb{N} \text{ (غ ق ق)} \\ 5n^2 - 8n + 5 = 0 \xrightarrow{\Delta = 64 - 4(5)(5) = -36} \Delta = -36 < 0 \text{ معادله جواب ندارد.} \end{cases}$$

بنابراین فقط یک مقدار عدد طبیعی یعنی $n = 1$ به دست می‌آید.

عدد اول

هر عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ۱ که هیچ شمارنده مثبتی به جز یک و خودش نداشته باشد، عدد اول نامیده می‌شود. این مجموعه که مجموعه‌ای نامتناهی است، به صورت $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$ نمایش داده می‌شود.

نکته اگر p عددی اول و a عددی طبیعی باشد و $a | p$ ، در این صورت $a = 1$ یا $a = p$.

سؤال اگر a عددی طبیعی باشد و دو عدد $(7k + 8)$ و $(6k + 5)$ را عاقد کند، ثابت کنید $a = 1$ یا $a = 13$.

پاسخ

$$\begin{aligned} a | 7k + 8 &\xrightarrow{(\times 6)} a | 6(7k + 8) \Rightarrow a | 42k + 48 \\ a | 6k + 5 &\xrightarrow{(\times 7)} a | 7(6k + 5) \Rightarrow a | 42k + 35 \\ &\xrightarrow{\text{ترکیب خطی و ویژگی ۱}} a | (42k + 48) - (42k + 35) \\ &\Rightarrow a | 13 \xrightarrow{13 \text{ عددی اول است}} a = 1 \text{ یا } a = 13 \end{aligned}$$

● درج‌های خالی عبارت مناسب بنویسید.

۹۵. اگر $a \mid 1$ آن‌گاه a برابر _____ یا _____ است.

۹۶. اگر p عددی اول باشد و a عددی طبیعی و $a \mid p$ ، در این صورت a برابر _____ یا _____ است.

۹۷. اگر $a \mid b$ و $a \mid a$ ، آن‌گاه a برابر _____ یا _____ است.

۹۸. اگر $a \mid b$ و _____، آن‌گاه $ac \mid bd$.

۹۹. اگر $a \mid 0$ آن‌گاه a برابر _____ است.

۱۰۰. a و b اعدادی صحیح و a مخالف صفر است. اگر $a \mid b$ ، آن‌گاه عدد _____ شمارندهٔ عدد _____ است. (خرداد ۱۴۰۰)

۱۰۱. اگر برای دو عدد صحیح a و b داشته باشیم $a \mid b$ ، برای هر $m \in \mathbb{Z}$ داریم: $(a \mid mb, ma \mid b)$. (دی ۱۴۰۰)

● درستی یا نادرستی هریک از عبارت‌های سؤالات ۱۰۲ تا ۱۰۷ را با دلیل بیان کنید.

۱۰۲. اگر $a \mid 17$ ، آن‌گاه $a \mid 51$.

۱۰۳. اگر $a \mid 24$ ، آن‌گاه $a \mid 6$ یا $a \mid 8$.

۱۰۴. اگر $a \mid 19$ ، آن‌گاه $4a \mid 76$.

۱۰۵. اگر $a \mid 3$ ، آن‌گاه $a \mid 243$.

۱۰۶. از این‌که $a \mid b + c$ ، همواره می‌توان نتیجه گرفت که $a \mid b$ یا $a \mid c$.

۱۰۷. اگر $a \mid b$ و $b \neq 0$ ، در این صورت $|a| > |b|$. (خرداد ۱۴۰۱)

۱۰۸. اگر فرض کنیم $ab = cd$ ، a, b, c, d اعداد صحیح و ناصفرند، در این صورت سه رابطهٔ عادی را از این تساوی نتیجه بگیرید.

(مشابه تمرین ۱ صفحهٔ ۱۶ کتاب درسی)

۱۰۹. از رابطهٔ $1 - 7n + 2n^2$ چند مقدار طبیعی برای n به دست می‌آید؟

۱۱۰. اگر $a \mid b$ ثابت کنید: $a \mid -b$ ، $a \mid b$ و $-a \mid -b$. (تمرین ۲ صفحهٔ ۱۶ کتاب درسی)

۱۱۱. ثابت کنید اگر a عدد b را بشمارد، آن‌گاه b^2 را می‌شمارد و در حالت کلی $(n \in \mathbb{N})$ ، b^n را می‌شمارد.

$$\boxed{\text{آ}} \quad a \mid b \Rightarrow a \mid b^2$$

$$\boxed{\text{ب}} \quad a \mid b \Rightarrow a \mid b^n$$

۱۱۲. در صورت درست بودن عبارت‌های زیر، آن را ثابت کنید و در صورت نادرست بودن، یک مثال نقض برای آن‌ها بیاورید.

$\boxed{\text{آ}}$ آیا از این‌که $a \mid bc$ می‌توان نتیجه گرفت که a حداقل یکی از دو عدد b و c را عاد می‌کند؟ چرا؟

$\boxed{\text{ب}}$ آیا از این‌که $a \mid b$ و $c \mid d$ همواره می‌توان نتیجه گرفت که $a \mid b + d$ ؟ چرا؟

۱۱۳. آیا از این‌که $a \mid b$ می‌توان نتیجه گرفت $ka \mid kb$ ؟ آیا از $ka \mid kb$ می‌توان نتیجه گرفت $a \mid b$ ؟ ($k \neq 0$)

۱۱۴. ثابت کنید اگر عدد a ، عدد b را بشمارد و b نیز c را بشمارد، آن‌گاه a ، عدد c را می‌شمارد. $(a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c)$

۱۱۵. ثابت کنید هرگاه عددی دو عدد را بشمارد، آن‌گاه مجموع و تفاضل آن دو عدد را نیز می‌شمارد. $(a \mid b \wedge a \mid c \Rightarrow a \mid b \pm c)$

$(a \mid b \pm c \Rightarrow a \mid b, a \mid c)$ آیا عکس این مطلب درست است؟

۱۱۶. ویژگی‌های زیر را ثابت کنید:

$$\boxed{\text{آ}} \quad \text{ثابت کنید اگر } a \mid b \text{ و } b \neq 0 \text{ در این صورت } |a| \leq |b| \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

$$\boxed{\text{ب}} \quad \text{ثابت کنید اگر } a \mid b \text{ و } a \mid b, \text{ آن‌گاه } a = \pm b$$

$$\boxed{\text{پ}} \quad \text{اگر } a \mid b, \text{ نشان دهید } a^n \mid b^n$$

(تمرین ۲ کار در کلاس صفحهٔ ۱۲ کتاب درسی)

۱۱۷. اگر عدد طبیعی $a > 1$ ، در دو شرط $a \mid 4k + 9$ و $a \mid 6k + 14$ صدق کند، مقدار a را بیابید. (دی ۹۸)

۱۱۸. اگر a عددی صحیح و فرد باشد و $a + 2 \mid b$ در این صورت باقی مانده تقسیم عدد $a^2 + b^2 + 3$ را بر ۸ بیابید. (تمرین ۱۵ صفحه ۱۶ کتاب درسی دی ۹۷)

۱۱۹. اگر $a \neq 0$ عددی صحیح و دو عدد $(5m+4)$ و $(6m+5)$ بر a بخش پذیر باشند، ثابت کنید $a = \pm 1$. (مشابه کار در کلاس صفحه ۱۱ کتاب درسی)

۱۲۰. اگر $n \in \mathbb{N}$ ، $n \mid 9k+7$ و $n \mid 7k+6$ ، ثابت کنید $n=1$ یا $n=5$. (خرداد ۹۹)

۱۴۱. اگر عدد طبیعی a ، دو عدد $(5k + 9)$ و $(8k + 13)$ را عا د کند، ثابت کنید: $a = 1$ یا $a = 7$ (شهریور ۱۴۰۱)

۱۲۲. اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۷۰ که به صورت $2n + 3$ و $5n - 3$ بوده و نسبت به هم اول نیستند را به دست آورید.

۱۲۳. اگر $a > 1$ و $a \mid 4k + 5$ و $a \mid 7k + 6$ ، ثابت کنید a عددی اول است. (مشابه تمرین ۳ صفحه ۱۶ کتاب درسی)

۱۲۴. اگر $a > ۱$ ، $a \mid ۹k + ۴$ و $a \mid ۵k + ۳$ ، ثابت کنید a عددی اول است. (شهریور ۱۴۰۰)

۱۲۵. اگر k ای در $\mathbb{Z}$ باشد که داشته باشیم $4k + 2 \mid 5$ ، ثابت کنید: $16k^2 + 36k + 14 \mid 25$. (مشابه تمرین ۴ صفحه ۱۹ کتاب درسی)

۱۲۶. اگر عددی مانند k در $\mathbb{Z}$ باشد، به طوری که $5 \mid 4k + 1$ ، ثابت کنید: $25 \mid 16k^2 + 28k + 6$. (خرداد ۱۴۰۱)

۱۲۷. اگر $m, n \in \mathbb{Z}$ و $a, b \in \mathbb{Z}$ در این صورت ثابت کنید: $a \mid b \Rightarrow a^m \mid b^n$. $m \leq n$.
(تمرین ۸ صفحه ۱۶ کتاب درسی - شهریور ۱۴۰۰)

۱۳۸. اگر $a | b$ و $c | d$ ثابت کنید: $ac | bd$.

۱۳۹. اگر $a \mid b$ و $a \mid c$ نشان دهید که: $a \mid mb \pm nc$.

۱۳۰. ابتدا نشان دهید که $3 + 10^k$ بر ۳ بخش پذیر است و سپس ۹ عدد طبیعی متوالی بنابیند که هیچ کدام اول نباشند؟

یادداشت:

فصل ۱

آشنایی با نظریه اعداد

۱ عددی مانند $1 + \sqrt{2}$ یا $1 + \sqrt{3}$

۲ نادرست

۳ استنتاجی (اثبات مستقیم)

۴ درست، زیرا حاصل ضرب سه عدد متوالی هم بر عدد ۲ بخش پذیر است و هم بر عدد ۳ بخش پذیر است، در نتیجه به عدد ۶ بخش پذیر است.

۵ درست، (استدلال استنتاجی)

$$\begin{cases} a = 2k + 1 \\ b = 2k' + 1 \end{cases} \Rightarrow a + b = 2k + 1 + 2k' + 1 = 2k + 2k' + 2 = 2(k + k' + 1) = 2k''$$

عدد زوج k''

۶ نادرست، مثال نقض: $2^n - 1 \xrightarrow{(n=4)} 2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$
۱۵ عدد اول نیست.

۷ نادرست، مثال نقض: $x = 0$

۸ درست

۹ درست

۱۰ نادرست، مثال نقض: $n = 4$ که $3^4 + 4 = 85$ عدد اول نیست.

۱۱ نادرست، چون $|a| = |b| \Rightarrow a = \pm b$

۱۲ نادرست، مثال نقض:

$$\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \sqrt{4+9} \neq \sqrt{4} + \sqrt{9} \Rightarrow \sqrt{13} \neq 5$$

۱۳ درست، زیرا برای a دو حالت ممکن است، رخ دهد:

حالت اول اگر $a = 0$ در این حالت حکم برقرار است، زیرا $a \times b = 0$

حالت دوم اگر $a \neq 0$ در این حالت a^{-1} (معکوس a) یک عدد حقیقی است و با ضرب طرفین رابطه $ab = 0$ در a^{-1} داریم:

$$ab = 0 \Rightarrow a^{-1}(ab) = a^{-1} \times 0 \Rightarrow b = 0$$

بنابراین در دو حالت حکم برقرار است.

۱۴ نادرست، مثال نقض:

$$a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$$

$$\begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow -2 < 1 \text{ صحیح} \quad (-2)^2 < (1)^2$$

۱۵ نادرست، مثال نقض:

$$\begin{cases} a = \sqrt{2} \\ b = -\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow a + b = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0 \in \mathbb{Q}$$

عدد گویا $0 \in \mathbb{Q}$

۱۶ درست، $a = 2k + 1$ را به عنوان یک عدد فرد در نظر می‌گیریم و طرفین را به توان ۲ رسانده و از آن یک واحد کم می‌کنیم، حاصل باید مضرب ۸ باشد.
 $a = 2k + 1 \Rightarrow a^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1 = 4k(k + 1) = 4 \times 2k' = 8k'$

دقت کنید حاصل ضرب دو عدد صحیح متوالی مضرب ۲ است.

$$k(k + 1) = 2k'$$

۱۷ فرض می‌کنیم که سه عدد زوج متوالی به صورت $c = 2k + 4$ ($k \in \mathbb{Z}$) و $b = 2k + 2$ و $a = 2k$ باشد.

$$\begin{aligned} a \times b \times c &= (2k) \times (2k + 2) \times (2k + 4) \\ &= 2(k) \times 2(k + 1) \times 2(k + 2) = 8(k)(k + 1)(k + 2) = 8k' \end{aligned}$$

پس حاصل ضرب سه عدد زوج متوالی مضرب ۸ است.

۱۸ **الف** این حکم نادرست است. زیرا اگر $x = \frac{1}{p}$ ، آن‌گاه $x = \frac{1}{p} < x = \frac{1}{q}$

ب حکم درست است. زیرا اگر فرض کنیم $2k$ و $2k + 2$ دو عدد صحیح زوج متوالی باشند، آن‌گاه:

$$2k(2k + 2) = 2k(2(k + 1)) = 4k(k + 1) = 8k', k' \in \mathbb{Z}$$

۱۹ فرض کنیم $2k + 1$ و $2k' + 1$ ($k, k' \in \mathbb{Z}$) دو عدد صحیح فرد باشند، داریم:

$$\begin{aligned} (2k + 1)^2 + (2k' + 1)^2 &= (4k^2 + 4k + 1) + (4k'^2 + 4k' + 1) \\ &= 4k^2 + 4k'^2 + 4k + 4k' + 2 \\ &= 2(2k^2 + 2k'^2 + 2k + 2k' + 1) = 2k'' \quad (\text{عدد زوج}) \\ &\quad k'' \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

۲۰ **الف** فرض کنیم دو عدد فرد به صورت $2k + 1$ و $2k' + 1$ باشند ($k, k' \in \mathbb{Z}$). در این صورت داریم:

$$\begin{aligned} (2k + 1)^2 - (2k' + 1)^2 &= (4k^2 + 4k + 1) - (4k'^2 + 4k' + 1) \\ &= 4(k^2 + k - k'^2 - k') = 4k'', k'' \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

ب فرض کنیم x عدد صحیح و مضرب ۳ باشد، در این صورت:

$$\begin{aligned} x = 3k, k \in \mathbb{Z} &\Rightarrow x(x + 2) = 3k(3k + 2) \\ &= 9k(k + 1) = 9(2k') = 18k', k' \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

زوج

۲۱ فرض کنیم a ، $a + 1$ و $a + 2$ سه عدد صحیح متوالی باشند، داریم:

$$a + (a + 1) + (a + 2) = 3a + 3 = 3(a + 1) = 3a'$$

$a' \in \mathbb{Z}$

بنابراین حاصل جمع سه عدد صحیح متوالی مضرب ۳ است.

۲۲ از هر دو عدد متوالی یکی زوج است. دو عدد P و $P + 1$ متوالی می‌باشند و P زوج نمی‌باشد، (زیرا $P \geq 5$ است). بنابراین $P + 1$ زوج است. از طرفی از هر سه عدد متوالی یکی مضرب ۳ می‌باشد و P ، $P + 1$ و $P + 2$ سه عدد متوالی می‌باشند و چون P و $P + 2$ مضرب ۳ نمی‌باشند، لذا $P + 1$ مضرب ۳ است. $P + 1$ هم مضرب ۲ و هم مضرب ۳ می‌باشد و در نتیجه مضرب ۶ است.

۲۶ | هر یک از حالت‌های اعداد مجموعه S را بررسی می‌کنیم:

$$\frac{n^2(n+1)^2}{3}$$

$n=1 \rightarrow \frac{1^2(1+1)^2}{3} = \frac{4}{3}$ زوج نیست.
 $n=2 \rightarrow \frac{2^2(2+1)^2}{3} = \frac{4 \times 9}{3} = 4 \times 3 = 12$ زوج است.
 $n=3 \rightarrow \frac{3^2(3+1)^2}{3} = \frac{9 \times 16}{3} = 3 \times 16 = 48$ زوج است.
 $n=4 \rightarrow \frac{4^2(4+1)^2}{3} = \frac{16 \times 25}{3} = \frac{400}{3}$ زوج نیست.
 $n=5 \rightarrow \frac{5^2(5+1)^2}{3} = \frac{25 \times 36}{3} = 25 \times 12 = 300$ زوج است.

بنابراین حاصل به ازای اعداد مجموعه A زوج است و $n \in A$ می‌باشد.

۲۷ | a و b دو عدد صحیح است و چون ab عددی فرد است، بنابراین هر دو عدد a و b باید فرد باشند. فرض کنیم.

$$\begin{aligned}
 a &= 2k+1 \quad (k \in \mathbb{Z}) \\
 b &= 2k'+1 \quad (k' \in \mathbb{Z}) \\
 a^2 + b^2 + 4 &= (2k+1)^2 + (2k'+1)^2 + 4 \\
 &= 4k^2 + 4k + 1 + 4k'^2 + 4k' + 1 + 4 \\
 &= 4k^2 + 4k + 4k'^2 + 4k' + 6 = 2(\underbrace{2k^2 + 2k + 2k'^2 + 2k' + 3}_{k''}) = 2k''
 \end{aligned}$$

بنابراین $a^2 + b^2 + 4$ یک عدد زوج است.

۲۸ | فرض کنیم a یک عدد صحیح فرد باشد، در این صورت:

$$\begin{aligned}
 a &= 2m+1, \quad m \in \mathbb{Z} \\
 \Rightarrow a^2 &= (2m+1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4m(m+1) + 1 \quad (1)
 \end{aligned}$$

$m(m+1)$ حاصل ضرب دو عدد صحیح متوالی است، بنابراین عددی زوج است، پس:

$$m(m+1) = 2k \xrightarrow{(1)} a^2 = 4(2k) + 1 = 8k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}$$

۲۹ | فرض کنیم $6q+5$ و $6q'+5$ دو عدد دلخواه باشند، در این صورت:

$$\begin{aligned}
 (6q+5)(6q'+5) &= 36qq' + 30q + 30q' + 25 \\
 &= (36qq' + 30q + 30q' + 24) + 1 \\
 &= 6(\underbrace{6qq' + 5q + 5q' + 4}_k) + 1 = 6k + 1
 \end{aligned}$$

در واقع ثابت کرده‌ایم که اگر حاصل ضرب دو عددی که باقی‌مانده تقسیم آن‌ها بر ۶ برابر ۵ است را بر ۶ تقسیم کنیم، آن‌گاه باقی‌مانده تقسیم برابر ۱ می‌شود.

۳۰ | بسیاری از اعداد طبیعی را می‌توان به صورت حاصل جمع اعداد

متوالی نوشت. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

$$15 = 1+2+3+4+5, \quad 74 = 17+18+19+20$$

$$100 = 18+19+20+21+22$$

اما عدد ۸ را نمی‌توان به صورت مجموع اعداد متوالی نوشت. در واقع عدد ۸ مثال نقضی است که نشان می‌دهد هر عدد طبیعی را نمی‌توان به صورت مجموع اعداد متوالی نوشت.

۲۳ | چهار عدد صحیح متوالی را به ترتیب $k, k+1, k+2, k+3$ در

نظر می‌گیریم و حاصل ضرب آن‌ها به اضافه یک را می‌نویسیم.

$$\begin{aligned}
 (k)(k+1)(k+2)(k+3) + 1 &= (k^2 + 3k)(k^2 + 3k + 2) + 1 \\
 &= (k^2 + 3k)^2 + 2(k^2 + 3k) + 1 \\
 &= (k^2 + 3k + 1)^2 \quad \text{مربع کامل}
 \end{aligned}$$

در دو جمله ضرب می‌کنیم. در هم ضرب می‌کنیم.

۲۴ | برای اثبات دو حالت در نظر می‌گیریم.

حالت اول | n زوج است. به عبارت دیگر $n = 2k, (k \in \mathbb{N})$ در این

$$\begin{aligned}
 \text{حالت داریم: } n^2 + 5n - 9 &= (2k)^2 + 5(2k) - 9 = 4k^2 + 10k - 9 \\
 &= 4k^2 + 10k - 10 + 1 = 2(2k^2 + 5k - 5) + 1 = 2k' + 1
 \end{aligned}$$

که حاصل یک عدد فرد است. k'

حالت دوم | n فرد است. به عبارت دیگر $n = 2k-1, (k \in \mathbb{N})$ در این

$$\begin{aligned}
 \text{حالت داریم: } n^2 + 5n - 9 &= (2k-1)^2 + 5(2k-1) - 9 \\
 &= 4k^2 - 4k + 1 + 10k - 5 - 9 \\
 &= 4k^2 + 6k - 14 + 1 = 2(\underbrace{2k^2 + 3k - 7}_{k'}) + 1 = 2k' + 1
 \end{aligned}$$

باز هم حاصل یک عدد فرد است.

در هر دو حالت $n^2 + 5n - 9$ یک عدد فرد می‌باشد.

ب) روش اول | برای اثبات دو حالت در نظر می‌گیریم.

حالت اول | n زوج است. به عبارت دیگر $n = 2k, (k \in \mathbb{N})$ در این

$$\begin{aligned}
 \text{حالت داریم: } 2n^2 + 6n - 12 &= 2(2k)^2 + 6(2k) - 12 \\
 &= 8k^2 + 12k - 12 = 2(\underbrace{4k^2 + 6k - 6}_{k'}) = 2k'
 \end{aligned}$$

که حاصل یک عدد زوج است. k'

حالت دوم | n فرد است. به عبارت دیگر $n = 2k-1, (k \in \mathbb{N})$ در این

حالت داریم:

$$\begin{aligned}
 2n^2 + 6n - 12 &= 2(2k-1)^2 + 6(2k-1) - 12 \\
 &= 8k^2 - 8k + 2 + 12k - 6 - 12 \\
 &= 8k^2 + 4k - 16 = 2(\underbrace{4k^2 + 2k - 8}_{k'}) = 2k'
 \end{aligned}$$

باز هم حاصل یک عدد زوج است.

در هر دو حالت $2n^2 + 6n - 12$ یک عدد زوج می‌باشد.

روش دوم | توجه کنید که به صورت مستقیم هم می‌توانیم اثبات کنیم.

برای این کار داریم:

$$2n^2 + 6n - 12 = 2(\underbrace{n^2 + 3n - 6}_k) = 2k \Rightarrow$$

۲۵ | عدد زوج $n = 2k (k \in \mathbb{Z})$ را در نظر می‌گیریم.

$$\begin{aligned}
 n = 2k &\Rightarrow n^2 - 5n + 7 = (2k)^2 - 5(2k) + 7 \\
 &= 4k^2 - 10k + 6 + 1 = 2(\underbrace{2k^2 - 5k + 3}_{k'}) + 1 = 2k' + 1
 \end{aligned}$$

در نتیجه $n^2 - 5n + 7$ عددی فرد است.

$$a = 2k + 1 \Rightarrow a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$= 2(\underbrace{2k^2 + 2k}_{k'}) + 1 \Rightarrow a^2 = 2k' + 1$$

مربع هر عدد فرد، عددی فرد است.

۴۴ | آ | نادرست است. مثال نقض $x = 2/1$ ، در فرض صدق می‌کند ولی در حکم صدق نمی‌کند.

ب | درست است، بنابراین با استفاده از اثبات مستقیم، حکم را ثابت می‌کنیم.

$$\text{فرض: } x = \frac{a}{b}, y = \frac{c}{d} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z}, b, d \neq 0)$$

$$x + y = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \in \mathbb{Q}$$

صورت و مخرج کسر عددی صحیح است و $bd \neq 0$ در نتیجه $x + y$ گویا است.

۴۵ | آ | نادرست است، زیرا اگر $a = 3$ و $b = 2$ ، آن‌گاه $a + b = 5$ عدد اول است.

ب | درست است، زیرا اگر $x = 2k + 1$ (عدد فرد) باشد که در آن $k \in \mathbb{Z}$ ، آن‌گاه:

$$x(x + 2) = (2k + 1)(2k + 3) = 4k^2 + \underbrace{6k + 2k}_{4k} + 3$$

$$= 2(\underbrace{2k^2 + 4k + 1}_{k'}) + 1 = 2k' + 1$$

بنابراین $x(x + 2)$ یک عدد فرد است.

۴۶ | آ | طبق تعریف برهان خلف، در جاهای خالی به ترتیب داریم:

نادرست - درست - غیرممکن (متضاد) - نادرست - درستی

۴۷ | طبق برهان خلف، ثابت می‌شود که حاصل جمع یک عدد گویا و

یک عدد گنگ، عددی گنگ است.

اثبات: فرض کنیم که a یک عدد گویا و x یک عدد گنگ باشد. می‌خواهیم

ثابت کنیم که $a + x$ یک عدد گنگ است. اگر $a + x$ گنگ نباشد (فرض

خلف)، بنابراین عددی گویا است. از طرفی می‌دانیم که تفاضل دو عدد گویا،

عددی گویا است. پس تفاضل $a + x$ و a باید عددی گویا باشد، یعنی:

$$a + x - a \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$$

که $x \in \mathbb{Q}$ با فرض مسأله تناقض دارد و در نتیجه فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

۴۸ | طبق برهان خلف، ثابت می‌شود که حاصل ضرب هر عدد گویای

ناصفر در یک عدد گنگ، عددی گنگ است.

اثبات: فرض کنیم a یک عدد گویای ناصفر باشد و x عددی گنگ باشد

ولی ax عددی گویا (فرض خلف) باشد. می‌دانیم که حاصل ضرب هر دو

عدد گویا، عددی گویاست. علاوه بر این معکوس هر عدد گویای ناصفر هم

عددی گویا است. بنابراین داریم:

$$\frac{1}{a}(ax) \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$$


که با فرض در تناقض است.

۳۱ | اگر مثال نقض را $y = \sqrt{2}$ و $x = -\sqrt{2}$ در نظر بگیریم، آن‌گاه:

$$x + y = -\sqrt{2} + \sqrt{2} = 0 \in \mathbb{Q}$$

$$xy = (-\sqrt{2})(\sqrt{2}) = -2 \in \mathbb{Q}, \quad \frac{x}{y} = \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -1 \in \mathbb{Q}$$

و اگر $x = 1 + \sqrt{2}$ و $y = \sqrt{2}$ آن‌گاه $x - y = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{2} = 1 \in \mathbb{Q}$



۳۲ | مثال نقض: در مثلث منفرجه الزاویه

مقابل، ارتفاع AH خارج مثلث واقع می‌شود:

۳۳ | نادرست. $a = 1$ یا $b = 1$ درست است، زیرا:

$$(a - 1)(b - 1) = 0 \Rightarrow a - 1 = 0 \text{ یا } b - 1 = 0 \Rightarrow a = 1 \text{ یا } b = 1$$

پس به عنوان مثال نقض اگر $a = 1$ و $b = 4$ باشد، آن‌گاه:

$$(a - 1)(b - 1) = 0$$

۳۴ | مثال نقض $x = \frac{1}{2}$ ، پس:

$$3^{\frac{1}{2}} \geq 3 \Rightarrow \sqrt{3} \geq 3$$

۳۵ | مثال نقض $x = \sqrt{2}$ و $y = -2\sqrt{2}$ ،

$$\frac{2x + y}{2x - y} = \frac{2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}} = \frac{0}{4\sqrt{2}} = 0 \in \mathbb{Q}$$

۳۶ | با قرار دادن $n = 41$ ، عدد $n^2 + n + 41$ بر ۴۱ بخش‌پذیر

است زیرا $41^2 + 41 + 41 = 41(41 + 1 + 1) = 41 \times 43$ (مثال نقض)،

بنابراین عدد غیراول می‌باشد. (توجه کنید تمام اعداد طبیعی مضرب ۴۱،

مثال نقض خواهند بود.)

۳۷ | مثال نقض: اگر $a = \sqrt{2}$ و $b = \sqrt{8}$ و $c = \sqrt[3]{3}$ باشد، آن‌گاه:

$$abc^3 = (\sqrt{2})(\sqrt{8})(\sqrt[3]{3})^3 = \sqrt{16} \times 3 = 4 \times 3 = 12 \in \mathbb{Q}$$

۳۸ | مثال نقض: اگر $R = \frac{1}{\pi}$ (شعاع دایره) قرار دهیم، آن‌گاه:

$$2\pi R = 2\pi\left(\frac{1}{\pi}\right) = 2 \in \mathbb{Q}$$

۳۹ | اگر $x = \sqrt{2}$ و $y = -\sqrt{2}$ ، آن‌گاه: $x + y = 0 \in \mathbb{Q}$

۴۰ | اگر $n = 5$ ، آن‌گاه عدد $3^n + 2 = 3^5 + 2 = 245$ یک عدد مرکب

است (۲۴۵ بر ۵ بخش‌پذیر است).

۴۱ | اگر $x = 2$ و $y = 0$ ، آن‌گاه $xy = 0$ ولی $x \neq 0$

۴۲ | اگر $a = c = 2$ و $b = 1$ ، آن‌گاه $b\sqrt{ac} = 2$ یک عدد گویا است.

۴۳ | آ | نادرست است. زیرا طبق مثال نقض $n = 3$ عدد

$$2^n + 1 = 2^3 + 1 = 9$$

ب | درست است، عدد $a = 2k + 1$ را یک عدد فرد در نظر می‌گیریم.

۴۹ | طبق تعریف اگر ارزش دو گزاره یکسان باشد، آن‌ها را گزاره‌های هم‌ارز (هم‌ارزش) می‌نامند.

۵۰ | طبق اثبات بازگشتی، ثابت می‌شود که میانگین حسابی دو عدد نامنفی، از میانگین هندسی آن‌ها کم‌تر نیست.

اثبات: اگر a و b دو عدد نامنفی باشند، حکم ما چنین خواهد بود:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \Leftrightarrow a+b \geq 2\sqrt{ab}$$

پس:

$$\Leftrightarrow a+b-2\sqrt{ab} \geq 0 \Leftrightarrow (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$$

این گزاره همیشه درست است.

۵۱ | آ، درست است، زیرا اگر n زوج باشد، آن‌گاه n^2 زوج است و اگر n^2 زوج باشد، آن‌گاه n زوج است.

$$n=2k \Rightarrow n^2=(2k)^2=4k^2=2(\underbrace{2k^2}_{k'})=2k'$$

در نتیجه n^2 زوج است.

برای اثبات عکس قضیه شرطی یعنی اگر n^2 زوج باشد، آن‌گاه n زوج است از برهان خلف استفاده می‌کنیم.

برهان خلف: فرض می‌کنیم که n زوج نباشد، پس n فرد است.

$$n=2k+1 \Rightarrow n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1$$

$$=2(\underbrace{2k^2+2k}_{k'})+1=2k'+1$$

با فرض تناقض دارد. پس فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود. بنابراین زوج بودن n و زوج بودن n^2 هم‌ارز هستند.

۵۲ | نادرست است. زیرا می‌توانیم برای رد کردن این حکم از مثال نقض استفاده کنیم.

$$\alpha=1+\sqrt{2}, \beta=1-\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \alpha+\beta=1+\sqrt{2}+1-\sqrt{2}=2 \in \mathbb{Q}$$

ولی $\alpha-\beta=1+\sqrt{2}-(1-\sqrt{2})=1+\sqrt{2}+1+\sqrt{2}=2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

۵۳ | درست است، زیرا طبق برهان خلف می‌توانیم ثابت کنیم.

فرض می‌کنیم که $x=2$ (فرض خلف).

$$x^3+2y=10 \xrightarrow{x=2} 2^3+2y=10 \Rightarrow 2y=10-8$$

$$\Rightarrow 2y=2 \Rightarrow y=\frac{2}{2}=1$$

که با فرض مسئله در تناقض است. فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

۵۴ | نادرست است، زیرا طبق اثبات بازگشتی داریم:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} < 2 \Leftrightarrow \frac{x^2+y^2}{xy} < 2 \Leftrightarrow x^2+y^2 < 2xy \Leftrightarrow x^2-2xy+y^2 < 0$$

$$\Leftrightarrow (x-y)^2 < 0$$

به ازای هیچ x و y برقرار نیست.

۵۵ | نادرست است. زیرا:

$$x^2+y^2=(x+y)^2 \Rightarrow x^2+y^2=x^2+2xy+y^2$$

$$\Rightarrow 2xy=0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ \text{یا} \\ y=0 \end{cases}$$

پس اعداد صحیح مانند $x=0$ و $y=2$ وجود دارد که رابطه برقرار است.

۵۶ | ابتدا حکم مسئله را نقیض می‌کنیم. فرض کنیم n فرد باشد، $n=2k+1, (k \in \mathbb{Z})$ یک عدد صحیح فرد است (فرض خلف).

$$n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=2(\underbrace{2k^2+2k}_{k'})+1=2k'+1$$

n^2 یک عدد فرد می‌شود که با فرض مسئله تناقض دارد. پس فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

۵۷ | ابتدا حکم مسئله را نقیض می‌کنیم. فرض می‌کنیم که $3+\sqrt{5}$ گنگ نباشد یعنی $3+\sqrt{5}$ گویا است (فرض خلف). پس آن را به صورت کسر گویای زیر در نظر می‌گیریم.

$$3+\sqrt{5}=\frac{a}{b}, (b \neq 0) \Rightarrow \underbrace{\sqrt{5}}_{\text{گنگ}}=\frac{a}{b}-3=\frac{a-3b}{b} \in \mathbb{Q}$$

به تناقض در یک تساوی رسیدیم، بنابراین فرض خلف باطل و حکم که $3+\sqrt{5}$ عدد گنگ است، ثابت می‌شود.

۵۸ | ابتدا حکم مسئله را نقیض می‌کنیم. فرض می‌کنیم که $h=f-g$ در $x=a$ پیوسته است (فرض خلف).

$$(f-g)(x)=h(x)$$

$$\Rightarrow f(x)-g(x)=h(x) \Rightarrow g(x)=f(x)-h(x)$$

تفاضل دو تابع پیوسته نیز پیوسته است. پس:

$$\underbrace{g(x)}_{\text{در } x=a \text{ پیوسته}} = \underbrace{f(x)-h(x)}_{\text{در } x=a \text{ پیوسته}}$$

به تناقض در تساوی رسیدیم بنابراین فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

۵۹ | فرض کنیم n فرد نباشد، پس n یک عدد زوج است (فرض خلف)، داریم: $n=2k, k \in \mathbb{N} \Rightarrow 5n+3=5(2k)+3=10k+3=2(\underbrace{5k+1}_{k'})+1, k' \in \mathbb{N}$

یعنی $5n+3$ یک عدد فرد است که با فرض در تناقض است، لذا فرض خلف باطل و حکم صحیح است.

۶۰ | فرض کنیم $\sqrt{1+\sqrt{2}}$ یک عدد گنگ نباشد، پس یک عدد گویا است (فرض خلف)، داریم:

$$\sqrt{1+\sqrt{2}}=a, a \in \mathbb{Q}-\{0\} \xrightarrow{\text{به توان } 2} 1+\sqrt{2}=a^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{2}=a^2-1 \Rightarrow \text{عدد گنگ} = \text{عدد گویا}$$

(البته می‌دانیم که هر عدد گویا به توان ۳ باز هم گویا است.)
این تناقض (برابری عدد گویا با عدد گنگ) نشان می‌دهد فرض خلف باطل و حکم صحیح است.

۶۶ | برای اثبات چون به ازای اعداد حقیقی مانند x است بنابراین حداقل یک عدد حقیقی باید به دست آوریم.

$$x^2 < x^2 \Leftrightarrow x^2 - x^2 < 0 \Leftrightarrow x^2(x-1) < 0$$

x	۰	۱
x^2	+	+
$x-1$	-	+
	-	+

مجموعه جواب $= (-\infty, 0) \cup (0, 1)$

و این نامساوی به ازای بازه $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$ دارای جواب می باشد.

۶۷ | فرض کنیم n مضرب ۵ نباشد (فرض خلف)، در این صورت بنابر قضیه تقسیم داریم:

$$n = 5q + r, r \in \{1, 2, 3, 4\}$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} n^3 &= (5q + r)^3 = 125q^3 + 75q^2r + 15qr^2 + r^3 \\ &= 5(25q^3 + 15q^2r + 3qr^2) + r^3 \\ &= 5q' + r^3, q' \in \mathbb{Z}, r^3 \in \{1, 8, 27, 64\} \end{aligned}$$

هیچ یک از r^3 ها مضرب ۵ نمی باشند، در نتیجه n^3 مضرب ۵ نمی باشد که با فرض مسئله در تناقض است.
با این تناقض معلوم می شود که فرض خلف باطل است و در نتیجه حکم درست است، یعنی n مضرب ۵ است.

۶۸ | فرض کنیم نتیجه مطلوب یعنی $AB \neq AC$ درست نباشد (فرض خلف)، بنابراین $AB = AC$ و در نتیجه مثلث ABC متساوی الساقین است. می دانیم در مثلث متساوی الساقین، نیمساز وارد بر قاعده، میانه نیز می باشد، بنابراین AD میانه مثلث ABC است و در نتیجه $BD = DC$ ، که با فرض $BD \neq DC$ در تناقض است. بنابراین فرض خلف نادرست است و در نتیجه $AB \neq AC$

۶۹ | فرض کنیم $2x + \frac{\sqrt{3}}{2}$ عدد گنگ نباشد، پس یک عدد گویا است (فرض خلف). بنابراین:

$$2x + \frac{\sqrt{3}}{2} = a, a \in \mathbb{Q} \Rightarrow 4x + \sqrt{3} = 2a \Rightarrow \sqrt{3} = 2a - 4x$$

عدد گویا عدد گنگ

با این تناقض معلوم می شود که فرض خلف باطل و در نتیجه حکم درست است.

۷۰ | فرض کنیم $\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{7}}$ عدد گنگ نباشد، لذا یک عدد گویا است (فرض خلف). بنابراین:

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{7}} = a, a \in \mathbb{Q}, a \neq 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} + \sqrt{7} = \frac{1}{a} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{1}{a} - \sqrt{7}$$

$$\xrightarrow{\text{به توان ۲ می رسانیم}} 3 = \frac{1}{a^2} - \frac{2}{a}\sqrt{7} \Rightarrow \frac{2}{a}\sqrt{7} = \frac{1}{a^2} - 3$$

$$\Rightarrow \sqrt{7} = \frac{1}{2a} + \frac{3a}{2} \Rightarrow \text{عدد گویا} = \text{عدد گنگ}$$

با این تناقض (برابری عدد گویا و عدد گنگ)، معلوم می شود که فرض خلف باطل و در نتیجه حکم درست است.

۶۱ | فرض کنیم که a یک عدد گویا و x یک عدد گنگ باشد. نشان می دهیم که $a + x$ یک عدد گنگ است.

فرض خلف: فرض کنیم $a + x$ گویا باشد. چون تفاضل دو عدد گویا عددی گویا است پس $a + x - a \in \mathbb{Q}$ یعنی $x \in \mathbb{Q}$ و این با فرض گنگ بودن x تناقض دارد. پس با فرض خلف در تناقض است و حکم ثابت می شود.

۶۲ | فرض کنیم $a = 3\sqrt{2} + \sqrt{5}$ عدد گویا باشد (فرض خلف)، داریم:

$$3\sqrt{2} + \sqrt{5} = a, a \in \mathbb{Q} - \{0\}$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{2} = a - \sqrt{5} \xrightarrow{\text{به توان ۲}} 18 = a^2 + 5 - 2a\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow 2a\sqrt{5} = a^2 - 13 \Rightarrow \sqrt{5} = \frac{a^2 - 13}{2a} \Rightarrow \text{عدد گویا} = \text{عدد گنگ}$$

این تناقض (برابری عدد گویا با عدد گنگ) نشان می دهد فرض خلف باطل و حکم صحیح است.

۶۳ | فرض خلف: فرض می کنیم $\frac{1}{x}$ گنگ نباشد پس گویا است. چون می دانیم وارون هر عدد گویای ناصفر یک عدد گویا است پس وارون $\frac{1}{x}$ یعنی x هم یک عدد گویا است. با فرض مسئله به تناقض رسیدیم پس فرض خلف باطل و حکم ثابت می شود.

۶۴ | با استفاده از برهان خلف ثابت می کنیم.

اگر $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2)(a_3 - b_3)$ زوج نباشد، (فرض خلف) پس عددی فرد است. پس هر سه عامل $(a_1 - b_1), (a_2 - b_2)$ و $(a_3 - b_3)$ هم باید عدد فرد باشند. (زیرا اگر یک عدد زوج وجود داشته باشد، حاصل ضرب زوج می شود) و در نتیجه مجموع آن ها هم باید عدد فرد باشد، یعنی $(a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + (a_3 - b_3)$ باید عدد فرد باشد، اما چون اعداد یکسان است و فقط جابجا شده اند، مجموع این سه عبارت برابر صفر است که عددی زوج است و مجموع فرد نمی شود. با این تناقض، فرض خلف باطل و حکم ثابت می شود.

۶۵ | برای آن که مسئله را بهتر بفهمیم می توانیم برای a_1 تا a_5 به ترتیب اعداد ۱ تا ۵ را در نظر بگیریم و برای b_1 تا b_5 به ترتیب اعداد ۲، ۴، ۱، ۵ و ۳ را در نظر بگیریم. داریم:

$$(a_1 - b_1)(a_2 - b_2) \cdots (a_5 - b_5) = (1-2)(2-4)(3-1)(4-5)(5-3) = (-1)(-2)(2)(-1)(2) = -8$$

یک عدد زوج می باشد.

اگر $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2)(a_3 - b_3)(a_4 - b_4)(a_5 - b_5)$ زوج نباشد (فرض خلف) پس عدد فرد است. پس هر پنج عامل $a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3, a_4 - b_4$ و $a_5 - b_5$ هم باید عدد فرد باشند (زیرا اگر یک عدد زوج وجود داشته باشد، حاصل ضرب زوج می شود) و در نتیجه مجموع آن ها هم باید عدد فرد باشد، یعنی $(a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + (a_3 - b_3) + (a_4 - b_4) + (a_5 - b_5)$ باید عدد فرد باشد. اما چون اعداد یکسان است و فقط جابجا شده اند مجموع این پنج عبارت صفر است و مجموع فرد نمی شود. با این تناقض، فرض خلف باطل و حکم ثابت می شود.

روش اول فرض کنیم $d \parallel d'$ و $d'' \parallel d'$ ولی $d \nparallel d''$ (فرض خلف).
دو خط d و d'' موازی نیستند، بنابراین همدیگر را در یک نقطه مانند A قطع می‌کنند. پس از نقطه A دو خط متمایز d و d'' به موازات d' رسم شده است که با اصل توازی (از هر نقطه خارج یک خط، فقط یک خط به موازات خط مفروض می‌توان رسم کرد). در تناقض است. با این تناقض فرض خلف باطل و در نتیجه حکم درست است.

روش دوم فرض کنیم $d \parallel d''$ (فرض خلف) بنابراین خط d و d'' متقاطع هستند. چون $d' \parallel d''$ است، پس هر خطی که d'' را قطع کند، خط d' را نیز قطع می‌کند، بنابراین خط d خط d' را نیز قطع می‌کند، چرا که خط d'' را قطع کرده است و این تناقض با فرض $d \parallel d'$ است. پس فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

۷۵ بله، اگر یکی از اعداد a یا b عدد صفر باشند، به ازای هر عدد صحیح دیگر این تساوی برقرار است.

$$a^2 + b^2 = (a - b)^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\Rightarrow -2ab = 0 \Rightarrow ab = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ \text{یا} \\ b = 0 \end{cases}$$

۷۶ چون هر دو عدد x و y اعداد حقیقی مثبت است، طرفین نامساوی را به توان ۲ می‌رسانیم.

$$x + y \geq 2\sqrt{xy} \Leftrightarrow (x + y)^2 \geq (2\sqrt{xy})^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 \geq 4xy \Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 - 4xy \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \Leftrightarrow (x - y)^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}).$$

۷۷ $a + \frac{1}{a} \geq 2 \xrightarrow{a > 0} a^2 + 1 \geq 2a$

$$\Leftrightarrow a^2 - 2a + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (a - 1)^2 \geq 0$$

درستی عبارت بدیهی است.

۷۸ فرض می‌کنیم که حکم درست است پس باید به یک رابطه بدیهی برسیم.

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2}{xy} \geq 2 \xrightarrow{\frac{xy}{xy} > 0} x^2 + y^2 \geq 2xy$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2xy \geq 0 \Leftrightarrow (x - y)^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}).$$

۷۹ اگر a و b دو عدد حقیقی نامنفی باشد، برای درستی حکم باید به یک رابطه بدیهی برسیم.

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab} \xrightarrow{\text{طرفین به توان ۲}} \left(\frac{a + b}{2}\right)^2 \geq (\sqrt{ab})^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{4} \geq ab \Leftrightarrow a^2 + b^2 + 2ab \geq 4ab$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + 2ab - 4ab \geq 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2ab \geq 0 \Leftrightarrow (a - b)^2 \geq 0 \quad (\text{گزاره همیشه درست})$$

۷۱ فرض کنیم $\log_2 5$ یک عدد گنگ نباشد (فرض خلف)، بنابراین $\log_2 5$ یک عدد گویا است و داریم:

$$\log_2 5 = \frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{N} \quad (\log_2 5 \text{ یک عدد مثبت است}).$$

$$\Rightarrow 5 = 2^{\frac{a}{b}} \xrightarrow{\text{به توان } b} 5^b = 2^a \quad (a, b \neq 0)$$

سمت چپ تساوی آخر یک عدد فرد و 2^a یک عدد زوج است و این دو عدد نمی‌توانند با هم برابر باشند. بنابراین با این تناقض نتیجه می‌شود که فرض خلف باطل و در نتیجه حکم درست است.

۷۲ با توجه به فرض مسأله، α و β دو عدد گنگ هستند و $\alpha + \beta$ گویا می‌باشد. ابتدا فرض می‌کنیم که $\alpha - \beta$ گنگ نیست (فرض خلف). بنابراین $(\alpha - \beta)$ گویا است و می‌دانیم که مجموع دو عدد گویا یک عدد گویا است و $\alpha + \beta$ و $\alpha - \beta$ را با یکدیگر جمع می‌کنیم.

$$(\alpha - \beta) + (\alpha + \beta) = 2\alpha \quad \text{گویا است.}$$

با فرض مسأله که α گنگ است به تناقض می‌رسیم بنابراین فرض خلف باطل و حکم که $\alpha - \beta$ گنگ است ثابت می‌شود.

هم چنین فرض می‌کنیم که $2\alpha + \beta$ گنگ نیست یعنی گویا است (فرض خلف). می‌دانیم تفاضل دو عدد گویا، عددی گویا است و $\alpha + \beta$ طبق فرض گویا است و $2\alpha + \beta$ نیز طبق فرض خلف گویا است. پس تفاضل این دو را می‌نویسیم.

$$2\alpha + \beta - (\alpha + \beta) = 2\alpha + \beta - \alpha - \beta = \alpha \quad \text{گویا}$$

با فرض مسأله که α گنگ است به تناقض می‌رسیم. بنابراین فرض خلف باطل و حکم که $2\alpha + \beta$ گنگ است ثابت می‌شود.

۷۳ فرض کنیم n مضرب ۶ نباشد (فرض خلف)، در این صورت بنابر قضیه تقسیم داریم:

$$n = 6q + r, \quad r \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$


(توجه کنیم که باقی‌مانده n بر ۶، صفر نیست).

$$n^2 = (6q + r)^2 = 36q^2 + 12qr + r^2 = 6(6q^2 + 2qr) + r^2$$

$$= 6q' + r^2, \quad q' \in \mathbb{Z}$$

که در آن $r^2 \in \{1, 4, 9, 16, 25\}$. هیچ یک از r^2 ها مضرب ۶ نمی‌باشند، بنابراین n^2 مضرب ۶ نمی‌باشد و با فرض مسأله در تناقض است. با این تناقض معلوم می‌شود که فرض خلف باطل است و در نتیجه حکم درست است، یعنی n مضرب ۶ است.

۷۴ خط d و نقطه A را خارج آن در نظر می‌گیریم. فرض کنیم دو خط متمایز d' و d'' از A گذشته و بر d عمود باشند (فرض خلف) و خط d را در نقاط متمایز H و M قطع کنند.



در مثلث AHM داریم:

$$\hat{A} + \hat{H} + \hat{M} = 180^\circ + \hat{A} > 180^\circ$$

با این تناقض نتیجه می‌شود فرض خلف باطل و در نتیجه حکم درست بوده است.

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz \quad | ۸۷$$

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{\times 2} 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 \geq 2xy + 2xz + 2yz \\ &\Leftrightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2xz - 2yz \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (x^2 - 2xy + y^2) + (x^2 - 2xz + z^2) + (y^2 - 2yz + z^2) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (x - y)^2 + (x - z)^2 + (y - z)^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}) \end{aligned}$$

آخرین گزاره برقرار است زیرا مجموع مربعات سه عبارت، همواره مثبت یا مساوی صفر است.

$$\begin{aligned} &\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq -2 \Leftrightarrow \frac{a^2 + b^2}{ab} \leq -2 \xrightarrow{ab < 0} a^2 + b^2 \geq -2ab \\ &\Leftrightarrow a^2 + b^2 + 2ab \geq 0 \Leftrightarrow (a + b)^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}) \end{aligned} \quad | ۸۸$$

$$\begin{aligned} &x^2 + y^2 \geq x^2y + xy^2 \Leftrightarrow \underline{x^2} + \underline{y^2} - \underline{x^2y} - \underline{xy^2} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x^2(x - y) + y^2(\underline{y - x}) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x^2(x - y) - y^2(x - y) \geq 0 \Leftrightarrow (x^2 - y^2)(x - y) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (x - y)(x^2 + xy + y^2)(x - y) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (x - y)^2(x^2 + xy + y^2) \geq 0 \\ &\text{با توجه به این که } x \text{ و } y < 0 \text{ است، رابطه بالا بدیهی است.} \end{aligned} \quad | ۸۹$$

$$\begin{aligned} &\frac{a}{b^2} + \frac{b}{a^2} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \Leftrightarrow \frac{a^2 + b^2}{a^2b^2} \geq \frac{a + b}{ab} \\ &\Leftrightarrow a^2 + b^2 \geq ab(a + b) \Leftrightarrow \underline{a^2} + \underline{b^2} - \underline{a^2b} - \underline{ab^2} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow a^2(a - b) + b^2(b - a) \geq 0 \Leftrightarrow a^2(a - b) - b^2(a - b) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (a - b)(a^2 - b^2) \geq 0 \Leftrightarrow (a - b)(a - b)(a + b) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (a - b)^2(a + b) \geq 0 \quad \text{با } a \text{ و } b \in \mathbb{R}^+ \text{ بنابراین بدیهی است.} \end{aligned} \quad | ۹۰$$

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} \geq \frac{4}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{b} + \sqrt{a}}{\sqrt{a} \times \sqrt{b}} \geq \frac{4}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \\ &\Leftrightarrow (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \geq 4\sqrt{ab} \Leftrightarrow a + b + 2\sqrt{ab} \geq 4\sqrt{ab} \\ &\Leftrightarrow a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0 \Leftrightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}) \end{aligned} \quad | ۹۱$$

$$\begin{aligned} &y^2 + 1 \geq 2x(y - x + 1) \Leftrightarrow y^2 + 1 \geq 2xy - 2x^2 + 2x \\ &\Leftrightarrow y^2 + 1 - 2xy + 2x^2 - 2x \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (y^2 - 2xy + x^2) + (x^2 - 2x + 1) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (x - y)^2 + (x - 1)^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}) \end{aligned} \quad | ۹۲$$

۸۰ | اگر a و b دو عدد نامنفی باشند، واسطه هندسی $\sqrt{ab}$ و واسطه حسابی $\frac{a+b}{2}$ است. داریم:

$$\begin{aligned} &\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \Leftrightarrow a + b \geq 2\sqrt{ab} \Leftrightarrow a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \quad \text{گزاره همیشه درست.} \end{aligned}$$

۸۱ | اگر a و b دو عدد حقیقی باشند، حکم ما برابر $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$ خواهد بود.

$$\begin{aligned} &ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \xrightarrow{\times 2} 2ab \leq a^2 + b^2 \Leftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (a - b)^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}) \end{aligned}$$

$$a^2 + b^2 \geq 2(b - 1) \Leftrightarrow a^2 + b^2 \geq 2b - 2 \quad | ۸۲$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2b + 2 \geq 0 \Leftrightarrow a^2 + 1 + b^2 - 2b + 1 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow a^2 + 1 + (b - 1)^2 \geq 0 \quad (\text{بدیهی است}) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{a+b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \Leftrightarrow \frac{1}{a+b} = \frac{a+b}{ab} \quad | ۸۳$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (a+b)^2 = ab \Leftrightarrow a^2 + 2ab + b^2 = ab \\ &\Leftrightarrow a^2 + ab + b^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \Delta = b^2 - 4b^2 = -3b^2 < 0 \\ > \text{ضرب } a^2 \end{cases} \end{aligned}$$

بنابراین، معادله جواب ندارد و هیچ مقدار حقیقی برای تساوی $\frac{1}{a+b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ وجود ندارد.

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \Leftrightarrow ab \leq \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{4} \quad | ۸۴$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow 4ab \leq a^2 + b^2 + 2ab \\ &\Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2ab \geq 0 \Leftrightarrow (a - b)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

درستی عبارت، بدیهی است.

$$x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y \xrightarrow{\times 2} 2x^2 + 2y^2 + 2 \geq 2xy + 2x + 2y \quad | ۸۵$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2 - 2xy - 2x - 2y \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (x^2 - 2xy + y^2) + (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 2y + 1) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (x - y)^2 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

درستی عبارت بدیهی است.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a+b} \xrightarrow[\text{می‌رسانیم}]{\text{به توان ۲}} a + b + 2\sqrt{ab} \geq a + b \quad | ۸۶$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{ab} \geq 0$$

درستی عبارت بدیهی است.