

فهرست

| FILM | پاسخ | درسنامه و سوالات | |
|--------|------|------------------|--|
| 44 min | ۱۳۳ | ۶ تا ۲۴ | فصل اول: آفرینش کیهان و تکوین زمین |
| 35 min | ۱۳۵ | ۲۵ تا ۴۳ | فصل دوم: منابع معدنی و ذخایرانزی، زیربنای تمدن و توسعه |
| 29 min | ۱۳۸ | ۴۴ تا ۶۶ | فصل سوم: منابع آب و خاک |
| 25 min | ۱۴۲ | ۶۷ تا ۸۲ | فصل چهارم: زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی |
| 15 min | ۱۴۵ | ۸۳ تا ۹۹ | فصل پنجم: زمین‌شناسی و سلامت |
| 20 min | ۱۴۹ | ۱۰۰ تا ۱۱۶ | فصل ششم: پویایی زمین |
| 12 min | ۱۵۲ | ۱۱۷ تا ۱۳۰ | فصل هفتم: زمین‌شناسی ایران |

نمونه سؤال امتحانی



- ۱۵۶ آزمون ۱: نوبت اول
- ۱۵۸ آزمون ۲: نوبت اول
- ۱۶۰ آزمون ۳: نوبت دوم
- ۱۶۲ آزمون ۴: نوبت دوم
- ۱۶۴ آزمون ۵: نوبت دوم
- ۱۶۶ پاسخ نامهٔ تشریحی آزمون اتا ۵

بارگذاری درس زمین‌شناسی

| شهریور و دی‌ماه | نوبت دوم | نوبت اول | شماره فصل |
|-----------------|----------|----------|-----------|
| ۳ | ۱/۵ | ۶ | اول |
| ۳/۵ | ۱/۵ | ۷ | دوم |
| ۳/۵ | ۲ | ۷ | سوم |
| ۲/۵ | ۴ | - | چهارم |
| ۲/۵ | ۴ | - | پنجم |
| ۳/۵ | ۴ | - | ششم |
| ۱/۵ | ۳ | - | هفتم |
| ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | جمع |



بخش



درستامه

و سؤالات تشریحی

فصل اول

آفرینش کیهان و تکوین زمین

از فصل اول زمین‌شناسی، ۶ نمره در نوبت اول، ۵/۱ نمره در نوبت دوم و ۳ نمره در نوبت شهربیور سؤال طرح می‌شود.

فصل اول

برای استفاده از فیلم آموزشی شب امتحان این فصل QR-code مقابل را اسکن کنید.

فیلم شب امتحان

صفحه ۹ تا ۱۲ کتاب درسی

بسته اول

مقدمه

پیدایش جهان (براساس نظریه مهبانگ)

نظریه مهبانگ: این نظریه به تئوری «بیگ‌بنگ» (Big Bang) مشهور است که دانشمندان، پیدایش جهان را با استفاده از آن توضیح می‌دهند.

کیهان

مجموعه‌ای از اجرام آسمانی می‌باشد که شامل:

- کهکشان‌ها
- منظومه‌ها
- ستاره‌ها
- سیاره‌ها و ...

نکته!

کهکشان‌های در حال دور شدن از یکدیگر و کیهان در حال گسترش است.



رخداد مهبانگ

کهکشان راه شیری

تشکیل منظومه شمسی


دانشمندان براین باورند که خداوند، جهان هستی را براساس اصول و قوانین آفریده است. آن‌ها با مطالعه و شناخت نظام حاکم بر آفرینش کیهان، به دنبال کشف رازهای خلقت هستند.

(صفحه ۱۰ کتاب درسی) - **جمع‌آوری اطلاعات**


سؤال در سال گذشته خواندید که دانشمندان پیدایش جهان را با نظریه مهبانگ توضیح می‌دهند. در این باره اطلاعات بیشتری جمع‌آوری و درباره پیدایش اجرام آسمانی با هم گفت و گو کنید.

آفرینش کیهان


پاسخ طبق نظریه مهبانگ:



کهکشان راه شیری (Milky Way Galaxy)



کهکشان راه شیری و موقعیت منظومه شمسی در آن




- در کیهان، صدها میلیارد کهکشان وجود دارد.
- کهکشان: از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره‌ای (غلب گاز و گرد و غبار) تشکیل شده‌اند که تحت تأثیر نیروی گرانش متقابل، یکدیگر را نگه داشته‌اند.
- منظومه: در هر کهکشان، تعدادی از اجرام مختلف، تحت تأثیر نیروهای گرانش متقابل، کنار هم جمع شده‌اند و منظومه‌ها را می‌سازند.

ویژگی‌های کهکشان راه شیری

- نواری مهمانند و کم نور شامل انبوی از اجرام در شب‌های صاف و بدون ابر، در مکانی که آسودگی نوری ندارد.
- یکی از بزرگ‌ترین کهکشان‌های شناخته شده است.
- شکلی مارپیچی دارد.
- منظومه شمسی ما، در لبه یکی از بازوی‌های آن قرار دارد.
- پیوند با عکاسی: عکس مقابل پخشی از کهکشان راه شیری در آسمان شب است که از رصدگاه کویر خارا در اصفهان تهیه شده است.

منظومه شمسی



نمایش نظریه زمین مرکزی

توجه حرکت ظاهری خورشید از سمت شرق به غرب است.

نظریه زمین مرکزی

- این نظریه توسط بطلمیوس، دانشمند یونانی مطرح گردید.
- بطلمیوس با توجه به حرکت ظاهری ماه و خورشید، به این نتیجه رسید که زمین در مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسمانی دیگر به دور آن می‌گردند.
- بر اساس این نظریه، زمین ثابت است و ماه و خورشید و پنج سیاره شناخته شده آن روزگار **عطارد** (تیر)، **زهره** (ناهید)، **مریخ** (بهرام)، **مشتری** (برجیس) و **زحل** (کیوان) در مدارهای دایره‌ای و مخالف حرکت عقربه‌های ساعت به دور آن می‌گردند.
- برخی از دانشمندان ایرانی همچون **ابوسعید سجزی** و **خواجہ نصیرالدین طوسی**، با اندازه‌گیری‌های دقیق و تفسیر درست یافته‌های علمی، ایرادهایی برای نظریه گرفتند.
- این نظریه در اروپا نیز مخالفانی داشت، ولی تا حدود قرن ۱۶ میلادی این نظریه مطرح بود.

دانشمندان علوم زمین


ابوسعید سجزی (۴۱۴ - ۳۲۰ هـ) ریاضی‌دان و ستاره‌شناس برجسته ایرانی در سیستان به دنیا آمد و در خراسان و شیراز به علم آموزی و مطالعه پرداخت. سجزی، نوعی اسٹرالاب ساخت و کتاب «ترکیب الافلاک»، «رساله فی کیفیة صنعة آلات النجومیه» و همچنین «رساله الاسطراطاب» از تألیفات او در ستاره‌شناسی و ریاضیات هستند که هر کدام دارای نوآوری‌ها و یافته‌های علمی فراوان می‌باشند.

نظریه خورشید مرکزی

- این نظریه توسط نیکولاوس کوپرنیک ستاره‌شناس لهستانی مطرح گردید.
- کوپرنیک با علم ریاضی به خوبی آشنا بود، با مطالعه حرکت سیارات در زمان‌های مختلف، نظریه خورشید مرکزی را بیان کرد:
- زمین همراه با ماه و دیگر سیاره‌ها در مدار دایره‌ای و مخالف حرکت عقربه‌های ساعت به دور خورشید می‌گردد.
- حرکت روزانه خورشید در آسمان، ظاهری بوده و نتیجه چرخش زمین به دور محور خود است.
- یوهانس کپلر به بررسی دقیق یادداشت‌های ستاره‌شناسان پرداخت و دریافت که سیارات در مدارهای بیضوی، به دور خورشید در حرکت می‌باشند و با ارائه سه قانون نظریه خورشید مرکزی را اصلاح نمود.

قوانين کپلر

- قانون اول: هر سیاره در مداری بیضوی، چنان به دور خورشید می‌گردد که خورشید همواره در یکی از دو کانون آن قرار دارد.



(صفحة ۱۲ کتاب درسی) - **یادآوری**


سؤال با توجه به این‌که حدود $8/3$ دقیقه نوری طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد، فاصله متوسط زمین تا خورشید چند کیلومتر است؟

به این فاصله در ستاره‌شناسی چه می‌گویند؟

$$8/3 \times 60 \times 300,000 = 149,400,000 \approx 150,000,000$$

پاسخ

در ستاره‌شناسی به این فاصله یک واحد نجومی یا یک واحد ستاره‌شناسی می‌گویند.



قانون دوم: هر سیاره، چنان به دور خورشید می‌گردد که خط فرضی که سیاره را به خورشید وصل می‌کند، در مدت زمان‌های مساوی، مساحت‌های مساوی ایجاد می‌کند.

- قانون سوم: زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید (p)، با افزایش فاصله از خورشید (d) افزایش می‌یابد به طوری که مربع زمان گردش سیاره به دور خورشید، معادل مکعب فاصله آن سیاره تا خورشید است و رابطه زیرین آن‌ها برقرار است: (در این رابطه p بر حسب سال زمینی و d بر حسب واحد نجومی است).

$$p^2 \propto d^3$$

نکته!

مدت زمان گردش کامل آن طولانی‌تر می‌شود.

هرچه فاصله سیاره از خورشید بیشتر باشد.

(صفحة ۱۲ کتاب درسی) - **پیوند با ریاضی**

سؤال اگر مدار سیاره‌ای در فاصله $10^6 \times 600$ کیلومتری خورشید قرار داشته باشد؛ زمان گردش آن به دور خورشید چند سال است؟

$$\frac{600 \times 10^6}{150 \times 10^6} = 4$$

پاسخ

$$d = 4$$

$$d^3 \propto p^2$$

$$4^3 \propto p^2 \Rightarrow 64 = \sqrt{64} = 8$$

پرسش‌های تشریحی

پرسش
۱

سوالات صحیح / غلط

۱. همه اجرام و پدیده‌های آسمانی به وسیله کاوشگران شناسایی شده‌اند.
۲. کوبنیک با مشاهده حرکت ظاهری ماه و خورشید، نظریه زمین مرکزی را رأیه داد.
۳. براساس نظریه خورشید مرکزی کوبنیک، زمین همراه با ماه، مانند دیگر سیاره‌ها مخالف حرکت عقربه‌های ساعت به دور خورشید می‌گردد.
۴. براساس نظریه زمین مرکزی، زمین ثابت و پنج سیاره شناخته شده آن روزگار، در مدارهایی بیضوی به دور زمین می‌گردند.
۵. حرکات ظاهری خورشید از غرب به شرق است.
۶. (P) در رابطه قانون سوم کپلر، برحسب سال زمینی است.
۷. نور خورشید حدود ۵ دقیقه نوری طول می‌کشد تا به زمین برسد.

سوالات جای خالی

۸. ستاره‌ها و سیاره‌هایی که در آسمان شب می‌توان دید، تنها تعداد اندکی از میلیاردها جرم آسمانی در ----- است.
۹. اندازه‌گیری‌های نجومی نشان می‌دهند که کیهان در حال ----- است و کهکشان‌ها در حال ----- از پک دیگر هستند.
۱۰. دانشمندان براین باورند که خداوند، جهان هستی را براساس ----- آفریده است.
۱۱. کهکشان‌ها، از تعداد زیادی -----، ----- و ----- تشکیل شده‌اند که تحت تأثیر -----، یک دیگر را نگه داشته‌اند.
۱۲. یکی از بزرگ‌ترین کهکشان‌های شناخته شده، ----- است.
۱۳. کهکشان راه شیری، شکلی ----- دارد که منظومه شمسی ما، در لبه یکی از ----- آن قرار دارد.

سوالات دوگزینه‌ای

۱۴. اگر در شب‌های صاف و بدون ابر، در مکانی که آلودگی نوری (دارد - ندارد)، به آسمان نگاه کنید، نواری مه‌مانند و (کم نور - پر نور)، شامل انبوهی از اجرام می‌بینید، این کهکشان راه شیری نام دارد.
۱۵. حرکت ظاهری خورشید از (شرق به غرب - غرب به شرق) است.
۱۶. بطلمیوس، با مشاهده حرکت ظاهری ماه و خورشید، نظریه (زمین مرکزی - خورشید مرکزی) را رأیه داد.
۱۷. برخی از دانشمندان ایرانی، با اندازه‌گیری‌های (دقیق - تقریبی) و تفسیر (درست - نادرست) یافته‌های علمی، ایرادهایی بر نظریه (زمین مرکزی - خورشید مرکزی) وارد کردند.
۱۸. مطابق با نظریه کوبنیک، زمین همراه با ماه، مانند دیگر سیاره‌ها با جهت (ساعتگرد - پاد ساعتگرد) به دور خورشید می‌گردد.
۱۹. براساس نظریه زمین مرکزی بطلمیوس، زمین (منتحرک - ثابت) است.
۲۰. براساس نظریه زمین مرکزی بطلمیوس، پنج سیاره شناخته شده آن روزگار در مدارهایی (دایره‌ای - بیضوی) به دور زمین می‌گردند.
۲۱. (کپلر - کوبنیک) با رأیه سه قانون، نظریه خورشید مرکزی را اصلاح نمود.

سوالات چهارگزینه‌ای

۲۲. در نظریه زمین مرکزی، مدار گردش خورشید در میان کدام جرم‌های آسمانی قرار می‌گیرد؟
 - (۱) مریخ و زهره
 - (۲) زهره و عطارد
 - (۳) عطارد و ماه
 - (۴) ماه و زمین
۲۳. کدام عبارت را می‌توان در دو نظریه زمین مرکزی و خورشید مرکزی به کار برد؟
 - (۱) زهره همیشه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد.
 - (۲) مدار گردش سیارات دایره‌ای شکل است.
 - (۳) سیارات در مدارهای بیضی شکل به دور مرکز منظومه می‌چرخد.
 - (۴) سرعت گردش انتقالی سیارات به دور مرکز، دائم در حال تغییر است.



(سپاسی ۹۸)

در کدام زمینه، به نظریه خورشید مرکزی کوپرنيک، ایراد وارد است؟ .۲۴

۱) شکل مدارگردش سیارات

۲) در نظر نگرفتن حرکت چرخشی سیارات

۳) همراهی ماه و زمین در گردش انتقالی به دور خورشید

۴) ظاهری بودن حرکت روزانه خورشید از چشم ناظر زمینی

(خارج از کشور ۹۸)

اجرام مختلف تشکیل دهنده یک کهکشان تحت تأثیر کدام نیروها در کنار هم قرار می‌گیرند؟ .۲۵

۱) گرانش متقابل ۲) گرانش هسته ۳) حاصل از انفجار اولیه ۴) الکترواستاتیک کولنی

(سپاسی ۱۴۰۰)

کدام عبارت را درست تر می‌دانید؟ .۲۶

۱) حرکت روزانه خورشید در آسمان ظاهری و نتیجه گردش زمین به دور خورشید است.

۲) هر چه فاصله زمین تا خورشید کمتر شود سرعت حرکت انتقالی زمین هم کمتر می‌شود.

۳) بین زمان گردش زمین به دور خورشید و فاصله زمین تا خورشید رابطه‌ای ریاضی برقرار است.

۴) زمین همراه با ماه در مدار دایره‌ای و مخالف حرکت عقره‌های ساعت به دور خورشید می‌گردد.

کشف ارتباط

هریک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آن‌ها را پیدا کنید. (یک مورد اضافه است.) .۲۷

| ((ب)) | ((الف)) |
|-----------------------------------|---------------------|
| ۱) حرکت سیارات در مدار دایره‌ای | الف) بطلمیوس |
| P ^۲ ∞ d ^۳ ۲ | ب) یوهانس کپلر |
| ۳) زمین مرکزگرا | ج) نیکولاوس کوپرنيک |
| | د) ویلسون |

سؤالات پاسخ کوتاه

اجزای تشکیل دهنده کیهان را نام ببرید. .۲۸

دانشمندان با مطالعه و شناخت نظام حاکم برآفرینش کیهان، به دنبال چه هستند؟ .۲۹

دانشمندان پیدایش جهان را با چه نظریه‌ای توضیح می‌دهند؟ .۳۰

نیکولاوس کوپرنيک چگونه به بیان نظریه خورشید مرکزی دست یافت؟ .۳۱

دانشمندان ایرانی مخالف نظریه زمین مرکزی، چگونه به ایجادهایی دست پیدا کردند؟ .۳۲

براساس نظریه خورشید مرکزی کوپرنيک، حرکت روزانه خورشید در آسمان چگونه است؟ .۳۳

پنج سیاره شناخته شده نظریه زمین مرکزی را نام ببرید. .۳۴

مطابق با قانون سوم کپلر، میان زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید (P) و فاصله از خورشید (d) چه رابطه‌ای وجود دارد؟ .۳۵

مطابق با قانون سوم کپلر، d بر حسب چیست؟ .۳۶

سؤالات پاسخ بلند



مفهوم نظریه خورشید مرکزی را از دید نیکولاوس کوپرنيک توضیح دهید. .۳۷

قوانين کپلر را توضیح دهید. .۳۸

نظریه زمین مرکزی را توضیح دهید. .۳۹

یک قطعه سنگ، هر ۸ سال یک بار به دور خورشید می‌گردد. فاصله این قطعه سنگ تا خورشید چند واحد نجومی است؟ .۴۰

سوالات تصویری



.۱۱ با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید.

آ) شکل مقابل، نشان دهنده کدام نظریه است؟

ب) دانشمندان را در این نظریه کیست و چگونه به این نظریه دست پیدا کرد؟

پ) مفهوم این نظریه را توضیح دهید.

ت) این نظریه تا چه قرنی مطرح بود و دانشمندان مخالف این نظریه را نام ببرید.

.۱۲ با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید.

آ) این شکل نمایانگر کدام قانون کپلر است؟ آن را توضیح دهید.

ب) نقاط C تا D نشان دهنده کدام ماه است؟

پ) در نقطه A فاصله زمین تا خورشید چقدر است؟

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

کهکشان راه شیری:

.۱۳

مه بانگ:

.۱۴

قانون اول کپلر:

.۱۵

قانون دوم کپلر:

.۱۶

بسته دوم



صفحه ۱۲ تا ۱۷ | کتاب درسی

حرکات زمین

أنواع حرکات زمین

۱ حرکت وضعی

چرخش زمین به دور محور خود را حرکت وضعی می‌گویند.

این چرخش در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت صورت می‌گیرد.

حرکت وضعی زمین حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد.

ایجاد شباهه روز:

محور زمین نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش خود به دور خورشید، $23\frac{1}{5}$ درجه انحراف دارد. این میزان انحراف سبب ایجاد اختلاف مدت زمان روز و شب در عرض‌های جغرافیایی مختلف می‌شود.

در مدار استوا (مدار صفر درجه)، طول مدت شب و روز در تمام مدت سال با هم برابر و معادل ۱۲ ساعت است (۱۲ ساعت روز و ۱۲ ساعت شب). در سایر نقاط، هر چه عرض جغرافیایی بیشتر شود، میزان اختلاف طول مدت شب و روز بیشتر می‌شود.

۲ حرکت انتقالی

گردش زمین به دور محور خورشید، بر روی مدار بیضوی شکل، حرکت انتقالی گفته می‌شود.

این گردش در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت است.

پیدایش فصل‌ها:


به علت کروی بودن زمین، زاویه تابش خورشید در عرض‌های جغرافیایی مختلف، در یک زمان، متفاوت است. به علت انحراف $23\frac{1}{5}$ درجه‌ای محور زمین، زوایای تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی نیز در طول سال، متفاوت است. این تفاوت زاویه، سبب ایجاد فصل‌های مختلف مخلّف کره زمین شده است.

فاصله زمین تا خورشید

- واحد نجومی: میانگین فاصله خورشید از زمین، حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر است که به آن یک واحد نجومی می‌گویند.

نکته!

فاصله زمین تا خورشید در طول سال پکسان نیست که به علت بیضوی شکل بودن مدار گردش زمین به دور خورشید است.



- فاصله زمین تا خورشید در اول دی ماه به حداقل ۱۴۷ میلیون کیلومتر یا حضيض خورشیدی) و در اول تیر ماه به حداکثر ۱۵۲ میلیون کیلومتر یا اوج خورشیدی) می‌رسد.

(صفحة ۱۳ کتاب درسی) - تحقیق کنید

سؤال با توجه به فاصله حداکثر زمین تا خورشید در اول تیر و فاصله حداقل در اول دی ماه، علت گرمای تیرماه و سرمای دی ماه چیست؟

پاسخ علت، انحراف ۲۳/۵ درجه‌ای محور زمین نسبت به صفحه مدار گردش به دور خورشید است.

(صفحة ۱۴ کتاب درسی) - خود را بیازمایید

سؤال ۱ وضعیت فصل‌ها در نیمکره شمالی و جنوبی را مقایسه کنید.

۲ جهت تشکیل سایه در نیمکره شمالی و جنوبی چه تفاوتی دارد؟

۳ در طول یک سال، خورشید در چه روزهایی بر استوا عمود می‌تابد؟

پاسخ ۱ هنگامی که در نیمکره شمالی فصل بهار باشد، در نیمکره جنوبی فصل پاییز است و بالعکس و هنگامی که در نیمکره شمالی فصل تابستان باشد، در نیمکره جنوبی فصل زمستان است و بالعکس.

۲ در نیمکره شمالی سایه اجسام به سمت شمال (قطب شمال) و در نیمکره جنوبی سایه اجسام به سمت جنوب (قطب جنوب) می‌باشد.

۳ اول بهار و اول پاییز

موقعیت فرضی تابش عمود نور خورشیدنسبت به مدارهای مختلف زمین (بر اساس نیمکره شمالی)

- در ابتدای بهار (اول فروردین)، خورشید بر مدار استوا عمود می‌تابد و در طول فصل بهار بر عرض‌های جغرافیابی بالاتر در نیمکره شمالی عمود می‌تابد.

در ابتدای تابستان (اول تیر)، خورشید بر مدار رأس السرطان تابش قائم دارد.

- در ابتدای پاییز (اول مهر)، خورشید بر استوا قائم می‌تابد و در ادامه در ۶ ماهه دوم سال، بر عرض جغرافیابی صفرتا ۲۳/۵ درجه جنوبی (مدار رأس الجدی) قائم می‌تابد.

تکوین زمین و آغاز زندگی در آن:

۱ شکل‌گیری منظومه شمسی با نخستین تجمعات ذرات کیهانی (حدود ۶ میلیارد سال پیش)

۲ شکل‌گیری زمین به صورت کره‌ای مذاب و جدا شدن از توده اصلی و قرار گرفتن در مدار خود (حدود ۴/۶ میلیارد سال پیش)

۳ شکل‌گیری نخستین اجزای سنگ‌کره با سرد شدن توده مذاب و تشکیل سنگ‌های آذرین (حدود ۴ میلیارد سال پیش)

۴ شکل‌گیری هواکره در اطراف کره زمین با خروج گازهای اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و گازهایی از داخل زمین در اثر فوران آتشفسان‌های متعدد

۵ تشکیل آبکره در اثر سردتر شدن کره زمین و درآمدن بخار آب به صورت مایع

۶ شکل‌گیری زیستکره و زندگی انواع تک باخته‌ها در دریاهای کم عمق با تشکیل اقیانوس‌ها و تحت تأثیر انرژی خورشید

۷ به وجود آمدن چرخه آب، باعث فرسایش سنگ‌ها، تشکیل رسوبات و سنگ‌های رسوبی گردید.

۸ شکل‌گیری سنگ‌های دگرگونی با حرکت ورقه‌های سنگ‌کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف

دانشمندان معتقدند شرایط محیط زیست فعلی به تدریج و در طی صدها میلیون سال مهیا شده است.

- با توجه به شواهد زمین‌شناسی، دانشمندان دریافتن که خداوند در آفرینش جهان، ابتدا شرایط محیط زیست را مهیا کرده و سپس جانداران را از ساده تا پیچیده آفریده است.

- عامل ظهور و انقراض جانداران مختلف:** در دوران‌های مختلف، با تغییرات فراوان شرایط آب و هوایی و محیط زیست، گونه‌هایی از جانداران به وجود آمدند و

گونه‌هایی نیز منقرض شده‌اند. برای مثال:

۱ پیدایش اولین خزندگان زمان دوره کربونیفر


۲ بزرگ شدن جثه خزندگان و گسترش در زمین زمان طی ۷۰ تا ۸۰ میلیون سال

۳ حدود ۶۵ میلیون سال پیش زمان انقراض دایناسورها

۱ نامساعد شدن شرایط محیط زیست ۱ عدم سازگاری با تغییرات محیطی

(صفحه ۱۵ کتاب درسی) - تفسیر کنید

سؤال با توجه به شکل مقابل، ترتیب تشکیل هواکره، سنگ‌کره، زیستکره و آب‌کره را از قدیم به جدید ذکر کنید.



۱ زیستکره (بیوسفر)

۲ آب‌کره (اتمسفر)

۳ هواکره (هیدروسfer)

۴ پاسخ ۱ سنگ‌کره (لیتوسfer)

سن زمین

سن کره زمین، از آن جهت که بسیار طولانی است و در این مدت حوادث و وقایع فراوانی در آن رخداده است، اهمیت بسیاری دارد.

اهمیت تعیین سن سنگ‌ها و پدیده‌های مختلف

۱ بررسی تاریخچه زمین

۲ اکتشاف ذخایر و منابع موجود در زمین

۳ پیش‌بینی حوادث احتمالی آینده

روش‌های تعیین سن سنگ‌ها و پدیده‌ها

۱ سن نسبی: یعنی تقدم و تأخیر هم زمانی و قوع پدیده‌ها نسبت به یک دیگر یعنی جی

۲ سن مطلق (پرتوسنجی): تعیین سن واقعی نمونه‌ها با استفاده از عناصر پرتوزا

عناصر پرتوزا و روش محاسبه نیم عمر

ویرگی عناصر پرتوزا: واپاشی به طور مداوم، با سرعت ثابت و تبدیل شدن به عنصر پایدار

تعریف نیم عمر عناصر: مدت زمانی که نیمی از یک عنصر پرتوزا به عنصر پایدار تبدیل شود.

روش تعیین سن مطلق:

می‌توان سن مطلق نمونه‌هایی مانند سنگ، چوب، استخوان و ... را با استفاده از رابطه مقابله به دست آورد.



■ تخریب مادهٔ پرتوزا با نیم‌عمر ۴ میلیون سال

به طور کلی مقدار اولیهٔ یک مادهٔ پرتوزا 100% است. یعنی $(\frac{1}{1})$

(از آن جایی که هستهٔ عنصر پرتوزا ناپایدار است و تمایل دارد پایدار شود نیمی از آن تجزیه می‌شود؛ همان‌طور که گفته شد به این مدت زمان نیم‌عمر می‌گویند).

در نتیجهٔ تجزیه می‌شود و تبدیل می‌شود به 50% . یعنی $(\frac{1}{2})$

و همین‌طور این مراحل ادامه می‌یابد. به این صورت:

$$\frac{1}{1} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{16}$$

نکته!

هر کدام از فلش‌های بالا یک نیم‌عمر است.

سؤال ۱۵ $\frac{15}{16}$ یک عنصر پرتوزا تجزیه شده و نیم‌عمر آن 400 سال می‌باشد، عمر سنگ را محاسبه کنید.

پاسخ

$$\begin{array}{c} \text{جرم اولیه} \\ \uparrow \\ \frac{16}{16} - \frac{15}{16} = \frac{1}{16} \\ \downarrow \\ \text{جرم تجزیه شده} \end{array}$$

$$1 \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{8} = 4 \text{ = تعداد نیم‌عمر (تعداد فلش‌ها)}$$

$$\text{سال} = 4 \times 400 = 1600 = \text{سن نمونه} \Rightarrow \text{سن نیم‌عمر} = \text{سن نمونه}$$

(صفحه ۱۶ کتاب درسی) - پیوند با ریاضی

سؤال در جدول زیر، نیم‌عمر برخی از عناصر پرتوزا و عنصر پایدار حاصل از آن‌ها نشان داده شده است. با استفاده از اطلاعات موجود در آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

| عنصر پایدار | نیم‌عمر (تقریبی) | عنصر پرتوزا |
|-------------|-------------------|-------------|
| سرب ۲۰۶ | $4/5$ میلیارد سال | اورانیم ۲۳۸ |
| سرب ۲۰۷ | ۷۱۳ میلیون سال | اورانیم ۲۳۵ |
| سرب ۲۰۸ | ۱۴۱ میلیارد سال | توریم ۲۳۲ |
| نیتروژن ۱۴ | ۵۷۳۰ سال | کربن ۱۴ |
| آرگون ۴۰ | ۱/۳ میلیارد سال | پتاسیم ۴۰ |

۱ برای تعیین سن نخستین سنگ‌هایی که در کره زمین تشکیل شده‌اند، استفاده از کدام عنصر پرتوزا مناسب‌تر است؟ چرا؟

۲ برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمه انسان اولیه، از کربن ۱۴ استفاده می‌شود. دلیل آن را توضیح دهید.

۳ اگر مقدار کربن ۱۴ باقی‌مانده در یک نمونه استخوان قدیمی حدود $\frac{1}{8}$ مقدار اولیه آن باشد سن استخوان را محاسبه کنید.

پاسخ

۱ اورانیم ۲۳۸، زیرا نیم‌عمر این عنصر طولانی ($4/5$ میلیارد سال) است.

۲ زیرا این عنصر در بدن موجودات وجود دارد و مهم‌تر این که نیم‌عمر آن کوتاه است.


۳

$$1 \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{8} = 3 \text{ = تعداد نیم‌عمر}$$

$$\text{سال} = 5730 \times 3 = 17190 \Rightarrow \text{تعداد نیم‌عمر} \times \text{نیم‌عمر} = \text{سن نمونه}$$

عمر نمونه استخوان قدیمی:


ترتیب لایه‌های رسوبی



۱ رسوبات به صورت افقی و لایه‌لایه ته نشین می‌شوند **توجه** این در صورتی است که تغییری (شکستگی، وارونگی، گسل و ...) در لایه‌های رسوبی وجود نداشته و ترتیب لایه‌ها حفظ شده باشد.

مثال در شکل مقابل ترتیب لایه‌های رسوبی از قدیمی ترین به جدیدترین به صورت زیر است:

۴ ← ۳ ← ۲ ← ۱



۲ اگر در لایه‌های رسوبی تغییری رخ داده باشد، این توالی تغییرمی‌کند: اگر در لایه‌های رسوبی ۱ چین خودگی، ۲ گسل (شکستگی) دیده شود. **ترتیب زمانی از قدیم به جدید**


۱ رسوب‌گذاری لایه‌ها ۲ چین خودگی ۳ گسل (شکستگی)

نتیجه چین خودگی و گسل، بعد از زمان تشکیل لایه‌ها صورت می‌گیرد.

۳ اگر سنگ آذرین (توده نفوذی) درون لایه‌های رسوبی دیده شود. **ترتیب زمانی از قدیم به جدید**


۱ رسوب‌گذاری لایه‌ها ۲ توده آذرین نفوذی

نتیجه توده آذرین جدیدتر و لایه‌های رسوبی قدیمی‌تر است.




۴ اگر توده آذرین داخل یک سنگ رسوبی باشد (نه لایه‌های رسوبی). **ترتیب زمانی از قدیم به جدید** ۱ توده آذرین ۲ سنگ رسوبی


نتیجه توده آذرین قدیمی تر و سنگ رسوبی جدیدتر است.



۵ اگر قطعه سنگی درون یک توده آذرین باشد. **ترتیب زمانی از قدیم به جدید** ۱ قطعه سنگ ۲ توده آذرین **نتیجه** قطعه سنگ قدیمی تر و توده آذرین جدیدتر است.



۶ در کتاب علوم نهم با روش تعیین سن نسبی و اصول آن آشنا شدید. با توجه به آن، در شکل زیر، ترتیب وقایع را از قدیم به جدید شماره‌گذاری کنید.



سوال در کتاب علوم نهم با روش تعیین سن نسبی و اصول آن آشنا شدید. با توجه به آن، در شکل زیر، ترتیب وقایع را از قدیم به جدید شماره‌گذاری کنید.

پاسخ ۱ رسوب‌گذاری لایه‌ها از قدیم به جدید (به ترتیب): **G ← F ← E ← D ← C ← B ← A**

۲ چین خودگی و ایجاد گسل **Y**

۳ شکستگی و فرسایش

۴ توده آذرین نفوذی **X**

زمان در زمین‌شناسی

- مفهوم زمان در مقیاس‌های مختلفی به کار می‌رود.

واحدهای زمانی

در زندگی روزمره ما کاربرد زیادی دارند. از کوچک به بزرگ ثانیه ← دقیقه ← ساعت ← شباهه روز ← هفته ← ماه ← سال ← دهه ← سده (قرن) ← هزاره

در زندگی روزمره ما کاربرد زیادی ندارند ولی در علوم زمین بسیار مهم‌اند. از کوچک به بزرگ عهد ← دوره ← دوران ← اion (ابد دوران)

معیارهای تقسیم‌بندی واحدهای زمانی زمین‌شناسی

- پیدایش یا انقراض گونه خاصی از جانداران
- حوادث کوهزایی
- پیشروی یا پیروی جهانی دریاها
- عصرهای یخ‌بندان و ...

در جدول زیر، ترتیب واحدهای زمانی زمین‌شناسی، رویدادهای زیستی هر دوره، شروع و پایان هر دوره مهم است.

توجه

| میلیون سال قبل | رویدادهای زیستی | دوره | دوران | اion |
|----------------|---|-----------|-------------|-------------|
| عصر حاضر تا ۶۶ | انسان | کواترنری | سنوزوئیک | |
| | نوع پستانداران | نهوژن | | |
| | | پالنهوژن | | |
| ۲۵۱ تا ۲۶ | انقراض دایناسورها نخستین گیاهان گل‌دار | کرتاسه | مزوزوئیک | فانزروزوئیک |
| | نخستین پستاندار | ژوراسیک | | |
| | نخستین دایناسور | تریاس | | |
| ۲۵۰۰ تا ۲۵۱ | انقراض گروهی | پرمین | پالنهوژوئیک | |
| | نخستین خزنده | کربنیفر | | |
| | نخستین دوزیست | دونین | | |
| | نخستین گیاهان آوندار | سیلورین | | |
| | نخستین ماهی‌ها | اردوویسین | | |
| | نخستین تریلوپیت | کامبرین | | |
| | | | | |
| ۲۵۰۰ تا ۵۴۱ | | | پروتروزوئیک | پرکامبرین |
| ۴۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | | | آرکش | |
| ۴۶۰۰ تا ۴۰۰۰ | هادئن | | | |

پاسخ‌نامه



بخش

پ

۱ آقريينش كيهان و تکوين زمين

فصل

- ۱ | غلط (برخي از اجرام و پديده‌های آسماني نه همه اجرام و پديده‌های آسماني) | ۱
- ۲ | غلط (بطلميوس نه كوبنيك) | ۲
- ۳ | صحيح | ۳
- ۴ | غلط (مداراهای دايره‌اي نه مداراهای بيضوي) | ۴
- ۵ | غلط (شرق به غرب نه غرب به شرق) | ۵
- ۶ | صحيح | ۶
- ۷ | غلط (حدود ۸/۳ نه ۵) | ۷
- ۸ | كهكشان راه شيري | ۸
- ۹ | گسترش - دورشدن | ۹
- ۱۰ | اصول و قوانين | ۱۰
- ۱۱ | ستاره - سياره - فضای بین ستاره‌ای - نيري گرانش متقابل | ۱۱
- ۱۲ | كهكشان راه شيري | ۱۲
- ۱۳ | ماريچي - بازوهاي | ۱۳
- ۱۴ | ندارد - کم نور | ۱۴
- ۱۵ | شرق به غرب | ۱۵
- ۱۶ | زمين مرکزي | ۱۶
- ۱۷ | دقيق - درست - خورشيد مرکزي | ۱۷
- ۱۸ | پاد ساعتگرد | ۱۸
- ۱۹ | ثابت | ۱۹
- ۲۰ | ادايره‌اي | ۲۰
- ۲۱ | اکپلر | ۲۱
- ۲۲ | گزينه (۱) ← مطابق با نظرية زمين مرکگرای بطلميوس، زمين ثابت است و ماه و خورشيد و پنج سياره شناخته شده آن روزگار عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل در مدارهای دایره‌ای به دور زمین می‌گردند و مطابق با شکل صفحه ۱۱ کتاب درسی خورشید میان مریخ و زهره قرار دارد.
- ۲۳ | گزينه (۲) ← در هردو نظرية زمين مرکزي و خورشيد مرکزي، مدار گردش سيارات دايره‌اي شکل است.
- ۲۴ | گزينه (۱) ← مطابق با نظرية خورشيد مرکزي كوبنيك، سيارات در مدارهای دایره‌ای شکل به دور خورشيد می‌چرخند در حالی که مطابق با نظرية خورشيد مرکزي کپلر مدار گردش سيارات، بيضوي شکل است.
- ۲۵ | گزينه (۱) ← كهكشان‌ها، از تعداد زيادي ستاره، سياره و فضای بین ستاره‌ای (غلب گاز و گرد و غبار) تشکيل شده‌اند که تحت تأثير نيري گرانش متقابل، يكديگر رانگه داشته‌اند.
- ۲۶ | گزينه (۳) ←
- بررسی همه گزینه‌ها:
- گزينه (۱) ← حركت روزانه خورشيد در آسمان ظاهري و نتيجه گردش زمين به دور محور خود است.
- گزينه (۲) ← هر چه فاصله زمين تا خورشيد کمتر باشد، مدار گردش آن کوچک تر فاصله را با سرعت بيشتر و در زمان کمتر طي می‌کند.
- گزينه (۳) ← مطابق با قانون سوم كپلر رابطه $p^2 \propto d^3$ برقرار است.
- گزينه (۴) ← مدار گردش زمين به دور خورشيد بيضوي و به صورت پاد ساعتگرد است.
- (الف) بطلميوس ← ۳) زمين مرکگرا
- ب) يوهانس كپلر ← ۲) $p^2 \propto d^3$
- ج) نيكولاوس كوبنيك ← ۱) حركت سيارات در مدارهای دایره‌ای به دور خورشيد
- در كيهان، پديده‌های متنوعی كهكشان، منظومه‌ها، ستاره‌ها، سياره‌ها و ... وجود دارد.
- ۱۶ - برحسب سال زميني و (d)، بحسب واحد نجومي است.
- قانون سوم: زمان گردش يك دورسياره به دور خورشيد (p)، بالفرايش فاصله از خورشيد (d) افزايش مي‌يابد، به طوري که مربع زمان گردش سياره به دور خورشيد، معادل مکعب فاصله آن سياره تا خورشيد است ($p^2 \propto d^3$). در اين رابطه، (p) برحسب سال زميني و (d)، بحسب واحد نجومي است.
- ۲۷ | نظرية زمين مرکزي: بطلميوس، دانشمند یوناني بيش از دو هزار سال پيش، با مشاهده حركت ظاهري ماه و خورشيد، به اين نتيجه رسيد که زمين، در مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسماني دیگر به دور آن می‌گردند. براساس اين نظرية، که نظرية زمين مرکزي نامگذاري شد، زمين، ثابت است و ماه و خورشيد و پنج سياره شناخته شده آن روزگار، يعني عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل، در مدارهای دایره‌ای به دور زمین می‌گردند.
- برخی دانشمندان ايراني مانند ابوسعید سجزي و خواجه نصيرالدين طوسى، با اندازه‌گيری های دقيق و تفسير درست یافته‌های علمی، ايرادهایي برنظرية زمين مرکزي وارد کردند. اين نظرية در اروپا نيز مخالفانی داشت؛ ولی تا حدود قرن ۱۶ ميلادي مطرح بود.
- ۲۸ | آ) زمين مرکزي
- (ب) بطلميوس - با مشاهده حركت ظاهري ماه و خورشيد، به اين نتيجه رسيد که زمين، در مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسماني دیگر به دور آن می‌گردند.
- (پ) براساس اين نظرية، زمين ثابت است و ماه و خورشيد و پنج سياره شناخته شده آن روزگار، يعني عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل، در مدارهای دایره‌ای به دور زمین می‌گردند.
- (ت) قرن ۱۶ - برحی دانشمندان ايراني مانند ابوسعید سجزي و خواجه نصيرالدين طوسى، با اندازه‌گيری های دقيق و تفسير درست یافته‌های علمی، ايرادهایي برنظرية زمين مرکزي وارد کردند.
- ۲۹ | کشف رازهای خلقت
- ۳۰ | نظریه مه بانگ
- ۳۱ | با مطالعه حركت سيارات در زمان های مختلف
- ۳۲ | با اندازه‌گيری های دقيق و تفسير درست یافته‌های علمی
- ۳۳ | ظاهري و نتيجه چرخش زمين به دور محور خود
- ۳۴ | عطارد - زهره - مریخ - مشتری - زحل
- $p^2 \propto d^3$
- ۳۵ | واحد نجومي
- ۳۶ | ۱ زمين همراه با ماه، مانند دیگر سياره‌ها در مدار دايره‌اي و مخالف حركت عقربه‌های ساعت به دور خورشيد می‌گردد. ۲) حركت روزانه خورشيد در آسمان ظاهري و نتيجه چرخش زمين به دور محور خود است.
- ۳۷ | قانون اول: هر سياره در مداري بيضوي، چنان به دور خورشيد می‌گردد که خورشيد همواره، در يك از دو کانون آن قرار دارد. قانون دوم: هر سياره، چنان به دور خورشيد می‌گردد که خط فرضی که سياره را به خورشيد وصل می‌کند، در مدت زمان های مساوی، مساحت های مساوی ايجاد می‌کند.

نمونه سؤال امتحانی

بخش





ساعت شروع: ۸ صبح

آزمون نوبت اول

آزمون ۱

نمره

سوالات امتحانی

ردیف

| | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | الف | |
| ۰/۲۵ | دانشمندان ایرانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، با اندازه‌گیری‌های دقیق و تفسیر درست یافته‌های علمی ایرادهایی به نظریه خورشید مکرری وارد کردند. | | | ۱ | |
| ۰/۲۵ | اگردر منطقه‌ای، غلظت عناصر از میانگین کلارک بالاتر باشد، آن رابی هنجاری منفی می‌نامند. | | | ۲ | |
| ۰/۲۵ | رس‌ها بسیار متخلخل‌اند و به علت ریزبودن ذرات، نفوذ پذیری بسیار زیادی دارند. | | | ۳ | |
| ۰/۲۵ | پیدایش شب و روز، حاصل حرکت انتقالی زمین و انحراف $23^{\circ}/5$ درجه‌ای محور زمین است. | | | ۴ | |
| | جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (۱/۵ نمره) | | | ب | |
| ۰/۲۵ | میانگین فاصله خورشید از زمین، حدود است که به آن یک واحد نجومی می‌گویند. | | | ۵ | |
| ۰/۵ | سیلیکات‌ها، کانی‌هایی هستند که بیش از درصد از پوسته زمین را تشکیل و در ترکیب شیمیایی خود بنیان سیلیکاتی دارند. | | | ۶ | |
| ۰/۵ | در سنگ معدن یا کانسنگ، کانه، بخش کانسنگ است و باطله، به موادی که ارزش قابل توجهی ندارند، گفته می‌شود. | | | ۷ | |
| ۰/۲۵ | به وجود آمدن چرخه آب، باعث سنگ‌ها، تشکیل رسوبات و سنگ‌های رسوبی گردید. | | | ۸ | |
| | در هر یک از جملات زیر کلمه مناسب را انتخاب کنید. (۱ نمره) | | | ج | |
| ۰/۲۵ | فرمول $(p^2 \times d^3)$ مربوط به قانون (دوم - سوم) کپلر است. | | | ۹ | |
| ۰/۲۵ | در تعیین سن (نسبی - مطلق) ترتیب تقدم، تأخیر و هم‌زمانی وقوع پدیده‌ها نسبت به یک دیگر مشخص می‌شود. | | | ۱۰ | |
| ۰/۲۵ | کارنت از کانی‌های (سیلیکاتی - غیرسیلیکاتی) است که در سنگ دگرگونی یافت می‌شود. | | | ۱۱ | |
| ۰/۲۵ | هرچه درصد تخلخل خاک یا سنگ بیشتر باشد، آب (بیشتری - کمتری) را می‌تواند در خود نگه دارد. | | | ۱۲ | |
| | به پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیر پاسخ دهید. (۵/۲ نمره) | | | د | |
| ۰/۵ | گازهایی که از داخل زمین خارج شدند، به تدریج گازهای مختلف مانند اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن را به وجود می‌آورند. | ۱) هواکره | ۲) آب‌کرده | ۱۳ | |
| | ۳) زیستکرده | ۴) منظومه شمسی | | | |
| ۰/۵ | در مرحله، در محل شکاف ایجاد شده، مواد مذاب سیستکرده به بستر اقیانوس رسیده و پیشته‌های میان اقیانوسی تشکیل می‌شوند. | | | ۱۴ | |
| | ۱) بازشدنگی | ۲) گسترش | ۳) بسته شدن | ۴) برخورد | |
| ۰/۵ | کدام یک از موارد زیر کانی غیرسیلیکاتی می‌باشد؟ | ۱) میکا | ۲) آمفیبول | ۳) پیروکسن | ۴) کربنات‌ها |
| ۰/۵ | آبدهی رود، در فصل بهار، به علت ذوب برف‌ها و افزایش بارندگی، می‌یابد در ادامه در طول تابستان، معمولاً آبدهی رود می‌یابد. | | | | |
| | ۱) افزایش - افزایش | ۲) افزایش - کاهش | ۳) کاهش - افزایش | ۴) کاهش - کاهش | |
| ۰/۵ | در یک نمونه از آب زیرزمینی میزان 60 میلی‌گرم در لیتر کلسیم و 40 میلی‌گرم در لیتر منیزیم وجود دارد. سختی آب چقدر است؟ | | | | |
| | ۱) $314/1$ | ۲) $414/2$ | ۳) $514/3$ | ۴) $614/4$ | |

| | | کشف ارتباط (۱ نمره) | ھ |
|------|----------------------|--|----|
| ۰/۲۵ | | هر یک از موارد ستون (۱) را به موارد ستون (۲) ارتباط دهید. | ۱۸ |
| ۰/۲۵ | | | |
| ۰/۲۵ | | | |
| ۰/۲۵ | | | |
| | (۲) | (۱) | |
| | ۱. کربن خالص | الف. کریزو بریل | |
| | ۲. طلق نسوز | ب. اپال | |
| | ۳. چشم گریه | ج. مسکوویت | |
| | ۴. درخشش رنگین کمانی | د. الماس | |
| | | | |
| | | به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (۳ نمره) | ۹ |
| ۰/۵ | | سنگ معدن یا کانسنگ از چند بخش تشکیل شده است؟ نام هر یک را بنویسید. | ۱۹ |
| ۰/۵ | | نام معروف ترین و گران ترین سیلیکات بریلیم که به رنگ سبز یافت می شود را بنویسید. | ۲۰ |
| ۰/۵ | | بیشتر رودها در مناطق گرم و خشک چه نوعی هستند؟ | ۲۱ |
| ۰/۵ | | در قدیم، مردم ایران، آب زیرزمینی را چگونه به سطح زمین می آوردند؟ | ۲۲ |
| ۰/۵ | | قدرت فرسایندگی رواناب، بستگی به چه عواملی دارد؟ | ۲۳ |
| ۰/۵ | | هدف از حفاظت خاک چیست؟ | ۲۴ |
| | | به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید. (۶ نمره) | ز |
| ۱/۵ | | یوهانس کپلر با ارائه چند قانون، نظریه خورشید مرکزی را اصلاح کرد؟ توضیح دهید. | ۲۵ |
| ۲ | | با توجه به شکل مقابل، موارد مشخص شده را نامگذاری کنید. | ۲۶ |
| | | | |
| ۱/۵ | | ذرات تشکیل دهنده خاک بر حسب اندازه به چند دسته تقسیم می شوند؟ برای هر کدام مثال بزنید. | ۲۷ |
| ۱ | | کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی با چه مواردی در معرض تهدید است؟ | ۲۸ |
| | | اصطلاحات زیر را تعریف کنید. (۴ نمره) | ح |
| ۱ | | سنگ معدن (کانسنگ): | ۲۹ |
| ۱ | | کانه: | ۳۰ |
| ۱ | | زبرجد: | ۳۱ |
| ۱ | | نیم رخ خاک: | ۳۲ |
| ۴۰ | | موفق و مؤید باشید | |

آزمون اتابه

پاسخنامهٔ تشریحی

۲۰ زمرد

۲۱ موقتی و فصلی

۲۲ با احداث قنات

۲۳ سرعت و میزان مواد معلق

۲۴ جلوگیری از تخریب تدریجی خاک

۲۵ قانون کپلر؛ قانون اول: هر سیاره در مداری بیضوی، چنان به دور خورشید می‌گردد که خورشید همواره در یکی از دو کانون آن قرار دارد.
قانون دوم: هر سیاره چنان به دور خورشید می‌گردد که خط فرضی که سیاره را به دور خورشید وصل می‌کند، در مدت زمان‌های مساوی، مساحت‌های مساوی ایجاد می‌کند.

قانون سوم: زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید (p)، با افزایش فاصله از خورشید (d) افزایش می‌یابد، به طوری که مربع زمان گردش سیاره به دور خورشید، معادل مکعب فاصله آن سیاره تا خورشید است.

$$p^2 \propto d^3$$

در این رابطه p بر حسب سال زمینی و d بر حسب واحد نجومی است.

۲۶ (۱) ← اول بهار

۲۷ (۲) ← اول تابستان

۲۸ (۳) ← اول پاییز

۲۹ (۴) ← اول زمستان

۳۰ ۳ دسته ← درشت‌دانه (خاک‌های شنی)، متوسط‌دانه (ماسه و لای) و ریزدانه (خاک‌های رسی)

۳۱ کیفیت: کودهای کشاورزی، فاضلاب‌های صنعتی و شهری
کمیت: بهره‌برداری زیاد

۳۲ از دو بخش کانه و باطله تشکیل شده است. کانه، بخش ارزشمند کانسنس است و باطله، به موادی که ارزش اقتصادی قابل توجهی ندارند، گفته می‌شود.

۳۳ بخش ارزشمند کانسنس را، کانه می‌گویند.

۳۴ به نوع شفاف و قیمتی کانی آلوین، زبرجد می‌گویند. این کانی، سیلیکاتی و به رنگ سبز زیتونی است به همین دلیل به آن آلوین گفته می‌شود.

۱ آزمون

۱ غلط (زمین‌مرکزی نه خورشید‌مرکزی)

۲ غلط (مثبت نه منفی)

۳ غلط (اندک نه زیاد)

۴ غلط (پیدایش فصل‌ها نه پیدایش شب و روز)

۵ ۱۵۰ میلیون کیلومتر

۶ SiO_4^{4-}

۷ ارزشمند- اقتصادی

۸ فرسایش

۹ سوم

۱۰ نسبی

۱۱ سیلیکاتی

۱۲ بیشتری

۱۳ گزینه (۱) ← هواکره

۱۴ گزینه (۲) ← گسترش

۱۵ گزینه (۴) ← کربنات‌ها

۱۶ گزینه (۲) ← افزایش - کاهش

۱۷ گزینه (۱)

$$\text{TH} = ۲/۵\text{Ca}^{۲+} + ۴/۱\text{Mg}^{۲+} \rightarrow \text{TH} = ۲/۵ \times ۶۰ + ۴/۱ \times ۴۰.$$

$$= ۱۵۰ + ۱۶۴ = ۳۱۴ \text{ میلی‌گرم در لیتر}$$

۱۸ (الف) کریزوبریل ← (۳) چشم گربه

(ب) اپال ← (۴) درخشش رنگین‌کمانی

(ج) مسکوویت ← (۲) طلق نسوز

(د) الماس ← (۱) کربن خالص

۱۹ از ۲ بخش: کانه و باطله

فهرست

- | | |
|----|--|
| ۳ | فصل اول: آفرینش کیهان و تکوین زمین |
| ۸ | فصل دوم: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه |
| ۱۳ | فصل سوم: منابع آب و خاک |
| ۲۰ | فصل چهارم: زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی |
| ۲۴ | فصل پنجم: زمین‌شناسی و سلامت |
| ۲۷ | فصل ششم: پویایی زمین |
| ۳۰ | فصل هفتم: زمین‌شناسی ایران |

فصل اول آفرینش کیهان و تکوین زمین

مقدمه (صفحه ۹ کتاب درسی)



پیوند با عکاسی (صفحه ۹ کتاب درسی)

۱۷ عکس، بخشی از کهکشان راه شیری در آسمان شب است که از رصدگاه کویر خارا در اصفهان تهیه شده است.

منظومه شمسی (صفحه ۱۰ کتاب درسی)

۱۸ حرکت ظاهری خورشید از شرق به غرب است.

نظریه زمین مرکزی

۱۹ بطلمیوس، نظریه زمین مرکزی را ارائه داد.

۲۰ بطلمیوس، دانشمند یونانی بیش از دو هزار سال پیش، با مشاهده حرکت ظاهری ماه و خورشید، به این نتیجه رسید که زمین، در مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسمانی دیگر به دور آن می‌گردند.

۲۱ براساس نظریه زمین مرکزی، زمین، ثابت است و ماه و خورشید و پنج سیاره شناخته شده آن روزگار، یعنی عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل، در مدارهایی دایره‌ای به دور زمین می‌گردند.

۲۲ برخی دانشمندان ایرانی مانند ابوسعید سجزی و خواجه نصیرالدین طوسی، با اندازه‌گیری‌های دقیق و تفسیر درست یافته‌های علمی، ایرادهایی بر نظریه زمین مرکزی وارد کردند.

۲۳ نظریه زمین مرکزی در اروپا نیز مخالفانی داشت.

۲۴ نظریه زمین مرکزی تا حدود قرن ۱۶ میلادی مطرح بود.


نکته شکل (صفحه ۱۱ کتاب درسی)

۲۵ شکل، نشان دهنده نظریه زمین مرکزی است.

۲۶ ترتیب قرارگیری سیارات: زمین، ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، زحل

۲۷ مدارگردش خورشید به دور زمین درین مدارگردش زهره و مریخ است.

۲۸ ماه نزدیک ترین به زمین و زحل دورترین نسبت به زمین است.



نظریه خورشید مرکزی

۲۹ نیکولاوس کوپرنیک، ستاره‌شناس لهستانی که با علم ریاضی نیز به خوبی آشنا بود، با مطالعه حرکت سیارات در زمان‌های مختلف، نظریه خورشید مرکزی را بیان کرد.

۳۰ طبق نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک، زمین همراه با ماه، مانند دیگر سیاره‌ها در مدار دایره‌ای و مخالف حرکت عقربه‌های ساعت به دور خورشید می‌گردد.

۱ ذهن کنجکاو بشر، همواره به دنبال کشف اسرار شگفت‌انگیز جهان هستی است.

۲ مشاهده منظرة زیبای آسمان شب یا رصد آن، توجه آدمی را به مطالعه و شناخت اجرام و پدیده‌های آسمانی جلب می‌کند.

۳ در کیهان، پدیده‌های متنوعی مانند کهکشان‌ها، منظمه‌ها، ستاره‌ها، سیاره‌ها و ... وجود دارد.

۴ ستاره‌ها و سیاره‌هایی که در کهکشان راه شیری هستند. اندکی از میلیارد ها جرم آسمانی در کهکشان راه شیری هستند.

۵ برخی از اجرام و پدیده‌های آسمانی به وسیله کاوشگران شناسایی شده‌اند و برخی دیگر، تاکنون حتی رصد هم نشده‌اند و اطلاعی از آن‌ها در دست نیست.

۶ اندازه‌گیری‌های نجومی نشان می‌دهند که کیهان در حال گسترش است و کهکشان‌ها در حال دورشدن از یک دیگر هستند.

آفرینش کیهان (صفحه ۱۰ کتاب درسی)

۷ دانشمندان براین باورند که خداوند، جهان هستی را براساس اصول و قوانین آفریده است.

۸ دانشمندان با مطالعه و شناخت نظام حاکم بر آفرینش کیهان، به دنبال کشف رازهای خلقت هستند.

جمع‌آوری اطلاعات

۹ دانشمندان پیدایش جهان را با نظریه مه بانگ توضیح می‌دهند.

۱۰ نظریه مه بانگ: این نظریه به تئوری «Big Bang» مشهور است که دانشمندان پیدایش جهان را با استفاده از آن توضیح می‌دهند.

کهکشان راه شیری - Milky Way Galaxy (صفحه ۱۰ کتاب درسی)

۱۱ در کیهان، صدها میلیارد کهکشان وجود دارد.

۱۲ کهکشان‌ها، از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره‌ای (اغلب گاز و گرد و غبار) تشکیل شده‌اند که تحت تأثیر نیروی گرانش متقابل، یک دیگر را نگه داشته‌اند.


۱۳ اگر در شب‌های صاف و بدون ابر، در مکانی که آلودگی نوری ندارد، به آسمان نگاه کنید، نواری و مه‌مانند و کم نور، شامل انبوهی از اجرام را می‌بینید؛ این نوار کهکشان راه شیری نام دارد.

۱۴ کهکشان راه شیری یکی از بزرگ‌ترین کهکشان‌های شناخته شده‌است.

۱۵ کهکشان راه شیری، شکلی مارپیچی دارد که منظمه شمسی ما، در لبه یکی از بازوهای آن قرار دارد.

نکته شکل (صفحه ۱۰ کتاب درسی)

۱۶ شکل، طرح شماتیک یک کهکشان مارپیچ مانند کهکشان راه شیری را نشان می‌دهد.



۱۰ هزار سال نوری

۴۹ انحراف (۲۳/۵) درجه‌ای محور زمین، به صورتی که به جز در مدار استوا «مدار صفر درجه» که طول مدت شب و روز در تمام مدت سال با هم برابر ۱۲ ساعت است، در سایر نقاط با افزایش عرض جغرافیایی، این اختلاف ساعت بیشتر می‌شود.

۵۰ به گردش زمین بر روی مدار بیضوی به دور خورشید، حرکت انتقالی گفته می‌شود.

۵۱ حرکت انتقالی درجهٔ خلاف حرکت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود.

۵۲ میانگین فاصلهٔ خورشید از زمین، حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر است که به آن، یک واحد نجومی می‌گویند.

۵۳ پیدایش فصل‌ها، حاصل حرکت انتقالی زمین و انحراف ۲۳/۵ درجه‌ای محور زمین است.


۵۴ به علت کروی بودن زمین، زاویهٔ تابش خورشید در عرض‌های جغرافیایی مختلف، در یک زمان، متفاوت است.

۵۵ به علت انحراف محور زمین، زوایای تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی نیز در طول سال تفاوت دارد.

۵۶ تفاوت زاویهٔ ۲۳/۵ درجه‌ای، سبب ایجاد فصل‌ها در نقاط مختلف کره زمین شده است.

نکته شکل (صفحة١٣ اکتاب درسی)

۵۷ شکل، مقدار انحراف محور زمین (۲۳/۵) درجه و تأثیر آن در مقدار زاویهٔ تابش خورشید در عرض‌های جغرافیایی مختلف نشان می‌دهد.




نکته شکل (صفحة١٣ اکتاب درسی)

۵۸ فاصلهٔ زمین نسبت به خورشید در طول سال یکسان نیست.

۵۹ فاصلهٔ خورشید از زمین در اول تیرماه به حداقل مقدار خود، یعنی ۱۵۲ میلیون کیلومتر می‌رسد.

۶۰ فاصلهٔ خورشید از زمین در اول دی‌ماه به حداقل خود، یعنی حدود ۱۴۷ میلیون کیلومتر می‌رسد.



تحقیق کنید

۶۱ علت گرمای تیرماه و سرمای دی‌ماه، انحراف (۲۳/۵) درجه‌ای محور زمین نسبت به صفحهٔ مدار گردش به دور خورشید است.

۳۱ طبق نظریهٔ خورشیدمرکزی کوپرنیک، حرکت روزانهٔ خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجهٔ چرخش زمین به دور محور خود است.

۳۲ پس از آن‌که کوپرنیک، نظریهٔ خورشیدمرکزی را مطرح کرد، یوهانس کپلر، به بررسی دقیق یادداشت‌های ستاره‌شناسان پرداخت و دریافت که سیارات در مدارهای بیضوی، به دور خورشید در حرکت می‌باشند.

۳۳ کپلر با ارائهٔ سه قانون نظریهٔ خورشید مرکزی را اصلاح نمود.

۳۴ قانون اول کپلر: هر سیاره در مداری بیضوی، چنان به دور خورشید می‌گردد که خود را به دور خورشید همواره، در یکی از دو کانون آن قرار دارد.

۳۵ قانون دوم کپلر: هر سیاره، چنان به دور خورشید می‌گردد که خط فرضی که سیاره را به خورشید وصل می‌کند، در مدت زمان‌های مساوی، مساحت‌های مساوی ایجاد می‌کند.

۳۶ قانون سوم کپلر: زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید (p)، با افزایش فاصله از خورشید (d) افزایش می‌یابد، به‌طوری که مریع زمان گردش سیاره به دور خورشید، معادل مکعب فاصله آن سیاره تا خورشید است ($d^3 \propto p^2$). در این رابطه، (p) بر حسب سال زمینی و (d) بر حسب واحد نجومی است.


نکته شکل (صفحة١٤ اکتاب درسی)

۳۷ شکل، قانون دوم کپلر را نمایش می‌دهد.

۳۸ اوج خورشیدی (اول تیرماه): حداقل فاصلهٔ زمین تا خورشید که حدود ۱۵۲ میلیون کیلومتر است.

۳۹ حضیض خورشیدی (اول دی‌ماه): حداقل فاصلهٔ زمین تا خورشید که حدود ۱۴۷ میلیون کیلومتر است.

۴۰ هر کمان در دایره، نشان‌دهندهٔ یک فصل از سال است.



یادآوری

۴۱ نورخورشید حدود ۳/۸ دقیقه نوری طول می‌کشد تا به زمین برسد.

۴۲ واحد ستاره‌شناسی (نجومی): عبارت است از فاصلهٔ متوسط زمین از خورشید که حدوداً معادل ۱۵۰ میلیون کیلومتر است.

حرکات زمین (صفحة١٤ اکتاب درسی)

۴۳ کرهٔ زمین دارای حرکت وضعی و انتقالی است.

۴۴ چرخش زمین به دور محورش را حرکت وضعی می‌گویند.

۴۵ حرکت وضعی درجهٔ خلاف حرکت عقربه‌های ساعت است.

۴۶ حرکت وضعی در مدت زمان حدود ۲۴ ساعت انجام می‌شود.

۴۷ شب و روز بر اثر حرکت وضعی به وجود می‌آید.


۴۸ انحراف (۲۳/۵) درجه‌ای محور زمین، نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید، سبب ایجاد اختلاف مدت زمان روز و شب در عرض‌های جغرافیایی مختلف می‌شود.

خود را بیازمایید

- ۷۸ با توجه به شواهد زمین‌شناسی، دانشمندان دریافتند که خداوند در آفرینش جهان، ابتدا شرایط محیط‌زیست را مهیا کرده و سپس جانداران را از ساده تا پیچیده‌آفریده است.
- ۷۹ در دوران‌های مختلف، شرایط آب و هوایی و محیط‌زیست تغییرات فراوانی داشته‌اند و بر این اساس، گونه‌های مختلف جانداران در سطح زمین ظاهر و منقرض شده‌اند.
- ۸۰ خزندگان در دوره کربونیfer، ظاهر و در طی ۸۰ - ۶۰ میلیون سال، جثه آن‌ها بزرگ شد و در کره زمین گسترش یافتد.
- ۸۱ با نامساعد شدن شرایط محیط‌زیست و عدم توانایی دایناسورها برای سازگاری با تغییرات محیطی، این موجودات حدود ۶۵ میلیون سال پیش منقرض شدند.

تفسیر کنید

- ۸۲ با توجه به شکل، ترتیب شکل‌گیری از قدیم به جدید، به این صورت است: (۱) سنگ‌کره (۲) هواکره (۳) آب‌کره (۴) زیست‌کره



سن زمین (صفحة ۱۵ کتاب درسی)

- ۸۳ از آغاز پیدایش کره زمین تاکنون، مدت زمان بسیار زیادی می‌گذرد و در این مدت، حوادث و وقایع فراوانی در آن رخ داده است.
- ۸۴ تعیین سن سنگ‌ها و پدیده‌های مختلف، از نظر بررسی تاریخچه زمین، اکتشاف ذخایر و منابع موجود در زمین، پیش‌بینی حوادث احتمالی آینده و ... همیت زیادی دارد.
- ۸۵ در زمین‌شناسی، سن سنگ‌ها و پدیده‌ها را به دو روش نسبی و مطلق تعیین می‌کنند.
- ۸۶ در تعیین سن نسبی، ترتیب تقدم، تأخیر و همزمانی وقوع پدیده‌ها، نسبت به یک دیگر مشخص می‌شود.
- ۸۷ در تعیین سن مطلق (پرتوسنجی)، سن واقعی نمونه‌ها با استفاده از عناصر پرتوزا اندازه‌گیری می‌شود.
- ۸۸ عناصر پرتوزا به طور مداوم، با سرعت ثابت در حال واپاشی هستند.
- ۸۹ عناصر پرتوزا پس از واپاشی به عنصر پایدار تبدیل می‌شوند.
- ۹۰ مدت زمانی که نیمی از یک عنصر پرتوزا به عنصر پایدار تبدیل می‌شود را، نیم‌عمر آن عنصر می‌گویند.
- ۹۱ در تعیین سن مطلق با استفاده از رابطه زیر می‌توان سن مطلق نمونه‌هایی مانند (سنگ، چوب، استخوان و ...) را تعیین کرد.

$$\text{نیم عمر} \times \text{تعداد نیم عمر} = \text{سن نمونه}$$

- ۹۲ هنگامی که در نیمکره شمالی فصل بهار باشد، در نیمکره جنوبی فصل پاییز است و بالعکس و هنگامی که در نیمکره شمالی فصل تابستان باشد در نیمکره جنوبی فصل زمستان است و بالعکس.


- ۹۳ در نیمکره شمالی سایه اجسام به سمت شمال (قطب شمال) و در نیمکره جنوبی سایه اجسام به سمت جنوب (قطب جنوب) می‌باشد.
- ۹۴ در طول یک سال خورشید در اویل بهار و اویل پاییز بر استوا عمودی تابد.

نکته شکل (صفحة ۱۶ کتاب درسی)

- ۹۵ حرکت زمین و زاویه انحراف محور آن به گونه‌ای است که می‌توان موقعیت خورشید را نسبت به زمین به صورت شکل زیر تصور کرد.

- ۹۶ در ابتدای بهار، خورشید بر مدار استوا عمود می‌تابد و در طول بهار بر عرض‌های جغرافیایی بالاتر در نیمکره شمالی عمود می‌تابد به طوری که، در آخر خرداد و اویل تبرماه حداقل بر مدار رأس السرطان، تابش قائم است.

- ۹۷ در طول تابستان بر مداراهای کمتر از ($23^{\circ}/5$) درجه شمالی، قائم است.
- ۹۸ اول پاییز بر استوا و در ادامه در شش ماهه دوم سال، بر عرض‌های جغرافیایی صفر تا ($23^{\circ}/5$) درجه جنوبی قائم می‌تابد.



تکوین زمین و آغاز زندگی در آن (صفحة ۱۶ کتاب درسی)

- ۹۹ حدود ۶ میلیارد سال قبل، با نخستین تجمعات ذرات کیهانی، شکل‌گیری منظمه شمسی آغاز شد.

- ۱۰ در حدود $4/6$ میلیارد سال قبل، سیاره زمین به صورت کره‌ای مذاب، تشکیل و در مدار خود قرار گرفت.

- ۱۱ با گذشت زمان و سرد شدن این گوی مذاب، حدود ۴ میلیارد سال قبل، سنگ‌های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ‌کره تشکیل شدند.

- ۱۲ با فوران آتشفسان‌های متعدد، گازهایی که از داخل زمین خارج شدند، به تدریج گازهای مختلف مانند اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، هواکره را به وجود آوردند.

- ۱۳ با سردر شدن کره زمین، بخار آب به صورت مایع درآمد و آب‌کره تشکیل شد.

- ۱۴ با تشکیل اقیانوس‌ها و تحت تأثیر انرژی خورشید، شرایط برای تشکیل زیست‌کره فراهم و زندگی انواع نکیاخته‌ها در دریاهای کم عمق آغاز شد.

- ۱۵ به وجود آمدن چرخه آب، باعث فرسایش سنگ‌ها، تشکیل رسوبات و سنگ‌های رسوبی گردید.

- ۱۶ با حرکت ورقه‌های سنگ‌کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف، سنگ‌های دگرگونی به وجود آمدند.


- ۱۷ دانشمندان معتقدند شرایط محیط‌زیست فعلی به تدریج و در طی صدها میلیون سال مهیا شده است.

- دوران مژوزوئیک شامل دوره‌های: ۱) کرتاسه، ۲) ژوراسیک و ۳) تریاسی
- دوره کرتاسه: رویداد زیستی ← انقراض دایناسورها و نخستین گیاهان گل‌دار
- دوره ژوراسیک: رویداد زیستی ← نخستین پرنده
- دوره تریاس: رویداد زیستی ← نخستین پستاندار و نخستین دایناسور
- دوران مژوزوئیک ← ۶۶ تا ۲۵۱ میلیون سال قبل
- دوران پالئوزوئیک شامل دوره‌های: ۱) پرمین، ۲) کربنیفر، ۳) دونین، ۴) سیلورین، ۵) اردوبویسین و ۶) کامبرین
- دوره پرمین: رویداد زیستی ← انقراض گروهی
- دوره کربنیفر: رویداد زیستی ← نخستین خزنه
- دوره دونین: رویداد زیستی ← نخستین دوزیست
- دوره سیلورین: رویداد زیستی ← نخستین گیاهان آوندادر
- دوره اردوبویسین: رویداد زیستی ← نخستین ماهی‌ها
- دوره کامبرین: رویداد زیستی ← نخستین تریلویت
- دوران پالئوزوئیک ← ۲۵۱ تا ۲۵۰۰ میلیون سال قبل
- ائون پرکامبرین شامل: ۱) پرتوزوئیک، ۲) آرکن و ۳) هادئن
- ائون پرتوزوئیک ← ۵۴۱ تا ۲۵۰۰ میلیون سال قبل
- ائون آرکن ← ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیون سال قبل
- ائون هادئن ← ۴۰۰۰ تا ۴۶۰۰ میلیون سال قبل

یادآوری

ترتیب وقایع از قدیم به جدید به صورت زیر است:

- ۱) رسوب‌گذاری لایه‌های از قدیم به جدید ۲) چین‌خوردگی ۳) شکستگی و ایجاد گسل ۴) توده آذرین نفوذی ۵) هوازگی و فرسایش



پیوند با ریاضی

- ۹۴ برای تعیین سن نخستین سنگ‌هایی که در کره زمین تشکیل شده‌اند، استفاده از عنصر پرتوزا اورانیم ۲۳۸ مناسب‌تر است؛ زیرا نیم عمر این عنصر طولانی (۴/۵) میلیارد سال است.

- ۹۵ برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمه انسان اولیه، از کربن ۱۴ استفاده می‌شود؛ زیرا این عنصر در بدن موجودات وجود دارد و مهم‌تر این که نیم عمر آن کوتاه است. (۵۷۳۰ سال)

- ۹۶ عنصر پرتوزا: اورانیم ۲۳۸ ← نیم عمر: ۴/۵ میلیارد سال ← عنصر پایدار: سرب ۲۰۶

- ۹۷ عنصر پرتوزا: اورانیم ۲۳۵ ← نیم عمر: ۷۱۳ میلیون سال ← عنصر پایدار: سرب ۲۰۷

- ۹۸ عنصر پرتوزا: توریم ۲۳۲ ← نیم عمر: ۱۴/۱ میلیارد سال ← عنصر پایدار: سرب ۲۰۸

- ۹۹ عنصر پرتوزا: کربن ۱۴ ← نیم عمر: ۵۷۳۰ سال ← عنصر پایدار: نیتروژن ۱۴

- ۱۰۰ عنصر پرتوزا: پتاسیم ۲۴۰۳۸ ← نیم عمر: ۱/۳ میلیارد سال ← عنصر پایدار: آرگون ۴۰

زمان در زمین‌شناسی (صفحة ۱۷ کتاب درسی)

مفهوم زمان در مقیاس‌های مختلفی به کار می‌رود.

- ۱۰۱ واحدهای زمان مانند: ثانیه، دقیقه، ساعت، شبانه‌روز، هفته، ماه، سال، دهه، سده (قرن) و هزاره

- ۱۰۲ واحدهای بزرگ‌تر زمان وجود دارند که در زندگی روزمره ما، کاربرد زیادی ندارند، ولی در علوم زمین بسیار مهم‌اند. مانند عهد، دوره، دوران و ائون (آبردوران) که واحدهای زمانی مورد استفاده در زمین‌شناسی هستند.

- ۱۰۳ معیار تقسیم‌بندی واحدهای زمانی که در علوم زمین بسیار مهم‌اند.

- ۱۰۴ معیار تقسیم‌بندی واحدهای زمانی مورد استفاده در زمین‌شناسی، به حوادث مهمی همچون پیدایش یا انقراض گونه خاصی از جانداران، حوادث کوهزایی، پیشروی یا پسروی دریاها، عصرهای یخبندان و ... بستگی دارد.

- ۱۰۵ دوران ائون (فانزوژوییک)، شامل دوران: ۱) سنوزوئیک، ۲) مژوزوئیک و ۳) پالئوزوئیک

- ۱۰۶ دوران سنوزوئیک شامل دوره‌های: ۱) کواترنری، ۲) نیوزن و ۳) پالئوزن

- ۱۰۷ دوره کواترنری: رویداد زیستی ← انسان

- ۱۰۸ دوره نیوزن و پالئوزن: رویداد زیستی ← تنوع پستانداران

- ۱۰۹ دوران سنوزوئیک ← از عصر حاضر تا ۶۶ میلیون سال قبل

- ۱۰۰ علت حرکت ورقه‌های سنگ‌کره، جریان همرفت (کنوکسیون) مواد مذاب داخل کره زمین در زیر لیتوسفر می‌باشد.
- ۱۰۱ انواع حرکت ورقه‌ها شامل: دورشونده، نزدیک‌شونده و امتدادلغز است.
- ۱۰۲ پیامدهای حاصل از حرکت ورقه‌ها شامل: زلزله، آتش‌فشان، پیدایش کوه‌ها، گسترش بستر اقیانوس‌ها و ... می‌باشد.
- ۱۰۳ نخستین بار سازوکار حرکت ورقه‌های سنگ‌کره توسط دانشمندان کانادایی به نام تزوڑ ویلسون در قالب چرخه‌ای به نام چرخه ویلسون مطرح شد.
- ۱۰۴ مراحل چرخه ویلسون شامل: ۱) مرحله بازشدنگی، ۲) مرحله گسترش، ۳) مرحله بسته‌شدن و ۴) مرحله برخورد می‌باشد.
- ۱۰۵ مرحله بازشدنگی: تحت تأثیر جریان‌های همرفتی سست کره، بخشی از پوسته قاره‌ای شکافته می‌شود و مواد مذاب سست کره، صعود نموده و به سطح زمین می‌رسند. نمونه‌ای از آن آتش‌فشان‌های کنیا و کلیمانجارو در شرق آفریقا ایجاد شده است.

یادآوری

پاسخ دهید

نکته شکل (صفحة ۱۸ کتاب درسی)

عامل باز و بسته شدن اقیانوس‌ها جریان همرفت مواد مذاب در زیر لیتوسفر می‌باشد.


با وجود گسترش بستر اقیانوس‌ها، وسعت سطح زمین افزایش نمی‌یابد؛ زیرا زمانی‌که در یک طرف، اقیانوس‌ها در حال باز شدن هستند در جای دیگر با فروزانش این عمل جبران می‌شود.

نتیجهٔ فروزانش ورقهٔ اقیانوسی - قاره‌ای، تشکیل درازگودال اقیانوسی و در نهایت موجب بسته شدن اقیانوس می‌گردد.

نتیجهٔ فروزانش اقیانوسی - اقیانوسی موجب ایجاد درازگودال اقیانوسی و جزایر قوسی می‌گردد.

نکته شکل (صفحة ۲۰ کتاب درسی)

شکل، مراحل تشکیل اقیانوس جدید را نشان می‌دهد.



با شکاف برداشتن پوسته مواد مذاب صعود کرده و به سطح زمین می‌رسند و با سرد شدن آن‌ها فاصله ایجاد شده پر می‌شود؛ در نتیجه بین دو ورقهٔ دورشونده پوسته اقیانوسی جدیدی ایجاد می‌شود.

علم، زندگی، کارآفرینی (صفحة ۲۰ کتاب درسی)

دیرینه‌شناسی

شاخه‌ای از علم زمین‌شناسی که به بررسی آثار و بقایای موجودات گذشته زمین در لایه‌های رسوبی می‌پردازد.

برایه مطالعه فسیل‌ها، پیدایش و نابودی آن‌ها می‌توان به سن نسبی لایه‌های زمین و محیط زندگی موجودات در گذشته پی‌برد.

سنگش از دور

علم و فن جمع‌آوری اطلاعات از عوارض سطح زمین، بدون تماس فیزیکی با آن‌ها است.

سنگش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و حوت پیرامون آن، از یک نقطه مناسب در بالاتر از سطح زمین است.

پرتوهای بازتابی که از نوع امواج الکترومغناطیسی هستند، می‌توانند دارای منابع گوناگونی مانند پرتوهای خورشیدی، پرتوهای حرارتی اجسام یا حتی پرتوهای مصنوعی باشند.


به دست آوردن اطلاعات از سطح زمین و سطح دریاها، با استفاده از تصاویر اخذ شده از فراز آن‌ها، از بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیس که از سطح زمین تابیده یا بازتابیده شده‌اند، انجام می‌شود.

سنگش از دور، از انرژی الکترومغناطیسی بهره می‌گیرد.

قوی‌ترین منبع تولیدکننده انرژی الکترومغناطیسی، خورشید است که انرژی الکترومغناطیس را در تمام طول موج‌ها، تابش می‌کند.

متخصصان رشته‌های دیرینه‌شناسی و سنگش از دور، در مراکزی مانند: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت ملی نفت ایران و ... می‌توانند به کمک آن حوداثی مانند: موقع سیل، تغییرات سطح زمین، پرآندگی ریزگردها و ... را بررسی کنند و در کیفیت‌بخشی و بهبود اجرای پروژه‌های اکتشافی و آموزشی کمک شایانی داشته باشند.

شکل، ایجاد شکاف در پوسته قاره‌ای را نشان می‌دهد.



مرحله گسترش: در این مرحله، در محل شکاف ایجاد شده، مواد مذاب سیست کرده به بستر اقیانوس رسیده و پشت‌های میان اقیانوسی تشکیل می‌شوند و پوسته جدید ایجاد شده به طرفین حرکت کرده و باعث گسترش بستر اقیانوس می‌شود مانند بستر اقیانوس اطلس (دور شدن آمریکای جنوبی از آفریقا) و دریای سیاه.

نکته شکل (صفحة ۱۸ کتاب درسی)

شکل، ایجاد و گسترش پوسته اقیانوسی را نشان می‌دهد.





مرحله بسته‌شدن: در این مرحله، ورقه اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقه قاره‌ای مجاور خود فرو رانده می‌شود (درازگودال اقیانوسی)، و با ادامه فروزانش در نهایت اقیانوس بسته می‌شود. (مانند بسته شدن اقیانوس تیس)

در برخی از اقیانوس‌ها مانند اقیانوس آرام در بخشی از آن، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر فرو رانده شده و منجر به تشکیل درازگودال اقیانوسی و جزایر قوسی می‌شود.

نکته شکل (صفحة ۱۹ کتاب درسی)

شکل‌ها، بسته شدن حوضه اقیانوسی ایجاد شده را نشان می‌دهد.



مرحله برخورد: با بسته شدن اقیانوس و برخورد ورقه‌ها، رسوبات فشرده شده و رشته‌کوه‌هایی مانند هیمالیا (برخورد هندوستان به آسیا)، زاگرس (برخورد عربستان به ایران) و ... را به وجود می‌آورند.

نکته شکل (صفحة ۱۹ کتاب درسی)

شکل، برخورد ورقه‌ها و ایجاد رشته‌کوه را نشان می‌دهد.

