



شیخ زاید
تمرین امتحان

فیزیک دهم تجربه

رضا خالو، امیرعلی میری

پاسخ‌های
تشریحی

سوالات
امتحانی

سوالات
تمکیلی

سوالات
تألیفی

درس‌نامه
سوال محور

مجموعه کتابهای تمام، پایه دهم نشر الگو:

- فیزیک دهم ریاضی و تجربی (تمام)
- هندسه دهم (تمام)
- ریاضی دهم (تمام)
- فارسی دهم (تمام)
- عربی دهم (تمام)
- شیمی دهم (تمام)

- آموزش با تکیه بر حل مسائل، با چینش و تیپبندی آموزشی و قدم به قدم
- بررسی تمام تصاویر و متن‌های مهم کتاب درسی با عنوان‌های «عکس و مکث» و «خطبه خط کتاب»
- پوشش کامل مستلههای کتاب درسی در تمرین‌های پایان هر بخش همراه با پاسخ تشریحی
- سوال‌های امتحانی به همراه بارم نمره با پاسخ تشریحی و کلید تصحیح آزمون
- سوال‌های تکمیلی با سطح دشواری بیشتر با پاسخ تشریحی
- ۳ آزمون نیمسال اول و ۳ آزمون پایان سال برای سنجش مهارت



شما می‌توانید سوالات خود را از طریق کanal Telegram فیزیک الگو به آدرس زیر با انتشارات در میان بگذارید:
https://t.me/physics_olgoo

الگو
نشر الگو
www.olgoobooks.ir





فيزيك دهم

تجربه

مؤلفان: رضا خالو، امير على ميرى

مقدمهٔ مؤلف

به نام خدا

سلام به شما دهمی‌های عزیز

سال دهم، سال ورود شما به مقطع جدید (دورهٔ دوم دبیرستان) رو تبریک می‌گیم.
سالی که شما احساس می‌کنید برای فوق دادن خودتون با شرایط جدید وقت کافی دارید. البته احساس چندان اشتباهی نیست اما با توجه به اینکه در طراحی جدید آزمون سراسری دانشگاه‌ها، سوابق تحصیلی یا همون نمرات امتحاناتون در آخر سال تأثیر مهمی داره شما باید از ابتدای سال به فکر این آزمون‌ها باشید. همون‌طور که ما به فکر بودیم و برای این موضوع کتابی با شرح حال زیر نوشتم.

دانستان کتاب ما از این قراره که کتاب رو به ۶ قسمت تقسیم کردیم:

۱ درس‌نامه: امتحان نهایی در درس فیزیک معمولاً شامل دو بخش است، یک بخش حفظی با سؤال‌های جای خالی، تعریف کنید، درست و نادرست و ... از متن کتاب و بخش دیگر مسئله‌های محاسباتی.

الف) برای بخش حفظی، در درس‌نامه تمام قسمت‌های حفظی و مهم متن کتاب درسی را تحت عنوان «خط به خط کتاب درسی» و شکل‌های مهم کتاب را به صورت «عکس و مکث» آورديم.

ب) برای بخش مسئله‌ها هم، در هر درس‌نامه، مسئله‌ها را تیپ‌بندی کردیم و نکته‌های مهم برای حل مسئله رو در پاسخ اون نوشتم.
۲ در هر فصل بعد از درس‌نامه کامل، یک سری تمرین و کار در منزل برای شما قراردادیم تا با حل اون‌ها قدرت حل مسئله و آزمون دادن شما بالا بره. در بخش تمارین بیشتر، تمرین‌ها شامل چند قسمت بوده یعنی یک مبحث رو به چند صورت از شما پرسیده‌ایم تا هم شما و هم همکار عزیز ما یعنی معلمتون خیالتون راحت باشه این نمونه سؤال رو یاد گرفتید.

۳ برای محکم‌کاری بیشتر در آخر تمام بخش‌ها مسائل و سؤالاتی با سطح بالاتر گذاشته شده که این سؤال‌ها کمی سخت‌تر هستن.
به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که پس از مشورت با معلم این مسائل رو حل کنین.

۴ در بخش جمع‌بندی مسائل امتحانی بارم‌بندی شده هست که شامل سؤال‌های امتحانی کل فصل بوده و بارم‌بندی اون‌ها رو مشخص کردیم. در پاسخ این مسائل هم کلید تصحیح شبیه امتحانات آموزش و پرورش گذاشته شده. به‌طور مثال مشخص کردیم که کدوم فرمول باید نوشته بشه و هر بخش از پاسخ چه نمره‌ای داره.

۵ یک سؤال مهم در آزمون نهایی، سؤالهای مربوط به آزمایش کنیدهای کتاب درسی هست که تمام این آزمایش کنیدها رو در آخر این کتاب و فصل به فصل برای شما قرار دادیم.

۶ حل تمام مسائل و تمرین‌ها در پاسخ‌نامه به‌طور کاملاً تشریحی قرار دارد.

در آخر باید بگیم این کتاب

«تمام آن چیزی است که شما برای ۲۰ گرفتن لازم دارید»

در پایان از تلاش صمیمانه کارکنان نشر الگو به ویژه خانم‌ها زهره نوری، شارونا قطبی‌نژاد و آقای محسن شعبان شمیرانی که ویرایش این کتاب بی‌یاری آنان امکان‌پذیر نبود و خانم‌ها فاضله محسنی و مریم احمدی برای تایپ و صفحه‌آرایی کتاب تشکر و قدردانی می‌کنیم.

رضا خالو - امیرعلی مبری

فهرست مطالب

فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری

۵۱	بخش ششم: شناوری	بخش اول: کمیت‌ها - یکاها
۵۳	تمرین‌های بخش ششم	تمرین‌های بخش اول
۵۴	بخش هفتم: اصل برنولی	بخش دوم: تبدیل یکا
۵۶	تمرین‌های بخش هفتم	تمرین‌های بخش دوم
۵۸	مسائل تکمیلی	بخش سوم: اندازه‌گیری
۶۱	مسائل امتحانی بارم‌بندی شده	تمرین‌های بخش سوم

فصل سوم: کار، انرژی و توان

۶۸	بخش اول: انرژی جنبشی	بخش اول: انرژی جنبشی
۷۰	تمرین‌های بخش اول	تمرین‌های بخش اول
۷۲	بخش دوم: کار	بخش دوم: کار
۷۷	تمرین‌های بخش دوم	تمرین‌های بخش دوم
۸۰	بخش سوم: قضیه کار - انرژی جنبشی	بخش سوم: قضیه کار - انرژی جنبشی
۸۴	تمرین‌های بخش سوم	تمرین‌های بخش سوم
۸۷	بخش چهارم: کار و انرژی پتانسیل	بخش چهارم: کار و انرژی پتانسیل
۸۹	تمرین‌های بخش چهارم	تمرین‌های بخش چهارم
۹۰	بخش پنجم: پایستگی انرژی مکانیکی	بخش پنجم: پایستگی انرژی مکانیکی
۹۵	تمرین‌های بخش پنجم	تمرین‌های بخش پنجم
۹۸	بخش ششم: کار و انرژی درونی - قانون پایستگی انرژی	بخش ششم: کار و انرژی درونی - قانون پایستگی انرژی
۱۰۳	تمرین‌های بخش ششم	تمرین‌های بخش ششم
۱۰۵	بخش هفتم: توان و بازده	بخش هفتم: توان و بازده
۱۰۹	تمرین‌های بخش هفتم	تمرین‌های بخش هفتم
۱۱۱	مسائل تکمیلی	مسائل تکمیلی
۱۱۳	مسائل امتحانی بارم‌بندی شده	مسائل امتحانی بارم‌بندی شده

فصل دوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

۳۰	بخش اول: ویژگی‌های ماده - مفاهیم اولیه	بخش اول: ویژگی‌های ماده - مفاهیم اولیه
۳۱	تمرین‌های بخش اول	تمرین‌های بخش اول
۳۳	بخش دوم: فشار شاره‌ها	بخش دوم: فشار شاره‌ها
۳۷	تمرین‌های بخش دوم	تمرین‌های بخش دوم
۳۹	بخش سوم: لوله‌های U شکل	بخش سوم: لوله‌های U شکل
۴۰	تمرین‌های بخش سوم	تمرین‌های بخش سوم
۴۱	بخش چهارم: فشار هوای بارومتر	بخش چهارم: فشار هوای بارومتر
۴۴	تمرین‌های بخش چهارم	تمرین‌های بخش چهارم
۴۶	بخش پنجم: فشارسنج شاره‌ها (مانومتر)	بخش پنجم: فشارسنج شاره‌ها (مانومتر)
۴۹	تمرین‌های بخش پنجم	تمرین‌های بخش پنجم

آزمون‌های جامع

- ۱۷۰ آزمون ۱
۱۷۲ آزمون ۲
۱۷۴ آزمون ۳

فصل چهارم: دما و گرما

- بخش اول: دما و دماسننجی
تمرین‌های بخش اول
بخش دوم: انبساط گرمایی
تمرین‌های بخش دوم
بخش سوم: گرما
تمرین‌های بخش سوم
بخش چهارم: دمای تعادل
تمرین‌های بخش چهارم
بخش پنجم: تغییر حالت‌های ماده
تمرین‌های بخش پنجم
بخش ششم: روش‌های انتقال گرما
تمرین‌های بخش ششم
مسائل تکمیلی
مسائل امتحانی بارم‌بندی شده

فصل پنجم: پاسخ‌های تشریحی

- ۱۷۸ پاسخ‌های تشریحی فصل اول
۱۹۴ پاسخ‌های تشریحی فصل دوم
۲۱۲ پاسخ‌های تشریحی فصل سوم
۲۴۳ پاسخ‌های تشریحی فصل چهارم
۲۶۶ پاسخ‌های تشریحی آزمایش‌های کتاب درسی
۲۶۹ پاسخ‌های تشریحی آزمون ۱ (نوبت اول)
۲۶۹ پاسخ‌های تشریحی آزمون ۲ (نوبت اول)
۲۷۰ پاسخ‌های تشریحی آزمون ۳ (نوبت اول)
۲۷۲ پاسخ‌های تشریحی آزمون جامع ۱
۲۷۳ پاسخ‌های تشریحی آزمون جامع ۲
۲۷۴ پاسخ‌های تشریحی آزمون جامع ۳

آزمایش‌های کتاب درسی

- ۱۶۳ آزمایش‌های فصل ۱، ۲ و ۴

آزمون‌های نوبت اول

- ۱۶۴ آزمون ۱
۱۶۶ آزمون ۲
۱۶۸ آزمون ۳

۷۱ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- الف) اگر بر سطح یک شیشه دوداندود چند قطره آب بزیم، آب به چه صورت بر این سطح قرار می‌گیرد؟ علت را توضیح دهید.
- ب) علت آن که درون لوله ممکن، سطح آب فرو رفته و درون لوله ممکن سطح جیوه برآمده است، چیست؟
- پ) معمولاً دیواره‌های کنار بالچه‌ها مرتبط است، علت را بیان کنید.
- ت) عامل بالا رفتن نفت از فیلره چرا غنیمتی چیست؟


۷۲ یک مایع روی سطح جامد ریخته‌ایم. در هر حالت نحوه قرارگیری مایع روی سطح را نشان دهید.

- الف) نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع بیشتر از نیروی دگرچسبی بین مایع و سطح باشد.
- ب) نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع کمتر از نیروی دگرچسبی بین مایع و سطح باشد.

۷۳ در هر یک از پدیده‌های زیر علت پخش‌شدن مایع چیست؟

- الف) پخش‌شدن نفت در سطح آب دریا
- ب) پخش‌شدن آب روی سطح تمیز شیشه
- پ) پخش‌شدن جوهر در آب

۷۴ الف) نحوه قرارگیری آب در لوله‌های ممکن شکل زیر را به صورت تقریبی نشان دهید.



ب) نحوه قرارگیری جیوه در لوله‌های ممکن شکل زیر را به صورت تقریبی نشان دهید.



۷۵ شکل‌های (الف) و (ب) نحوه قرارگیری دو مایع درون لوله شیشه‌ای را نشان می‌دهد. نیروی همچسبی مایع و نیروی دگرچسبی مایع با شیشه را در هر شکل با هم مقایسه کنید.

بخش دوم: فشار شاره‌ها

صفحة ۳۲ تا ۳۶ کتاب درسی

$$\text{تعريف} \quad \text{فشار برابر است با نسبت اندازه نیروی عمودی وارد بر سطح به مساحت سطح} \quad P = \frac{F}{A}$$

نیوتن \rightarrow پاسکال \rightarrow متر مربع

هر پاسکال برابر 1 N/m^2 است.

خطه خط کتاب




با وجود اینکه شاره به عنوان کل ساکن است مولکول‌های آن در حال حرکت‌اند.

نیرویی که توسط شاره به دیواره داخلی ظرف یا به جسم درون شاره وارد می‌شود به دلیل این حرکت‌ها و نیروی تماسی بین مولکولی است.

برای گازهای رقیق، به علت اینکه فاصله متوسط بین مولکول‌ها زیاد است، تقریباً تمام این نیرو ناشی از برخورد مولکول‌های گاز است.

عکس و مکث کتاب

الف) برخورد مولکول‌های هوای درون لاستیک به ب) به نقطه از سطح جسم غوطه‌ور در شاره پ) برای سادگی تنها نیروهای وارد بر دو سطح داخلی آن سبب ایجاد نیروی عمودی می‌شود. (آب) نیرویی عمودی وارد می‌شود.



(الف)

• تیپ ۲ - ۱: به دست آوردن فشار از نیرو

// مسئله ۱ //:



غواصی که مساحت عینک او 180 cm^2 است، در زیر آب در حال غواصی بوده و فشار آب در محل عینک او $2 \times 10^5 \text{ Pa}$ است. نیرویی که توسط آب بر عینک غواص وارد می‌شود چند نیوتن است؟

$$A = 180 \text{ cm}^2 \times \frac{1 \text{ m}^2}{100 \text{ cm}^2} \Rightarrow A = 180 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$


راه حل ابتدا باید مساحت عینک را برحسب مترمربع بنویسیم:

به کمک تعریف فشار نیروی وارد بر عینک توسط آب را حساب می‌کنیم:

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow 2 \times 10^5 = \frac{F}{180 \times 10^{-4}} \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} F = 2 \times 10^5 \times 180 \times 10^{-4} \Rightarrow F = 360 \times 10 \Rightarrow F = 3600 \text{ N}$$

$$P = \rho gh$$


(kg / m³) ← چگالی مایع
(m) ← عمق مایع (m)
← سطح آزاد مایع



این قسمت عمق A نیست. این قسمت عمق B نیست.

رابطه فشار شاره‌ها برحسب عمق شاره

- در رابطه فشار شاره، h عمق مایع یعنی فاصله قائم هر نقطه درون مایع تا سطح آزاد مایع است.
به طور مثال در شکل روبرو عمق نقطه A، h_A و عمق نقطه B، h_B است.



برای هر دو شاره ساکن فشار از رابطه $P = \rho gh$ به دست می‌آید اما چون چگالی گازها خیلی کم است، اختلاف فشار بین دو نقطه در محفظه گاز ناچیز است:

$$\left\{ \begin{array}{l} P_B > P_A \\ P_{A'} \approx P_{B'} \end{array} \right.$$

• تیپ ۲ - ۲: فشار حاصل از مایع


// مسئله ۲ //:

در یک ظرف تا ارتفاع 30 cm مایعی به چگالی 4 g/cm^3 ریخته شده است. در نقطه A واقع در ارتفاع 10 cm از کف ظرف فشار را باید.

راه حل تمام بکاهای را باید به یکای SI تبدیل کنیم تا فشار برحسب پاسکال به دست آید.

$$\rho = 4 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \Rightarrow \rho = 4000 \text{ kg/m}^3$$

برای تبدیل kg/m^3 به g/cm^3 کافی است آن را در عدد ۱۰۰۰ ضرب کرد.




$$h_A = 30 - 10 = 20 \text{ cm} \Rightarrow h = \frac{20}{100} = 0.2 \text{ m}$$

$$P = \rho gh \Rightarrow P = 4000 \times 10 \times 0.2 \Rightarrow P = 8000 \text{ Pa}$$

عمق نقطه A از سطح آزاد مایع برابر است با:

فشار مایع در نقطه A را حساب می‌کنیم:



لوله باریکی مطابق شکل، بالای بشکه‌ای وصل شده است. این ظرف تا سر لوله پر از آب است. فشار حاصل از مایع را در A (سر بشکه) و B (ته بشکه) به دست آورید. (فشار جو را در نظر نگیرید و $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$ آب)

راه حل نکته فشار مایع به چگالی و عمق مایع بستگی دارد و شکل ظرف و مساحت کف آن در فشار مایع بی‌تأثیر است.

چگالی آب را برحسب kg/m^3 می‌نویسیم:

با توجه به رابطه فشار برای مایع، فشار در نقطه A و B را به دست می‌آوریم:

$$P_A = \rho gh_A = 1 \times 10^3 \times 10 \times \frac{4}{100} = 4 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$P_B = \rho gh_B = 1 \times 10^3 \times 10 \times \frac{2}{100} = 2 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$P = P_0 + \rho gh$$

مجموع فشار هوا و فشار مایع

خطبه خط کتاب

$P_0 = 1 \text{ atm} \approx 10^5 \text{ Pa}$: فشار هوا محیط است. فشار هوا در سطح دریای آزاد حدود $10135 \times 10^5 \text{ Pa}$ (atm) گویند.

این رابطه نشان می‌دهد فشار در عمق h از سطح شاره، به اندازه ρgh از فشار P_0 در سطح شاره بیشتر است.

• تیپ ۲ - ۳: فشار کل مایع

﴿ ۴ ﴿ مسئله ﴿

چگالی آب دریاچه‌ای 1200 kg/m^3 است. درجه عمقی از سطح آب دریاچه، فشار کل برابر ۷ اتمسفر است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2, P_0 = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$)

$$P = \gamma_{\text{atm}} \Rightarrow P = 7 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow 7 \times 10^5 = 10^5 + 1200 \times 10 \times h \Rightarrow 6 \times 10^5 = 12 \times 10^3 \times h \Rightarrow h = 50 \text{ m}$$

• تیپ ۲ - ۴: نیروی حاصل از فشار مایع در عمق

﴿ ۵ ﴿ مسئله ﴿

در عمق ۲ متری آب دریاچه‌ای در بدنه یک قایق تغیری، یک سوراخ به مساحت 3 cm^2 ایجاد شده است. برای جلوگیری از نفوذ آب به درون قایق

چه نیرویی بر سطح سوراخ باید اعمال گردد؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2, \rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \xrightarrow{P = \rho gh} F = \rho ghA$$

﴿ راه حل ۴ ﴿ نکته با توجه به تعریف فشار و فشار مایع می‌توان نوشت:

چگالی و مساحت را برحسب یکای SI باید بنویسیم تا نیرو برحسب نیوتون به دست بیاید.

$$\rho = 1 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \Rightarrow \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$A = 3 \text{ cm}^2 \times \frac{1 \text{ m}^2}{10^4 \text{ cm}^2} \Rightarrow A = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

تبدیل به m^2 به cm^2

$$F = \rho ghA \Rightarrow F = 1000 \times 10 \times 2 \times 3 \times 10^{-4} \Rightarrow F = 6 \text{ N}$$


اکنون نیرو را به دست می‌آوریم:

• تیپ ۲ - ۵: اختلاف فشار در دو نقطه از یک مایع ساکن

﴿ ۶ ﴿ مسئله ﴿

مایعی به چگالی 1 kg/L درون ظرف شکل رویه را ریخته شده است. اختلاف فشار بین نقاط M و N را باید.

$$(g = 10 \text{ N/kg})$$





﴿ راه حل ۵ ﴿ نکته اختلاف فشار دو نقطه از مایع به اختلاف فاصله قائم آنها از هم بستگی دارد.

$$\Delta P_{AB} = P_B - P_A = \rho gh_B - \rho gh_A \Rightarrow \Delta P_{AB} = \rho g(h_B - h_A) \Rightarrow \Delta P_{AB} = \rho g \Delta h_{AB}$$

ابتدا اختلاف عمق نقاط M و N را از روی شکل برحسب متر به دست می‌آوریم.

$$\Delta h = 45 - 10 - 5 \Rightarrow \Delta h_{MN} = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$$

یکای چگالی را به یکای SI تبدیل می‌کنیم.



$$\rho = 1 \text{ kg/L} \times \frac{10^3 \text{ kg}}{1 \text{ m}^3} \Rightarrow \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

تبدیل لیتر به m^3

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow \Delta P_{MN} = 1000 \times 10 \times 0.3 \Rightarrow \Delta P_{MN} = 3000 \text{ Pa}$$

اختلاف فشار را حساب می‌کنیم:

• تیپ ۲ - ۶: حل مسئله با استفاده از وزن مایع

﴿ ۷ ﴿ مسئله ﴿

مقدار 3 kg روغن در یک قابلمه قرار دارد و مساحت کف قابلمه 1200 cm^2 است، فشار وارد بر کف قابلمه چند پاسکال است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

﴿ راه حل ۶ ﴿ نکته در حل بعضی از مسائل فشار مایع، که مایع در ظرف استوانه‌ای یا مکعبی شکل قرار دارد یعنی در ظرفی که سطح مقطع آن در هر ارتفاعی یکسان است، می‌توان از وزن مایع استفاده کرد.


در این مسئله روغن درون قابلمه ریخته شده است و فشار وارد بر کف خواسته شده است، این فشار ناشی از وزن مایع است.

دقت کنید که ارتفاع مایع و چگالی آن داده نشده است پس بهتر است فشار را به صورت زیر به دست آورد:

$$P = \frac{mg}{A} = \frac{3 \times 10}{1200 \times 10^4} \Rightarrow P = \frac{30 \times 10^4}{1200} \Rightarrow P = \frac{3000}{12} \Rightarrow P = 250 \text{ Pa}$$

تبدیل به m^2

۸ / مسئله



در شکل روبه‌رو ظرف تا ارتفاع h از آب پر شده است و سطح مقطع ظرف در سه قسمت از بالا به پایین به ترتیب 2 cm و 2 cm و 8 cm است. اگر ۲ لیتر آب به آب ظرف اضافه کنیم، فشار در کف ظرف چند پاسکال افزایش می‌یابد؟ ($g=10\text{ N/kg}$, $\rho_{\text{آب}}=1000\text{ kg/m}^3$)

راه حل نکته در کتاب علوم نهم اصل پاسکال به صورت زیر بیان شده است:

اصل پاسکال: هر تغییری در فشار وارد بر هر شاره تراکم‌ناپذیر و محبوس بدون کاهش به تمام قسمت‌های شاره و دیوارهای ظرف منتقل می‌شود.

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow 1000 = \frac{m}{2 \times 10^{-3}} \Rightarrow m = 2 \text{ kg} \quad W = mg \Rightarrow W = 2 \times 10 \Rightarrow W = 20 \text{ N}$$

تبديل به m^3

$$P = \frac{W}{A} \Rightarrow P = \frac{20}{0.04} \Rightarrow P = 500 \text{ Pa} \quad \text{این آب در دهانه ظرف با مساحت } 0.04 \text{ m}^2 \text{ ریخته شده است و فشاری برابر مقدار زیر ایجاد می‌کند:}$$


طبق اصل پاسکال این فشار به تمام نقاط مایع از جمله کف ظرف وارد شده و فشار وارد بر کف ظرف 500 Pa افزایش می‌یابد.

برای حل این مسئله نیز می‌توان از روش دیگری استفاده کرد. در این روش، افزایش ارتفاع آب پس از افزودن $2L$ آب را حساب می‌کنیم.

$$\Delta V = A\Delta h \Rightarrow 2 \times 10^{-3} = 0.04 \Delta h \Rightarrow \Delta h = 0.05 \text{ m}$$

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow \Delta P = 1000 \times 10 \times 0.05 = 500 \text{ Pa} \quad \text{افزایش فشار خواهد شد:}$$


• تیپ ۲ - ۷: ظروف مرتبط



در ظروف مرتبط که محتوی یک مایع معینی هستند، مایع در ظرف‌ها هم‌سطح است. علت آن نیز وابستگی فشار

مایع به عمق مایع است و این که شکل ظرف در فشار مایع ثابتی ندارد.

- در تمام ظرف‌های محتوی مایع، سطح مایع درون ظرف افقی قرار می‌گیرد.



در شکل روبه‌رو مایعی به چگالی 2000 g/L در دو ظرف مرتبط با هم ریخته شده است. فشار در نقطه A چقدر

$$(P_0 = 10^5 \text{ Pa}, g = 10 \text{ N/kg})$$

است؟ در نقطه B چطور؟ فشار در نقطه A مجموع فشار هوا و فشار مایع به ارتفاع 20 cm است. یکای چگالی را به SI تبدیل می‌کنیم:

$$\rho = 2000 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times \frac{1\text{kg}}{10^3 \text{ g}} \times \frac{1\text{m}}{1\text{m}^3} \Rightarrow \rho = 2000 \text{ kg/m}^3$$


$$P = \rho gh_A \Rightarrow P_A = 2000 \times 10 \times 0.2 \Rightarrow P_A = 4000 \text{ Pa}$$

نکته در ظروف مرتبط محتوی یک مایع ساکن فشار در تمام نقاط هم‌عمق با هم برابر است.

$$P_B = P_A = 4000 \text{ Pa}$$

عمق نقطه B و عمق نقطه A یکسان است، بنابراین فشار در نقطه B خواهد شد:

• تیپ ۲ - ۸: فشار حاصل از دو یا چند مایع



در شکل روبه‌رو دو مایع با چگالی‌های 900 kg/m^3 و 800 kg/m^3 درون ظرف استوانه‌ای شکلی ریخته شده‌اند.

(الف) فشار در کف ظرف چقدر است؟ (ب) فشار حاصل از دو مایع در نقطه A را بیابید. ($P_0 = 10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \text{ N/kg}$)


راه حل نکته هرگاه چند مایع مخلوط‌نشدنی درون ظرفی ریخته می‌شود، مایع‌ها به ترتیب چگالی روی هم قرار می‌گیرند

و مایع دارای بیشترین چگالی تهنه‌شین می‌شود و مایع دارای کمترین چگالی روی سطح قرار می‌گیرد.

$P_A > P_B > P_C$ فشار حاصل از چند مایع درون ظرف مجموع فشار تک تک مایع‌ها است.

(الف) مایعی که تهنه‌شین شده دارای چگالی 900 kg/m^3 است. فشار در کف ظرف را حساب می‌کنیم:

$$P_{\text{کل}} = P_0 + P_1 + P_2 \Rightarrow P = P_0 + \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2 \Rightarrow P = 10^5 + 900 \times 10 \times 0.3 + 800 \times 10 \times 0.2 \Rightarrow P = 10^5 + 2700 + 1600 \Rightarrow P = 104300 \text{ Pa}$$



$$P_A = \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2 \Rightarrow P_A = 900 \times 10 \times 0.3 + 800 \times 10 \times 0.2 \Rightarrow P_A = 1800 + 1600 = 3400 \text{ Pa}$$


در این بخش نمونه سوالاتی که اهمیت طرح در امتحان نهایی دارند، برای تمرین کردن تمیز و مفوب تمرین کنید.
شماره تیپ هر سوال کثیرش او مرده که آنکه نتوصتی هم کنی، بتونی از درس نامه اون تیپ رو مطالعه کنی.

تمرین‌های بخش دوم

۷۶ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.



(الف) در شکل روبرو تنید خروجی آب از قسمت‌های A و B را با هم مقایسه کنید. [شکل ۲-۱۲، صفحه ۳۳ کتاب درسی](#)




(ب) در شکل روبرو نقاط A و B در مخزن گاز و A' و B' نقاطی در یک مایع‌اند. فشار نقاط A و B را با یکدیگر و سپس فشار نقاط A' و B' را نیز با هم مقایسه کنید. [شکل ۲-۱۵، صفحه ۳۴ کتاب درسی](#)

۷۷ (الف) در عمق ۸ متری مایعی، فشار کل ۱/۱۰۰۰۰۰ پاسکال است. اگر فشار هوا ۱ اتمسفر باشد، چگالی مایع را بدست آورید. ([تیپ ۲ - ۲ و ۳ - ۳ مثال ۲-۲، صفحه ۳۵ کتاب درسی](#))
 $(g = 10 \text{ N/kg}, 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa})$

(ب) اگر فشار هوا 10^5 پاسکال باشد، فشار در عمق ۲ متری آب یک استخراج چند پاسکال است؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)

۷۸ (الف) در شکل روبرو فشار در نقاط A و B را حساب کنید. ($P_{\text{آب}} = 10^5 \text{ Pa}, g = 10 \text{ N/kg}, \rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$) [مثال ۲-۲، صفحه ۳۵ کتاب درسی](#)

(ب) همچنین فشار حاصل از آب را در نقاط A و B به دست آورید. ([تیپ ۲ - ۲ و ۳ - ۳](#))
(پ) فشار در نقاط A و C را با هم مقایسه کنید.




۷۹ در عمق ۵ cm مایعی فشار 100 kPa و در عمق ۲۰ cm آن فشار 106 kPa است: ([تیپ ۲ - ۲ و ۳ - ۳](#))

(الف) چگالی مایع را بدست آورید.

(ب) فشار هوای محیط را حساب کنید.

۸۰ در سه ظرف نشان داده شده آب ریخته شده است. در کدامیک از ظرف‌ها نیروی وارد از طرف آب بر دیواره ظرف عمود است? ([تیپ ۲ - ۱ - ۱](#))



۸۱ (الف) هواییابی در ارتفاعی از سطح زمین در حال پرواز است. فشار هوا در این ارتفاع 70 kPa است. اگر پنجره‌های هواییما دایره‌های با قطر

40 cm باشد، نیروی وارد بر سطح خارجی این پنجره‌ها چند نیوتون است؟ ($\pi \approx 3$) ([تیپ ۲ - ۱ و ۴ - ۴](#)) [مثال ۲-۱، صفحه ۳۶ کتاب درسی](#)

(ب) شناگری در عمق ۵ متری از سطح آب دریاچه‌ای شنا می‌کند. اگر مساحت پرده گوش را یک سانتی‌متر مربع فرض کنیم، بزرگی نیرویی که به پرده گوش این شناگر وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ (فسار هوا را 10^5 پاسکال بگیرید و $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$) [مثال ۲-۱، صفحه ۳۶ کتاب درسی](#)


(پ) یک زیردریابی در عمق 200 متری زیر آب غوطه‌ور است. بالای این زیردریابی دریچه‌ای مربعی به ابعاد 8×8 cm نصب شده است. برای بازگردان این دریچه حداقل چند نیوتون نیرو لازم است؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$) [مثال ۲-۱، صفحه ۳۳ کتاب درسی](#)

۸۲ در یک لوله استوانه‌ای قائم تا ارتفاع 10 cm مایعی به چگالی 2 g/cm^3 می‌ریزیم. قطر داخلی لوله 4 cm است. (الف) فشار وارد بر کف استوانه را حساب کنید. ($P_{\text{آب}} = 10^5 \text{ Pa}, g = 10 \text{ N/kg}$) ([تیپ ۲ - ۶](#))

(ب) فشار حاصل از مایع در کف استوانه را حساب کنید.

(پ) نیروی وارد از طرف مایع بر کف لوله را بدست آورید.


(ت) نیروی وارد بر کف لوله را بدست آورید.




۸۳ در شکل زیر، مایع درون لوله‌های مرتبط در حال تعادل است. الف) فشار در نقاط A, B, C, D را با هم مقایسه کنید. (تیپ ۲ - ۵ و ۷ - ۴، صفحه ۳۴)

ب) فشار حاصل از مایع در نقطه D چقدر است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

پ) اگر مساحت مقطع شاخه سمت راست برابر 10 cm^2 باشد، نیروی وارد به انتهای این شاخه چند نیوتون است؟



ت) در ظرف حاوی آب (شکل مقابل) اگر قطعه چوب را روی سطح آب قرار دهیم فشار در نقطه A به اندازه ΔP_A و در نقطه B به اندازه ΔP_B افزایش می‌یابد. ΔP_A و ΔP_B را با هم مقایسه کنید.



الف) در شکل زیر جسم درون مایعی غوطه‌ور است. اگر فشار در بالا و زیر جسم به ترتیب 100 kPa و 115 kPa باشد، چگالی شاره را بدست آورید. (تیپ ۲ - ۵)

ب) استوانه‌ای توپر که شعاع قاعده آن 20 cm است، مطابق شکل درون آب به چگالی 1000 kg/m^3 غوطه‌ور است. اختلاف نیرویی که از طرف آب به قاعده‌های پایین و بالای استوانه وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ ($\pi \approx 3.14$)

تمرین ۲ - ۲، صفحه ۳۶ کتاب درسی

۸۴ در سؤالات زیر نسبت‌های خواسته شده را بدست آورید. (تیپ ۲ - ۲ و ۴ - ۲)


الف) دو ظرف مشابه A و B در اختیار داریم. در هر دو ظرف تا ارتفاع یکسان مایع می‌ریزیم. مایع ریخته شده در ظرف A دارای چگالی 800 kg/m^3 و مایع ریخته شده در ظرف B دارای چگالی 1000 kg/m^3 است. نسبت فشار مایع در کف ظرف A به فشار مایع در کف ظرف B را بیابید.

ب) دو ظرف مکعب شکل A و B در اختیار داریم که ابعاد ظرف A دو برابر ابعاد ظرف B است. اگر هر دو ظرف را از مایع یکسانی پر کنیم، فشار مایع در کف ظرف A چند برابر فشار مایع در کف ظرف B است؟

پ) ظرف مکعب‌شکل A پر از مایع بوده و فشار در کف ظرف برابر P_A است. اگر تمام مایع را در ظرف مکعب‌شکل B بریزیم که ابعاد آن

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{1000}{800} = 1.25$$


ت) در قسمت‌های (ب) و (پ) نسبت نیروی وارد از طرف مایع بر کف ظرفها را حساب کنید.



۸۶ شکل زیر، نمودار فشار بر حسب عمق مایع (h) را نشان می‌دهد.

الف) چگالی مایع را حساب کنید. ($g = 10 \text{ N/kg}$)


ب) فشار حاصل از مایع در عمق 1 m را بیابید.



۸۷ در ظرف‌های شکل رویه‌رو مقداری آب ریخته شده است. (تیپ ۲ - ۴)

الف) فشار در کف ظرفها را با هم مقایسه کنید.



ب) نیروی وارد بر کف ظرفها توسط مایع را با هم مقایسه کنید.



۸۸ در شکل‌های زیر در ظرف‌ها مایعی به چگالی 1000 kg/m^3 ریخته شده است.

نیرویی که مایع بر کف ظرف وارد می‌کند چند نیوتون است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)


(تیپ ۲ - ۴)



الف) در شکل روبه رو فشار حاصل از مایع های A و B به چگالی های $\rho_A = 1/2 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_B = 2/8 \text{ g/cm}^3$ در کف ظرف چقدر است؟ (تیپ ۲ - ۸)

ب) در شکل روبه رو مساحت قاعده ظرف 5 cm^2 و جرم مایع های A و B به ترتیب 300 g و 500 g است، فشار در کف ظرف ناشی از دو مایع را باید.

پ) در یک استوانه، دو مایع A و B با چگالی های ρ_A و $\rho_B = 2\rho_A$ به جرم های یکسان می ریزیم. فشار حاصل از مایع ها وارد بر کف P_1 می شود. اگر دو مایع را به هم بزنیم دو مایع در هم حل می شوند، فشار حاصل از محلول وارد بر کف P_2 می شود. P_2/P_1 را بدست آورید.





در شکل روبه رو ظرف از دو قسمت استوانه ای شکل تشکیل شده است که سطح مقطع استوانه ها 5 cm^2 و 25 cm^2 است. (تیپ ۲ - ۸) $\rho_{\text{روغن}} = 0.8 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$

الف) فشار در کف ظرف مایع ها را باید؛ ب) نیروی وارد بر کف از طرف مایع ها را باید.

۹۱ مساحت سطح مقطع یک ظرف استوانه ای 20 cm^2 است و در آن تا ارتفاع 10 cm آب ریخته شده است. روی آب چند گرم روغن بریزیم تا


فشار حاصل از این دو مایع در کف استوانه برابر 2000 Pa شود؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$) (تیپ ۲ - ۸)



بخش سوم: لوله های U

شکل

صفحة ۳۵ کتاب درسی




۱- لوله U شکل در واقع دو ظرف مرتبط به هم است که تمام نقاط روبه رو به هم در آنها که در یک مایع قرار داشته باشند دارای فشار یکسان هستند (در نقطه M و N فشارها مختلف است).

۲- در لوله U شکل مایع دارای چگالی بیشتر همواره تهشین می شود.

۳- خط تراز: بالاترین نقطه ای که در آن مایع در دو طرف یکسان است را خط تراز گویند.

• تیپ ۳ - ۱: ارتفاع مایع یا مایع ها در دو شاخه پرسیده شود.



در شکل روبه رو مقداری آب در یک لوله U شکل قرار دارد. در شاخه سمت راست لوله آنقدر روغن می ریزیم تا ارتفاع روغن به 5 cm برسد. اختلاف ارتفاع آب در دو شاخه چند سانتی متر است؟

$$(\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3, \rho_{\text{روغن}} = 0.8 \text{ g/cm}^3)$$

راه حل در حل مسائل لوله های U شکل، همواره خط تراز را رسم کرده و فشار نقاط واقع بر خط تراز را برابر قرار می دهیم. فشار در هر نقطه برابر مجموع فشارهای بالای سر آن نقطه است.

فشار نقاط A و B که روی خط تراز قرار دارند یکسان است.

$$\begin{aligned} P_A &= P_B \Rightarrow P_0 + \rho_w gh_w = P_0 + \rho_0 gh_0 \\ \rho_w h_w &= \rho_0 h_0 \end{aligned}$$


در جایگذاری در روابط لوله U شکل هرگاه در دو طرف تساوی تنها رابطه ρgh داشته باشیم نیازی به تبدیل یکانیست بلکه تنها کافیست

$$1 \times h_w = 0.8 \times 5 \Rightarrow h_w = 4 \text{ cm}$$


یکاها در طرفین تساوی یکسان باشد. (مثلاً یکای چگالی در دو طرف g/cm^3 باشد).

در این قسمت، برای مکالمه کاری سوالاتی که کمی سطح بالاتری از آزمون نهایی دارند، آورده‌یم؛ اگه فکر می‌کنی که سوالات بخش‌های قبلی رو کامل بلدی و دنبال سوال سفت‌تر هستی، هنماً این قسمت رو هم کن.

مسائل تکمیلی




- ۱ در یک استخیر مطابق شکل روبرو مقداری مایع وجود دارد. اگر فشار در نقطه A برابر $\frac{4}{4} \text{ atm}$ و در نقطه B برابر $\frac{4}{4} \text{ atm}$ باشد، فشار در نقطه C چند اتمسفر است؟




- ۲ مطابق شکل روبرو دو جسم مکعبی شکل که طول اضلاع آنها a و $2a$ است، در دو ظرف حاوی مایع به چگالی‌های ρ_1 و ρ_2 غوطه‌ور و در حال تعادل هستند. اگر اختلاف فشار بین سطح پایین و سطح بالایی مکعب‌ها در دو مایع با هم برابر باشد، ρ_1 / ρ_2 را به دست آورید.

- ۳ در یک لوله آزمایش تا ارتفاع ۲۸ سانتی‌متر به جرم‌های مساوی جیوه و آب ریخته‌ایم. فشار وارد بر کف ظرف از طرف دو مایع چند کیلوپاسکال است؟ ($\rho_{H_2O} = 1 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{Jiwe} = 13 \text{ g/cm}^3$)




- ۴ در شکل روبرو اگر $L/2$ آب به درون ظرف بریزیم ($A_2 = 125 \text{ cm}^2$, $A_1 = 50 \text{ cm}^2$, $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)
الف) فشار وارد بر کف از طرف آب چند پاسکال است?
ب) نیروی وارد بر کف ظرف چند نیوتون است؟




- ۵ در شکل روبرو ظرفی محتوی آب نشان داده شده است:
($\rho = 1 \text{ g/cm}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$)


- الف) فشار وارد بر کف ظرف توسط مایع را بیابید.
ب) اگر فشار هوای محیط 1 bar باشد، فشار کل وارد بر کف ظرف را بیابید.
پ) نیروی وارد از طرف مایع بر ته ظرف را بیابید
ت) نیروی کل وارد بر ته ظرف را بیابید؟




- ۶ در شکل داده شده حجم و عمق آب در هر دو ظرف مشابه‌اند.
الف) فشار وارد بر کف ظرف‌ها از طرف آب را با هم مقایسه کنید.
ب) نیروهای وارد بر کف ظرف از طرف آب را با هم مقایسه کنید.
پ) نیروی وارد بر سطح افقی که ظرف‌ها روی آن قرار دارند از طرف دو ظرف را با هم مقایسه کنید.




- ۷ در شکل روبرو، آب یک مخزن توسط شیلنگی به سطح مقطع 5 cm^2 بیرون می‌ریزد. اگر ته شیلنگ توسط چوب‌پنبه بسته شود و جریان آب قطع گردد، نیروی اصطکاک بین چوب‌پنبه و شیلنگ چند نیوتون است؟ ($P_0 = 10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \text{ N/kg}$, $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)




- ۸ در شکل روبرو دو مایع با چگالی‌های $1/2 \text{ g/cm}^3$ و $1/9 \text{ g/cm}^3$ در یک لوله U شکل قرار دارند. اختلاف فشار بین دو نقطه A و B چند پاسکال است؟




- ۹ در شکل روبرو، قطر قاعده دو استوانه با هم برابر و قطر لوله رابط ناچیز است. اگر شیر ارتباط را باز کنیم، سطح مایع A چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟ ($\rho_A = 2\rho_B$)




- ۱۰ شکل روبرو چگالی هوا در ارتفاع‌های مختلف را نشان می‌دهد. اگر اختلاف فشار هوا از سطح زمین تا ۵ km سطح زمین را ΔP_1 و از ۵ km سطح زمین تا ۱۰ km سطح زمین را ΔP_2 بگیریم، ΔP_1 و ΔP_2 را با هم مقایسه کنید.



- ۱۱ در شکل روبرو لوله به وسیله نیروی $F = 27\text{ N}$ در نقطه A در حالت تعادل باقی مانده است. فشار هوا محیط چند سانتی‌متر جیوه است؟ (مساحت سطح لوله 5 cm^2 و $\rho = 13/5\text{ g/cm}^3$ مایع جیوه است.)




- ۱۲ در شکل روبرو بالای لوله A تقریباً خلاً است.
الف) فشار در انتهای لوله B چند سانتی‌متر جیوه و چند پاسکال است؟ ($\rho_{جیوه} = 13/6\text{ g/cm}^3$)
ب) اگر سطح مقطع لوله‌ها ۵ cm² باشد، نیروی وارد بر انتهای لوله B چند نیوتون است؟




- ۱۳ در شکل مقابل اگر فشار مخزن A ۸۴ cmHg، فشار در نقطه M چند سانتی‌متر جیوه است؟ ($\rho_{جیوه} = 13/6\text{ g/cm}^3$, $\rho_{Hg} = 13/8\text{ g/cm}^3$)



- ۱۴ در شکل روبرو، چگالی مایع درون لوله $\rho = 12\text{ g/cm}^3$ و فشار گاز درون مخزن 10^4 Pa است، اگر مخزن سوراخ شود. مایع در شاخه سمت چپ چند سانتی‌متر پایین می‌رود؟ ($P_0 = 10^5\text{ Pa}$)




- ۱۵ در شکل روبرو، قطر شاخه A نصف قطر شاخه B است و درون لوله U شکل، جیوه قرار دارد. شاخه A را به یک مخزن گاز وصل می‌کنیم. در شاخه A جیوه ۲ cm پایین می‌رود. فشار پیمانه‌ای مخزن گاز چند سانتی‌متر جیوه است؟




۱۶ مطابق شکل رو به رو دو قطعه آلمینیم و سرب با سطح مقطع یکسان توسط نخی درون ظرفی محتوی آب قرار دارند. ($\rho_{\text{Pb}} > \rho_{\text{Al}}$)


- (الف) اگر حجم دو قطعه آلمینیم و سرب یکسان باشد، نیروی شناوری وارد بر دو قطعه را با هم مقایسه کنید.
 (ب) اگر جرم دو قطعه آلمینیم و سرب یکسان باشد، نیروی شناوری وارد بر دو قطعه را با هم مقایسه کنید.



۱۷ در شکل رو به رو لوله پر از آب با جریان یکنواخت و لایه‌ای است. اختلاف فشار در قسمت‌های A و B را به دست آورید. ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)



۱۸ در شکل رو به رو قطر سطح مقطع لوله‌ها در (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب 10° ، 4° و 8° سانتی‌متر است. اگر تندی حرکت شاره در (۲) برابر با 10 cm/s و در (۳) برابر با 5 cm/s باشد، تندی شاره در (۱) چند cm/s بوده است؟














۱۹ در ماشین‌های مسابقه فرمول ۱، بال عقب به چه منظوری کار گذاشته شده و براساس کدام اصل فیزیکی کار می‌کند؟

مسائل امتحانی بارمبندی شده



این قسمت پنجه بمعنی بندی داره و از هر قسمت پندرتا سؤال فوب آوردیم، مثل آزمون‌ها، نمره هر قسمت از هل سؤال در پاسخ مشففن شده تابعی هساب کنی که په نمره‌های می‌گیری.

ردیف	حالتهای ماده - نیروی بین مولکولی	بارم
۱	<p>به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) انواع جامدات را نام بده و برای هر کدام مثالی بزنید.</p> <p>(ب) تفاوت این جامدها چیست؟</p>	۰/۵
۲	<p>در عبارت‌های زیر کلمه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) سطح جیوه درون لوله موین (فرورقته - افقی - برآمده) است:</p> <p>(ب) آب در لوله موین روغنی شده (بالاتر - پایین‌تر) از سطح آزاد مایع درون ظرف قرار می‌گیرد.</p> <p>(پ) مولکول‌های (جامد، مایع، گاز) به سهولت روی یکدیگر می‌لغزند و جاری می‌شوند.</p> <p>(ت) قطره آب که از شیر جدا می‌شود به علت (نیروی دگرسی - کشش سطحی) در حین سقوط به صورت قطره باقی می‌ماند.</p> <p>(ث) فاصله مولکول‌ها در گازها در حدود ($چند\text{ }d - 10^\circ$) برابر فاصله آن‌ها در مایع و جامد است.</p> <p>(ج) افزودن چند قطره مایع شوینده به آب سبب (افزایش - کاهش) کشش سطحی می‌شود.</p>	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
۳	<p>با توجه به کلمات موجود در کادر زیر عبارت‌های داده شده را کامل کنید.</p> <p>«بلورین - نسبت به - پلاسما - کندی - معدنی - فلزها - تراکم‌ناپذیری - به تنی - دماهای بالا - آمورف - نوسان‌های - رانشی»</p> <p>(الف) ماده درون ستارگان از تشکیل شده است. این ماده اغلب در بوجود می‌آید.</p> <p>(ب) در جامدها، ذرات تشکیل‌دهنده در مکان‌های معینی یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکان‌ها، بسیار کوچکی دارند.</p> <p>(پ) در جامدها مثل نمک، الماس و بیشتر مواد اتم‌ها در یک الگوی سه بعدی تکرار می‌شوند.</p> <p>(ت) وقتی مایعی به سرد شود اغلب جامد بلورین تشکیل می‌شود و چنانچه سرد شود جامد بوجود می‌آید.</p> <p>(ث) نیروی قوی بین مولکول‌های مایع علت آن است.</p>	۰/۵ ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۵
۴	<p>به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) بعضی اوقات مشاهده می‌شود که بعضی حشرات روی سطح آب ایستاده‌اند، علت را بیان کنید.</p> <p>(ب) افزایش دمای یک مایع چه تأثیری بر نیروی هم‌چسبی مولکول‌های مایع و چه تأثیری بر جاری شدن مایع دارد؟</p> <p>(پ) در زمستان خیلی از خانواده‌ها کولر آبی بالای بام منزل خود را با چادر برزنتی می‌بوشانند و با طناب آن را می‌بندند. در روزهایی که باد با سرعت می‌وزد، این چادرهای برزنتی پف می‌کنند، علت را توضیح دهید.</p>	۰/۵ ۰/۵ ۰/۵
	فشار شاره	
۵	<p>در ظرفی مطابق شکل، آب ریخته شده است. فشار در نقاط A، B و C را به ترتیب با P_A، P_B و P_C نشان می‌دهیم. فشار در نقاط A، B و C را با هم مقایسه کنید.</p>	۰/۵
۶	<p>در شکل رویه رو چگالی مایع درون ظرف 4 g/cm^3 است. اختلاف فشار بین دو نقطه A و B چند کیلوپاسکال است؟</p>	۱/۵

۰/۷۵	<p>فشار وارد بر کف دریاچه‌ای ($\rho=1200\text{ kg/m}^3$, $g=10\text{ N/kg}$) ۲۴۰kPa و فشار هوا در این محل ۹۰kPa است. عمق دریاچه چند متر است؟</p>	۷
۱/۲۵	 <p>در شکل روبرو ظرفی محتوی جیوه نشان داده شده است. نیروی وارد از طرف جیوه بر کف ظرف 135 N است. ارتفاع h چقدر است؟ ($g=10\text{ N/kg}$, $\rho_{جیوه}=1350\text{ kg/m}^3$)</p>	۸
۱/۲۵	 <p>دو مایع A و B با حجم‌های یکسان 50 cm^3 که چگالی آنها 12 g/cm^3 و 6 g/cm^3 است. در یک ظرف با سطح مقطع 10 cm^2 ریخته شده‌اند.</p> <p>(الف) فشار وارد بر کف ظرف از طرف هر دو مایع چقدر است.</p> <p>(ب) نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع‌ها را به دست بیاورید.</p>	۹
۰/۷۵	<p>(الف) ظرف مکعب‌شکلی پر از مایع است. اگر ابعاد مکعب را دو برابر کرده و از همان مایع پر کنیم. فشار وارد از طرف مایع به کف ظرف نسبت به حالت قبل چند برابر می‌شود؟</p> <p>(ب) نیروی وارد از طرف مایع بر کف ظرف در حالت دوم چند برابر حالت اول است؟</p>	۱۰
۱	 <p>نمودار تغییرات فشار ناشی از مایع بر حسب فاصله از کف ظرف به صورت مقابل است. در چه فاصله‌ای از کف ظرف فشار ناشی از مایع برابر با 2400 Pa می‌شود؟ ($g=10\text{ N/kg}$)</p>	۱۱
۱	<p>یک منبع مکعب شکل به ضلع ۲ متر پر از آب است. اگر آب درون آن را درون مخزن استوانه‌ای شکل به سطح قاعده 4 m^2 بریزیم.</p> <p>فشار وارد بر کف استوانه چند برابر فشار آب وارد بر کف مکعب می‌شود؟</p>	۱۲
لوله U شکل		
۰/۵	 <p>دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های 12 g/cm^3 و 8 g/cm^3 در حال تعادل هستند.</p> <p>(الف) کدام مایع در قسمت زیرین ظرف قرار دارد.</p> <p>(ب) h_2 را حساب کنید.</p>	۱۳
۱/۵	 <p>در شکل روبرو مایع در لوله U شکل در حال تعادل است و پیستون با بدنه لوله اصطکاک ندارد. جرم پیستون را به دست آورید. (مساحت مقطع لوله ها 10 cm^2) ($g=10\text{ N/kg}$)</p>	۱۴
۰/۷۵ ۱/۲۵	 <p>در شکل روبرو دو مایع در حال تعادل‌اند. اگر چگالی مایع ρ_1 برابر 3 g/cm^3 باشد:</p> <p>(الف) چگالی مایع ρ_2 را حساب کنید.</p> <p>(ب) اختلاف فشار بین دو نقطه A و B را به دست آورید.</p>	۱۵
۱	 <p>در شکل روبرو، آب و روغن در یک لوله U شکل به حال تعادل‌اند. چگالی روغن چند برابر چگالی آب است؟</p>	۱۶

۱/۲۵		در شکل رویه رو یک لوله U شکل محتوی آب نشان داده است. اگر در شاخه سمت راست به ارتفاع ۵cm و در شاخه سمت چپ به ارتفاع ۱۰cm رونمایی کنیم، سطح آب نسبت به حالت اول چند سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود؟ ($\rho_{آب} = 1g/cm^3$, $\rho_{رونمایی} = 1.01g/cm^3$)	۱۷
۱/۲۵		فشارسنج هوای (بارومتر)	
۱/۲۵	عمق یک مایع در مخزن ۵m و چگالی آن $1.01g/cm^3$ است. اگر فشار هوای در محل مخزن ۷۵cmHg باشد، فشار وارد بر کف مخزن چند سانتی‌متر جیوه است؟ ($g = 10N/kg$, $\rho_{جیوه} = 1.01g/cm^3$)		۱۸
۱/۲۵	هر دو شکل زیر یک فشارسنج ساده را نشان می‌دهد، فشار هوای در شهرهای A و B چند پاسکال است. ($g = 10N/kg$, $\rho_{جیوه} = 1.01g/cm^3$)		۱۹
۱	وزنهای که روی روزنۀ خروج بخار آب قرار داده می‌شود	مطابق شکل رویه رو زودپزی در اختیار داریم که روی آن روزنۀ خروج بخار آب به شاعع ۱mm قرار دارد. اگر بخواهیم فشار داخل نگه داشته شود، باید روی روزنۀ زودپزی وزنهای با چه جرمی قرار دهیم؟ ($P_0 = 1bar$, $g = 10N/kg$, $\pi = 3$)	۲۰
۱/۵	در یک منطقه یک کلبه در کنار دریا و یک کلبه در ارتفاع ۱km از سطح دریا ساخته شده است. مساحت هر یک از پنجره‌های دو کلبه $2000cm^2$ و چگالی هوای محیط $1.01g/cm^3$ است، نیروی وارد بر هر پنجره توسط هوای بیرون کلبه‌ها چند نیوتون تفاوت دارد؟		۲۱
۱/۲۵	در مکانی فشارسنج جیوه‌ای فشار هوای محیط را $670mmHg$ نشان می‌دهد. ارتفاع این مکان از سطح دریا تقریباً چند متر است؟ ($g = 10N/kg$, $\rho_{آب} = 1.01kg/m^3$, $P_0 = 1.013 \times 10^5 Pa$, $\rho_{جیوه} = 1.01g/cm^3$)		۲۲
۱/۵		در شکل رویه رو نیروی وارد از طرف جیوه بر انتهای بسته لوله به مساحت $2/5cm^2$ را حساب کنید. (فشار هوای معادل $76cmHg$ است و $\rho_{جیوه} = 1.01g/cm^3$)	۲۳
۱/۲۵		مقداری آب و جیوه درون استوانه‌ای مطابق شکل قرار دارند. اگر فشار هوای $76cmHg$ باشد. فشار وارد بر ته استوانه چند سانتی‌متر جیوه است؟ ($\rho_{آب} = 1g/cm^3$, $\rho_{جیوه} = 1.01g/cm^3$)	۲۴
۱/۲۵		فشارسنج شاره‌ها (مانومتر)	
۱/۲۵		در شکل رویه رو فشار گاز محبوس در انتهای لوله $76cmHg$ و فشار هوای $72cmHg$ است. ارتفاع آب درون لوله (h) را بدست آورید. ($\rho_{آب} = 1g/cm^3$, $\rho_{جیوه} = 1.01g/cm^3$, $P_0 = 1.013 \times 10^5 Pa$)	۲۵

۱/۵	<p>در شکل رو به رو، فشار سنج بوردون عدد $3 \times 10^5 \text{ Pa}$ را نشان می‌دهد و مایع درون لوله‌ها یکسان و دارای چگالی 1.2 g/cm^3 است. مقدار h را باید.</p>	۲۶
۱/۲۵	<p>در شکل رو به رو، اگر فشار هوا 10^5 Паскаль و چگالی جیوه 1.2 g/cm^3 باشد، فشار گاز درون مخزن چقدر است؟</p>	۲۷
۱/۲۵	<p>در شکل مقابل، حجم دو مایع $\rho_A = 1.2 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_B = 1.8 \text{ g/cm}^3$ درون لوله شکل برابر است. فشار پیمانه‌ای مخزن را باید.</p>	۲۸
۱	<p>در شکل زیر فشارسنج، چه عددی بر حسب Pa را نشان می‌دهد.</p> $(P_0 = 10^5 \text{ Pa}, \rho = 1.8 \text{ g/cm}^3, g = 10 \text{ N/kg})$	۲۹
۱/۵	<p>در شکل مقابل مقداری هوا در درون لوله (سمت چپ) محبوس شده است. فشار گاز درون مخزن برابر 75 cmHg است. فشار هوا محبوس بر حسب کیلوپاسکال کدام است؟</p> $(\rho = 1.2 \text{ g/cm}^3, g = 10 \text{ N/kg})$	۳۰
	شناوری - برنولی	
۰/۷۵	روزهایی که باد می‌وزد، ارتفاع موج‌های دریا یا اقیانوس بالاتر از ارتفاع میانگین می‌شود. با اصل برنولی چگونه می‌توان افزایش ارتفاع موج را توضیح داد؟	۳۱
۰/۷۵	آب با تندی 20 cm/s در لوله‌ای به سطح مقطع 1 m^2 در حال حرکت است.	۳۲
۰/۵	الف) آهنگ شارش حجمی آب درون لوله را به دست آورید؟	
۰/۷۵	ب) اگر سطح مقطع را نصف کنید آهنگ شارش حجمی آب چند برابر می‌شود؟	
۰/۵	پ) اگر سطح مقطع را نصف کنیم تندی آب چند سانتی متر بر ثانیه می‌شود؟	
۰/۵	با توجه به شکل رو به رو جاهای خالی را پر کنید.	۳۳
۰/۵	الف) جسم A بوده و چگالی آن چگالی آب است.	
۰/۵	ب) جسم B غوطه‌ور بوده و نیروی وزن وارد بر جسم نیروی شناوری و چگالی آن چگالی آب است.	
۰/۵	پ) جسم C در حال فروختن بوده و نیروی وزن وارد بر جسم نیروی شناوری و چگالی آن چگالی آب است.	

۱ / ۲۵	 <p>قطر سطح مقطع (۲)، نصف قطر سطح مقطع (۱) است. اگر تنیدی حرکت آب در قسمت (۲) باشد، تنیدی در قسمت (۱) چند m/s است؟</p>	۳۴
۰ / ۷۵	 <p>در شکل رویه‌رو، اختلاف سطح شاره در لوله‌های (۱) و (۲) را بر اساس اصل برنولی توضیح دهید.</p>	۳۵
۱	 <p>سه جسم با جرم یکسان در سه وضعیت رویه‌رو در ظرف مایعی در حال تعادل قرار دارند. نیروی شناوری وارد بر آنها را با هم مقایسه کنید.</p>	۳۶
موفق و پیروز باشید		

فصل دوم



۷۰ | الف) کاهش / ب) هم‌چسبی - دگرچسبی - بیشتر / پ) برآمده - فرورفته

الف) نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و دوده بیشتر است. از این‌رو آب به صورت قطره بر سطح این شیشه قرار می‌گیرد. ب) نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و شیشه از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب بیشتر بوده و در محل تماس آب و جداره لوله موین سبب بالا کشیده شدن آب در این محل‌ها شده و قسمت میانی آب پایین‌تر قرار می‌گیرد و سطح آب دارای فرو رفتگی می‌شود. در مورد جبوه برعکس است و نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های جیوه سبب می‌گردد سطح جیوه درون لوله برآمده باشد.



پ) علت مرطوب بودن دیواره کنار باغچه، خاصیت موینگی است که سبب می‌گردد آب درون دیواره باغچه بالا رود. ا) عامل بالا رفت نفت از فتیله چراخ نفی خاصیت موینگی است. نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های نفت و فتیله از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های نفت بیشتر است.

۷۱ | الف) هنگامی که نیروی هم‌چسبی مایع بیشتر بکدیگر را

ب) علت آب درون دیواره باغچه بالا رود. ا) عامل بالا رفت نفت از فتیله چراخ نفی خاصیت موینگی است. نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های نفت و فتیله از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های نفت بیشتر است.

۷۲ | الف) هنگامی که نیروی هم‌چسبی مایع

ب) علت آب درون دیواره باغچه بالا رود. ا) عامل بالا رفت نفت از فتیله چراخ نفی خاصیت موینگی است. نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های نفت و فتیله از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های نفت بیشتر است.

۷۳ | الف) به دلیل کمتر بودن چگالی نفت از آب، نفت روی سطح آب

قرار می‌گیرد. ب) نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و شیشه از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب بیشتر بوده که سبب می‌گردد آب به صورت یک لایه نازک روی سطح قرار می‌گیرد. مانند آب روی شیشه.

۷۴ | الف) هرچه لوله موین تر باشد، آب درون آن

ب) علت آب درون لوله موین تر باشد. آب درون آن بیشتر بالا می‌رود.

۷۵ | در شکل (الف) سطح در کناره‌ها که مایع باشیشه در تماس است بالاتر قرار گرفته، پس نیروی بین مایع و شیشه (دگرچسبی) از نیروی مولکول‌های مایع به هم وارد می‌کند (هم‌چسبی) بیشتر است. / در شکل (ب) سطح مایع در وسط لوله بالاتر قرار گرفته است. پس نیروی بین مایع و شیشه (دگرچسبی) در کناره‌های لوله کمتر از نیروی بین مولکول‌های مایع (هم‌چسبی) در مرکز لوله می‌باشد.

۷۶ | الف) عمق مایع در نقطه A از عمق مایع در نقطه B بیشتر است در

نتیجه فشار مایع در سوراخ A از فشار مایع در سوراخ B بیشتر بوده که سبب می‌گردد تندی خروجی آب در A بیشتر از B باشد.

ب) در یک مخزن گاز فشار در تمام نقاط گاز یکسان است:

$P_A = P_B$

در یک مایع ساکن فشار در نقاط عمیق‌تر بیشتر است:

$P_B > P_A'$

۷۷ | الف) کاهش / ب) هم‌چسبی - دگرچسبی - بیشتر / پ) برآمده - فرورفته

الف) نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و دوده بیشتر است. از این‌رو آب به صورت قطره بر سطح این شیشه قرار می‌گیرد. ب) نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و شیشه از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب بیشتر بوده و در محل تماس آب و جداره لوله موین سبب بالا کشیده شدن آب در این محل‌ها شده و قسمت میانی آب پایین‌تر قرار می‌گیرد و سطح آب دارای فرو رفتگی می‌شود. در مورد جبوه برعکس است و نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های جیوه سبب می‌گردد سطح جیوه درون لوله برآمده باشد.

۷۸ | الف) هر سه شکل بیانگر کشش سطحی است. وقتی قلم مو از آب

کشیده شود، کشش سطحی مولکول‌های آب سبب نزدیک شدن موئای آن به هم می‌شود. دقیقاً شبیه شکل (ب) که قطره‌های آب که از سطح رو به بالا

پرتاب شده‌اند، شکل کروی دارند. در شکل (پ) هم حباب‌های آب و صابون به علت کشش سطحی به وجود آمده است.

۷۹ | الف) بین ریزگردها نیروی ریاضی محسوسی وجود ندارد به همین علت

با وزش باد از هم جدا شده و در فضای پخش می‌شوند. اما نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب به اندازه‌ای است که با توفان‌های شدید دریابی تنها مقدار کمی آب به صورت قطره‌های ریز به طرف بالا می‌پاشد. / ب) مایع ظرفشویی سبب می‌گردد نیروی کشش سطحی بین مولکول‌های آب ضعیف گردد و سوزن در آب فرود رود. / پ) با افزایش دمای روغن نیروی هم‌چسبی کاهش می‌باید بنابراین قطرات کوچک می‌شوند بنابراین در شکلی که قطرات روغن بزرگ‌تر هستند، نیروی هم‌چسبی قوی‌تر است و دمای روغن کمتر است.

۸۰ | در شکل (الف) به دلیل کشش سطحی گیره سطح آب روی سطح آب باقی مانده است. در شکل (ب) به دلیل وزن سکه نیروی رو به پایین به یک طرف کارت

وارد می‌شود اما نیروی دگرچسبی بین کارت و آب مانع از جدا شدن طرف دیگر

کارت از سطح آب می‌شود. / ب) علت آن، نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و ماسه است که باعث ایجاد یک پوسته کشسان در سطح ماسه خیس شده

و پا کمتر در سطح ماسه خیس فرو می‌رود. / پ) کشش سطحی کاهش می‌باید

و همین امر سبب می‌گردد که بتوان حباب‌های بزرگ و زیبایی ایجاد کرد.

پ) فشار آب در عمق ۲۰۰ متری بسیار زیاد است و نیروی بزرگی را بر سطح دریچه وارد می کند که مقدار آن خواهد شد:

$$F = PA = \rho g h A \Rightarrow F = ۱۰۰۰ \times ۱۰ \times ۲۰۰ \times (۰/\lambda)^۲ = ۱/۲ \times ۱۰^۶ N$$

دقت کنید فشار هوا که توسط آب از بیرون دریچه به آن وارد می شود و فشار هوای درون زیردریایی که از داخل به دریچه وارد می شود تأثیر یکدیگر را از بین می بردند. از این رو در محاسبات فشار هوا را در نظر نگرفته ایم.

۸۲ چگالی مایع را به kg/m^3 تبدیل می کنیم:

$$\rho = \gamma/\lambda = \frac{g}{\lambda} \times \frac{1 kg}{10^3 g} \times \frac{10^6 cm^3}{m^3} = ۷۲۰۰ kg/m^3$$

الف) فشار وارد بر کف استوانه مجموع فشار هوا و فشار مایع است. از این رو:

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow P_{کل} = ۱۰^۵ + ۷۲۰۰ \times ۱۰ \times \frac{۱}{۱۰۰} \Rightarrow P_{کل} = ۱۰۷۲۰۰ Pa$$

ب) فشار ناشی از مایع در کف استوانه خواهد شد:

$$P = \rho gh \Rightarrow P = ۷۲۰۰ \times ۱۰ \times \frac{۱}{۱۰۰} \Rightarrow P = ۷۲۰۰ Pa$$

پ) مساحت کف لوله را حساب می کنیم:

$$A = \pi r^2 \Rightarrow A = ۳ \times \left(\frac{4 \times ۱}{2} - ۲ \right)^2 \Rightarrow A = ۳ \times ۴ \times ۱ = ۱۲ cm^2$$

تبدیل به متر

$$\Rightarrow A = ۱۲ \times ۱0^{-۴} m^2$$

نیروی که از طرف مایع بر کف وارد می شود برابر است با:

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = ۷۲۰۰ \times ۱۲ \times ۱0^{-۴} \Rightarrow F = ۸/۶۴ N$$

ت) نیروی وارد بر کف طرف ناشی از فشار هوا و فشار مایع خواهد شد:

$$F = P_{کل} A \Rightarrow F = ۱۰۷۲۰۰ \times ۱۲ \times ۱0^{-۴} \Rightarrow F = ۱۲۸/۶۴ N$$

۸۳ الف) در ظرف مرتبط که در آن یک مایع ریخته شده است فشار در تمام نقاط هم عمق یکسان است.

ب) برای پیدا کردن مقدار فشار در نقطه D، کافی است فشار مایع در نقطه A را حساب کنیم:

$$P_D = P_A = \rho gh_A \Rightarrow P_D = ۲۰۰۰ \times ۱۰ \times \frac{۱}{۱۰۰} \Rightarrow P = ۳۶۰۰ Pa$$

پ) اگر انتهای شاخه سمت راست بسته نبود و طول این شاخه زیاد بود باید مایع در این لوله بالاتر می رفت بنابراین به سر انتهای بسته این لوله فشار وارد می شود که باید مقدار آن را حساب کنیم. فشار در نقطه D برابر فشار مایع به ارتفاع ۸cm و فشار انتهای لوله است. بنابراین:

$$P_D = P_{۸cm} + P_{۸} \Rightarrow P_D = \rho gh + P_{۸}$$

$$\Rightarrow ۳۶۰۰ = ۲۰۰۰ \times ۱۰ \times \frac{۸}{۱۰۰} + P_{۸} \Rightarrow P_{۸} = ۲۰۰۰ Pa$$

نیروی که به انتهای لوله وارد می شود را حساب می کنیم.

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = ۲۰۰۰ \times ۱۰ \times \frac{۸}{۱۰۰} \Rightarrow F = ۲N$$

تبدیل به مترمربع

ت) وقتی قطعه چوب را بر سطح آب قرار می دهیم، فشار حاصل از وزن قطعه چوب بنا به اصل پاسکال توسط مایع به تمام نقاط مایع به طور یکسان وارد می شود و در تمام نقاط فشار به یک اندازه بالا می رود.

۷۷ الف) فشار کل برابر مجموع فشار هوا و فشار مایع است.

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow ۱/۷۶ \times ۱0^۵ = ۱ \times ۱0^۵ + \rho \times ۱0 \times ۸$$

$$\Rightarrow ۱/۷۶ \times ۱0^۵ - ۱ \times ۱0^۵ = \rho \times ۸$$

$$\Rightarrow ۷۶ \times ۱0^۵ - ۱ \times ۱0^۵ = \rho \times ۸ \Rightarrow \rho = \frac{۷۶ \times ۱0^۵}{۸} = ۹۵0 kg/m^3$$

ب) یکای چگالی باید بر حسب kg/m^3 باشد تا فشار بر حسب پاسکال بدهست آید.

$$\rho = ۱ g/cm^3 \times ۱000 = ۱000 kg/m^3$$

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow P = ۱0^۵ + ۱000 \times ۱0 \times ۲ \Rightarrow P = ۱2000 Pa$$


۷۸ الف) برای به دست آوردن فشار باید عمق نقطه مورد نظر را مشخص کنیم عمق A و B برابر $h_B = ۶m$ و $h_A = ۱2m$ است. بنابراین

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow \begin{cases} P_A = ۱0^۵ + (1 \times ۱000) \times ۱0 \times ۱2 \Rightarrow P_A = ۲2000 Pa \\ \text{تبدیل یکای چگالی به } kg/m^3 \\ P_B = ۱0^۵ + 1 \times 1000 \times ۱0 \times ۶ \Rightarrow P_B = ۱6000 Pa \end{cases}$$

ب) فشار ناشی از مایع یعنی ρgh بنابراین:

$$P = \rho gh \Rightarrow \begin{cases} P_A = ۱000 \times ۱0 \times ۱2 = ۱2000 Pa \\ P_B = ۱000 \times ۱0 \times ۶ = ۶000 Pa \end{cases}$$

پ) فاصله نقاط A و C از سطح آزاد مایع یکسان است. یعنی این دو نقطه هم عمق بوده و فشار در این دو نقطه برابر است.



۷۹ الف) از عمق ۵cm تا عمق ۲۰cm تغییر فشار برابر است با:

$$\Delta P = ۱۰۶ - ۱۰۰ = ۶kPa$$

بنابراین می توان نوشت:

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow ۶000 = \rho \times ۱0 \times ۱/۱۵ \Rightarrow \rho = ۴000 kg/m^3$$

ب) فشار هوا محيط را با استفاده از فشار در عمق ۵cm به دست می آوریم.

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow ۱0000 = P_0 + ۴000 \times ۱0 \times \frac{۵}{۱۰0}$$

$$\Rightarrow ۱0000 = P_0 + ۲000 \Rightarrow P_0 = ۹8000 Pa$$

۸۰ یک شاره ساکن بر سطحی که با آن در تماس است نیروی عمودی وارد می کند. بنابراین در هر سه طرف نیروی که آب بر دیواره طرف وارد می کند، بر دیوارها عمود است.

۸۱ الف) با داشتن فشار هوا، نیروی وارد بر هر پنجره به دست می آید. ابتدا مساحت هر پنجره را حساب می کنیم:

$$A = \pi r^2 \Rightarrow A = ۳ \times \left(\frac{۴ \times ۱}{2} - ۲ \right)^2 \Rightarrow A = ۳ \times (۰/۲)^۲ \Rightarrow A = ۰/۱۲ m^2$$

تبدیل به متر

نیروی وارد بر پنجره خواهد شد:

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = ۷ \times ۱0^۳ \times ۰/۱۲ \Rightarrow F = ۸۴۰ N$$

ب) فشار در عمق ۵ متری آب را به دست می آوریم:


$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow P = ۱0^۵ + ۱000 \times ۱0 \times ۵ = ۱/۵ \times ۱0^۵ Pa$$

نیروی حاصل از فشار برابر است با:

$$F = PA \Rightarrow F = ۱/۵ \times ۱0^۳ \times ۰/۱۲ = ۱5 N$$

نیرویی که هر مایع بر کف ظرف مکعب‌شکل وارد می‌کند برابر وزن مایع است.
 $F=W \Rightarrow F_A = \rho g h A$

در قسمت (ب) وزن دو مایع برابر بوده بنابراین نیروی وارد بر کف ظرفها
 $W_A = W_B \Rightarrow F_A = F_B$ توسط مایعها برابر است.



ب) کافی است در رابطه $P = \rho gh$ به جای h مقدار ۱ m را قرار دهیم:
 $P = \rho gh \Rightarrow P = 1600 \times 10 \times 1 \Rightarrow P = 16000 \text{ Pa}$

الف) فشار مایعات به شکل ظرف و مساحت کف آن بستگی ندارد و به ارتفاع و چگالی مایع بستگی دارد. در سه ظرف آب ریخته شده یعنی چگالی مایع در سه ظرف برابر است. از طرفی ارتفاع مایع در سه ظرف یکی است.
 $h_1 = h_2 = h_3 \Rightarrow P_1 = P_2 = P_3 = \rho gh$ بنابراین:


ب) نیرویی که توسط مایع بر سطح وارد می‌شود خواهد شد:

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow \begin{cases} F_1 = \rho g h A \\ F_2 = \rho g h A \\ F_3 = \rho g h (\frac{1}{5} A) \end{cases} \Rightarrow F_1 = F_2 \quad \Rightarrow F_3 = \frac{1}{5} F_1$$

نیروی وارد بر کف ظرفهای (۱) و (۲) یکسان است و در ظرف (۳)، $\frac{1}{5}$ برابر F_1 و F_2 است.

برای آن که نیرو برحسب نیوتون بددست باید باید یکاها برحسب یکاها SI پاشند.

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \frac{1\text{kg}}{10^3 \text{g}} \times \frac{10^6 \text{cm}^3}{1\text{m}^3} \Rightarrow \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$




فشار در کف هر سه ظرف برابر است زیرا ارتفاع مایع و چگالی مایع یکسان است.

$$P_1 = P_2 = P_3 = \rho gh = 1000 \times 10 \times \frac{5}{100} \Rightarrow P_1 = P_2 = P_3 = 5000 \text{ Pa}$$

نیروی وارد بر کف هر ظرف را حساب می‌کنیم.


$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow \begin{cases} \text{ظرف (۱)} & F_1 = 1000 \times 20 \times 10^{-4} = 20 \text{ N} \\ \text{ظرف (۲)} & F_2 = 1000 \times 5 \times 10^{-4} = 5 \text{ N} \\ \text{ظرف (۳)} & F_3 = 1000 \times 25 \times 10^{-4} = 25 \text{ N} \end{cases}$$

الف) اختلاف فشار در دو نقطه از یک مایع خواهد شد:



$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow 115 \times 10^3 - 100 \times 10^3 = \rho \times 10 \times 6 = 15 \times 10^3 = 6\rho \Rightarrow \rho = 250 \text{ kg/m}^3$$

ب) ابتدا مساحت قاعده استوانه را حساب می‌کنیم:



$$A = \pi r^2 \Rightarrow A = \pi \times (\frac{5}{2})^2 = \frac{25}{4} \pi \text{ cm}^2 \Rightarrow A = 3 \times 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

اختلاف فشار در قاعده‌های بالا و پایین را بدست می‌آوریم.

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow \Delta P = 1000 \times 10 \times (52 - 12) \times 10^{-3} \Rightarrow \Delta P = 4000 \text{ Pa}$$

اختلاف نیروی وارد بر قاعده‌ها خواهد شد:

$$\Delta F = F_u - F_d = (P_u A) - (P_d A) = \Delta PA$$

$$\Rightarrow \Delta F = 4000 \times 12 \times 10^{-4} \Rightarrow \Delta F = 48 \text{ N}$$

(منظور از اندیس‌های d و u ، پایین و بالا است.)

الف) ارتفاع مایع در دو ظرف یکسان است ($h_A = h_B$). بنابراین

کافی است فشار مایع در دو ظرف را نوشه و روابط را بر هم تقسیم کنیم.

$$\begin{cases} P_A = \rho_A g h_A \\ P_B = \rho_B g h_B \end{cases} \Rightarrow \frac{P_A}{P_B} = \frac{\rho_A g h_A}{\rho_B g h_B} \xrightarrow{h_A = h_B} \frac{P_A}{P_B} = \frac{\rho_A}{\rho_B}$$

$$\Rightarrow \frac{P_A}{P_B} = \frac{1/\lambda}{1/\lambda} \Rightarrow \frac{P_A}{P_B} = \frac{4}{9}$$

ب) در این قسمت چگالی مایع در دو حالت یکسان است ($\rho_A = \rho_B$) اما ارتفاع مایع در ظرف A دو برابر ارتفاع مایع در ظرف B است.

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{\rho_A g h_A}{\rho_B g h_B} \xrightarrow{h_A = 2h_B} \frac{P_A}{P_B} = \frac{2h_B}{h_B} = 2$$

پ) در این قسمت مقدار مایع یکسان است ($m_A = m_B$) وقی مایع در ظرف A را در ظرف B می‌ریزیم، چون ظرف B بزرگ‌تر است حتماً ارتفاع مایع در ظرف B کمتر خواهد شد. ابعاد ظرف B دو برابر A است. یعنی مساحت قاعده ۴ برابر مساحت قاعده A می‌شود. برای مقایسه فشار از رابطه اصلی

$$\text{فشار } P = \frac{F}{A} \text{ استفاده می‌کنیم که در آن } F \text{ نیروی وزن مایع است.}$$

$$\frac{W_A}{P_B} = \frac{A_A}{W_B} = \frac{m_A g}{m_B g} \times \frac{A_B}{A_A} \Rightarrow \frac{P_A}{P_B} = \frac{A_B}{A_A} = \frac{4A_A}{A_A} \Rightarrow \frac{P_A}{P_B} = 4$$

ت) هرگاه ابعاد ظرف A دو برابر ابعاد ظرف B باشد، گنجایش ظرف A، λ برابر گنجایش ظرف B می‌شود.

$$a_A = 2a_B \xrightarrow{V=a^3} (a_A)^3 = (2a_B)^3$$

$$\Rightarrow a_A^3 = \lambda a_B^3 \Rightarrow V_A = \lambda V_B$$

در این صورت در قسمت (ب) وقتی ظرف B و A را پر از مایع یکسانی می‌کنیم جرم مایع A، λ برابر جرم مایع B می‌شود.

$$\rho_A = \rho_B \Rightarrow \frac{m_A}{V_A} = \frac{m_B}{V_B} \Rightarrow \frac{m_A}{\lambda V_B} = \frac{m_B}{V_B} \Rightarrow m_A = \lambda m_B \Rightarrow W_A = \lambda W_B$$

مسائل تکمیلی


ارتفاع آب در ظرف برابر است با:

$$P = \rho gh \Rightarrow P = 1000 \times 10 \times \frac{26}{100} = 2600 \text{ Pa}$$

فشار آب خواهد شد:

(ب) با توجه به رابطه $P = \frac{F}{A}$ نیروی وارد بر کف را بدست می‌آوریم:

$$F = PA \Rightarrow F = 2600 \times 50 \times 10^{-4} = 13 \text{ N}$$



الف) فشار مایع به شکل ظرف بستگی ندارد، بلکه به ارتفاع مایع و چگالی آن بستگی دارد. فشار آب خواهد شد:

$$P = \rho gh \Rightarrow P = 1 \times 10^3 \times 10 \times 3 = 3 \times 10^3 \text{ Pa}$$

ب) فشار کل را حساب می‌کنیم:

$$P = P_0 + P_{\text{مایع}} \Rightarrow P = 10^5 + 3 \times 10^3 = 10^5 + 3 \times 10^3 \text{ Pa}$$

پ) نیروی وارد بر کف ظرف توسط مایع خواهد شد:

$$F = P_{\text{مایع}} A \Rightarrow F = 3 \times 10^3 \times 400 \times 10^{-4} = 120 \text{ N}$$

ت) نیروی کل وارد بر کف ظرف:

$$F = P_{\text{کل}} A \Rightarrow F = 10^5 \times 400 \times 10^{-4} = 4120 \text{ N}$$

(الف) ارتفاع آب در دو ظرف یکسان است. ($P = \rho gh$) بنابراین:

ب) نیروهای وارد بر کف ظرف در هر ظرف ناشی از فشار مایع است.

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \begin{cases} \xrightarrow{\text{ظرف A}} F_A = P(\pi r^2) \\ \xrightarrow{\text{ظرف B}} F_B = P(\pi \times 4r^2) \end{cases} \Rightarrow \frac{F_A}{F_B} = \frac{1}{4}$$

پ) هر دو ظرف مشابه و مقدار آب درون آنها یکسان است. بنابراین وزن هر دو ظرف برابر است. از این رو نیرویی که توسط ظرفها بر سطح افقی وارد می‌شود با هم برابر است.

چوب پنهان در تعادل است و نیروهایی که از دو ظرف بر آن وارد می‌شود با هم برابرند. از سمت چپ نیروی ناشی از فشار آب و فشار هوای چوب پنهان وارد می‌شود و از سمت راست نیروی ناشی از فشار هوای کمک نیروی اصطکاک مانع خروج چوب پنهان می‌شود. بنابراین:


$$F = F_0 + f \Rightarrow (P_0 + \rho gh)A = P_0 A + f$$

$$f = \rho ghA \Rightarrow f = 1000 \times 10 \times \left(\frac{150 + 50}{100} \right) \times 50 \times 10^{-4} = 10 \text{ N}$$

$$F = (P_0 + \rho gh)A \quad \begin{array}{c} F_0 \\ \hline f \end{array} \quad F_0 = P_0 A$$

مایع با چگالی بیشتر نشین می‌شود. خط تراز را رسماً می‌کنیم. فشار در نقاط M و N با هم برابر است. $P_M = P_N = P$. هرچه از نقطه N و بالاتر می‌رویم فشار به اندازه ρgh کاهش می‌یابد، بنابراین فشار نقاط A و B به ترتیب خواهد شد:

$$\begin{cases} P_B = P - \rho_1 g \frac{h}{100} \\ P_A = P - \rho_2 g \frac{h}{100} \end{cases} \xrightarrow{\rho_1 > \rho_2, \rho_1 = 10 \text{ g/cm}^3, \rho_2 = 0.9 \text{ g/cm}^3} \begin{cases} P_B = P - 1200 \times 10 \times \frac{2}{100} \\ P_A = P - 900 \times 10 \times \frac{2}{100} \end{cases}$$




اختلاف فشار بین دو نقطه از رابطه $\Delta P = \rho g \Delta h$ به دست می‌آید که اختلاف ارتفاع بین دو نقطه است.

$$\Delta P_{AB} = \rho g \Delta h_{AB} \Rightarrow P_B - P_A = 2/48 - 2/4 \Rightarrow 0.1 \text{ atm} = \rho g \times 2 \Rightarrow \rho g = 0.1 \text{ atm}$$

حال با توجه به شکل:

$$\Delta P_{BC} = P_C - P_B = \rho g \times 3 \xrightarrow{(1)} P_C - 2/48 = 0.12 \Rightarrow P_C = 0.12 \text{ atm}$$

دقیق کردید در حل این مسئله تبدیل یک انجام ندادیم. فشارها را بر حسب نوشتمی و فشار C نیز بر حسب atm به دست آمد.



اختلاف فشار بین دو نقطه در شاره از رابطه $\Delta P = \rho g \Delta h$ به دست می‌آید که اختلاف ارتفاع قائم دو نقطه است. بنابراین اختلاف فشار وارد به سطح بالا و پایین در شکل‌های (الف) و (ب) به صورت زیر می‌باشد.


$$\Delta P_{AB} = \rho_2 g \Delta h_{AB} \Rightarrow \Delta P_{AB} = \rho_2 g a$$

$$\Delta P_{A'B'} = \rho_1 g \Delta h_{A'B'} \Rightarrow \Delta P_{A'B'} = \rho_1 g 2a$$

بنابراین $\Delta P_{AB} = \Delta P_{A'B'}$ بوده از این رو:

$$\Delta P_{AB} = \Delta P_{A'B'} \Rightarrow \rho_2 g a = \rho_1 g 2a \Rightarrow \rho_2 = 2\rho_1 \Rightarrow \frac{\rho_2}{\rho_1} = 2$$

یک رابطه ریاضی را از روی شکل می‌توانیم بنویسیم.



$$h_W + h_{Hg} = 28 \text{ cm}$$

جرم جیوه و آب برابر است. از این مطلب

نیز می‌توانیم به کمک چگالی رابطه دیگری بین h_W و h_{Hg} پیدا کنیم.

$$m_{Hg} = m_W \Rightarrow \rho_{Hg} V_{Hg} = \rho_W V_W \Rightarrow \rho_{Hg} Ah_{Hg} = \rho_W Ah_W \Rightarrow 13 \times h_{Hg} = 1 \times h_W \Rightarrow h_W = 13h_{Hg}$$


از رابطه (۲) در (۱) قرار می‌دهیم.

$$(1), (2) \Rightarrow 13h_{Hg} + h_{Hg} = 28 \Rightarrow h_{Hg} = 2 \text{ cm} \xrightarrow{(1)} h_W = 26 \text{ cm}$$

فشار از طرف دو مایع خواهد شد.

$$P = \rho_W gh_W + \rho_{Hg} gh_{Hg} \Rightarrow P = 1000 \times 10 \times \frac{26}{100} + 13000 \times 10 \times \frac{2}{100} = 2600 + 2600 = 5200 \text{ Pa} = 5.2 \text{ kPa}$$

برای پیدا کردن فشار باید ارتفاع $2/5L = 250 \text{ cm}^3$ آب درون ظرف را پیدا کنیم، ابتدا قسمت پایین ظرف با حجم $50 \times 10 = 500 \text{ cm}^3$ پر می‌شود. سپس آب به قسمت بالای ظرف می‌رود.




$$V_{\text{آب}} = V_1 + V_2 \Rightarrow 2500 = 500 + V_2$$

$$\Rightarrow V_2 = 2000 \text{ cm}^3$$

ارتفاع h_2 را حساب می‌کنیم:

$$2000 = 125h_2 \Rightarrow h_2 = 16 \text{ cm}$$



با توجه لوله A فشارهای
محیط ۷۵cmHg است
($P_0 = 75\text{cmHg}$)

(الف) فشار نقاط C و D با هم برابر است، فشار D برابر فشار هوای
و فشار در C برابر فشار سنتون قائم جیوه و فشار وارد بر انتهای بسته لوله است.

$$P_C = P_D \Rightarrow P_{جیوه} + P_{هوا} = 75 + P_{هوا} = 75$$

$$P_{هوا} = 75 - 75 = 0\text{cmHg}$$

فشار را بر حسب پاسکال به دست می آوریم

$$P_{هوا} = \rho_{Hg}gh_{Hg} \Rightarrow P_{هوا} = 13 \times 6 \times 10 \times \frac{1}{100} \Rightarrow P_{هوا} = 1360\text{Pa}$$

تبدیل به kg/m^3

(ب) نیروی وارد بر انتهای لوله ناشی از فشار جیوه است.

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = 1360 \times 5 \times 10^{-4} \Rightarrow F = 6.8\text{N}$$

تبدیل به m^2

خط تراز را رسم می کنیم، فشار در نقطه F و E واقع بر خط تراز یکسان
بوده و فشار در نقطه F برابر فشار مخزن A ($P_F = P_A$) و در نقطه E برابر

مجموع فشار مخزن B و فشار سنتون ۱۰cm جیوه است. بنابراین:

$$P_F = P_E \Rightarrow P_A = P_B + \rho_{Hg}gh \Rightarrow 10 = P_B + 10 \Rightarrow P_B = 74\text{cmHg}$$

$$P_M = P_B + \rho_{Hg}gh_2$$

فشار در نقطه M برابر است با:

فشار حاصل از سنتون ۵cm مایع ρ_2 را بر حسب سانتی متر جیوه به دست می آوریم.


$$\rho_2gh_2 = \rho_{Hg}gh_{Hg} \Rightarrow 5 = 13/6 \times h_{Hg}$$

$$\Rightarrow h_{Hg} = 2.5\text{cmHg}$$

فشار در نقطه M برابر مجموع فشار گاز مخزن B و فشار سنتون ۵cm مایع

$$P_M = P_B + P_{هوا} \Rightarrow P_M = 74 + 2.5 = 76.5\text{cmHg}$$

است. از این رو:




ابتدا با توجه به فشار گاز درون مخزن. بارسم خط تراز را به دست می آوریم.

$$P_A = P_B \Rightarrow P_{هوا} + \rho_{Hg}gh = P_{هوا} + \rho_{Hg}gh_{Hg}$$

$$\Rightarrow \rho_{Hg}gh = 10 - 5 = 5 \Rightarrow 10 \times 10^{-2} = 5 \times h \Rightarrow h = 10^{-2}\text{m} = 10\text{cm}$$

$$\Rightarrow h = 10\text{cm} = 10\text{cmHg}$$



با توجه لوله A فشارهای
محیط ۷۵cmHg است
($P_0 = 75\text{cmHg}$)

بنابراین اختلاف فشار در نقاط A و B برابر است با:

$$\Delta P = P_A - P_B \Rightarrow \Delta P_{AB} = (P - 90 \times 10 \times \frac{2}{100}) - (P - 120 \times 10 \times \frac{2}{100})$$

$$\Rightarrow \Delta P = 6\text{Pa}$$

۹ لوله U شکلی مشابه شکل سوال کتاب آن می کشیم تا تغییرات را روی آن نشان دهیم.

۱۰ با باز شدن شیر، مایع A که چگالی بیشتری دارد پایین آمده و زیر مایع B قرار می گیرد.

۱۱ همان قدری که مایع A در شاخه سمت چپ پایین می آید، همانقدر مایع B در شاخه سمت راست بالا می رود.


۱۲ سطح هم تراز در مرز دو مایع را در حالت جدید رسم می کنیم.

به شکل (۲) دقت کنیم. مایع A به اندازه X پایین می آید و از سمت دیگر (سمت راست) به اندازه X بالا می رود بنابراین ارتفاع مایع A از خط تراز با توجه $h_A = 20 - 2X$ به شکل خواهد شد:

اکنون می توان نوشت:

$$P_N = P_M \Rightarrow P_A g(20 - 2X) = P_B g(20) \Rightarrow 2\rho_B(20 - 2X) = \rho_B(20)$$

$$\Rightarrow 2(20 - 2X) = 20 \Rightarrow 20 - 2X = 10 \Rightarrow X = 5\text{cm}$$



۱۳ با توجه به نمودار فشار در ارتفاع ۵km و ۱۰km به ترتیب در حدود ۶۰kPa و ۲۸kPa است (دقیق کنید اعداد تقریبی است). بنابراین در فاصله

$\Delta P_1 = 60 - 28 = 40\text{kPa}$ فشار به اندازه $h = 5\text{km}$ تغییر کرده و در فاصله ۵km تا ۱۰km فشار به اندازه $\Delta P_2 = 28 - 10 = 18\text{kPa}$ تغییر کرده یعنی:

۱۴ فشار ناشی از نیروی F را حساب می کنیم:

$$P_1 = \frac{F}{A} = \frac{27}{5 \times 10^{-4}} = 54000\text{Pa}$$

این فشار را بر حسب cmHg به دست می آوریم:

$$P_F = \rho_{Hg}gh_{Hg} \Rightarrow 54000 = \rho_{Hg}gh_{Hg} \Rightarrow 54000 = 13500 \times 10 \times h_{Hg}$$

$$\Rightarrow h_{Hg} = 4\text{m} = 40\text{cm} \Rightarrow P_F = 40\text{cmHg}$$

فشار سنتون ۴۵cm مایع را نیز بر حسب cmHg حساب می کنیم.

$$\rho_{Hg}gh_{Hg} = \rho_{Hg}gh_{Hg} \Rightarrow 9 \times 45 = 13/5 \times h_{Hg}$$

$$\Rightarrow h_{Hg} = 3\text{cm} \Rightarrow P_{هوا} = 3\text{cmHg}$$

فشار در نقاط M و N که روی خط تراز قرار دارند برابر است. فشار نقطه M برابر فشارهای A و B (۷۵cmHg) و فشار نقطه N برابر فشار مایع و

۱۵ فشار ناشی از F است. بنابراین:

$$P_M = P_N \Rightarrow P_{هوا} + P_F = P_{هوا} + P_F$$

$$= 30 + 40 = 70\text{cmHg}$$

الف) حجم هر دو مایع 50 cm^3 است. ارتفاع هر مایع خواهد شد:

$$\begin{aligned} V &= Ah \Rightarrow 50 = 1 \cdot h \\ \Rightarrow h &= 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m} \\ P &= \rho_A gh_A + \rho_B gh_B \\ \Rightarrow P &= 1200 \times 1 \times 0.5 + 600 \times 1 \times 0.5 / 10 \\ P &= 9000 \text{ Pa} \end{aligned}$$

ب) توجه به رابطه $P = \frac{F}{A}$. نیروی وارد بر کف حساب می‌شود.

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = 9000 \times 1 \times 10^{-4} \Rightarrow F = 9 \text{ N}$$

روش دیگر: فشار را از رابطه $P = \frac{mg}{A}$ بدست بیاورید:

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V \\ \Rightarrow \begin{cases} m_A = 1200 \times 500 \times 10^{-6} \Rightarrow m_A = 0.6 \text{ kg} \\ m_B = 600 \times 500 \times 10^{-6} \Rightarrow m_B = 0.3 \text{ kg} \end{cases} \\ P &= \frac{F}{A} = \frac{m_A g + m_B g}{A} = \frac{0.6 \times 10 + 0.3 \times 10}{1 \times 10^{-4}} \Rightarrow P = 9000 \text{ Pa} \end{aligned}$$

$$F = W_A + W_B = 0.6 \times 10 + 0.3 \times 10 = 9 \text{ N}$$

الف) ارتفاع مایع در ظرف دوم، دو برابر ظرف اول است.

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\rho_2 gh_2}{\rho_1 gh_1} \Rightarrow \frac{2h_1}{h_1} = \frac{P_2}{P_1} = 2$$

ب) حجم مایع در ظرف دوم و درنتیجه جرم آن ۸ برابر جرم مایع ظرف اول است.

$$\begin{aligned} \frac{V_2}{V_1} &= \frac{(a_2)^3}{(a_1)^3} = \left(\frac{2a_1}{a_1}\right)^3 = 8 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = 8 \\ \frac{m_2 = \rho V}{m_1} &= \lambda \Rightarrow \frac{W_2}{W_1} = \lambda \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \lambda = 8 \end{aligned}$$

الف) توجه به نمودار در ارتفاع 40 cm از کف ظرف، فشار مایع صفر شده است. نتیجه می‌گیریم $h = 0$ شده است، و ارتفاع مایع در ظرف، 40 cm است. اکنون چگالی مایع را به دست می‌آوریم.

$$P = \rho gh \Rightarrow 3000 = \rho \times 1 \times 40 \Rightarrow \rho = 75 \text{ kg/m}^3$$

$$P = \rho gh \Rightarrow 2400 = 75 \times 1 \times h \Rightarrow h = 32 \text{ m}$$

این فاصله از سطح مایع است، بنابراین فاصله از کف ظرف خواهد شد:

$$40 - 32 = 8 \text{ m} = 800 \text{ cm}$$

$$A = (2)^2 = 4 \text{ m}^2$$

سطح قاعده مکعب:

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow P = \frac{W}{A}$$

فشار وارد بر کف ظرف:

وزن آب درون مکعب و وزن آب درون استوانه برابر است:

$$\begin{aligned} W_{\text{استوانه}} &= W_{\text{مکعب}} \\ \frac{P_{\text{استوانه}}}{P_{\text{مکعب}}} &= \frac{\frac{W_{\text{استوانه}}}{A_{\text{استوانه}}}}{\frac{W_{\text{مکعب}}}{A_{\text{مکعب}}}} = 1 \end{aligned}$$

مسائل امتحانی بارمبنده شده



- الف) جامد بلورین $(0/25)$ - نمک طعام $(0/25)$ (یا الماس) جامد بی‌شكل (یاًمُورف) $(0/25)$ - شیشه $(0/25)$ / ب) در جامدهای بلورین مولکول‌ها دارای طرح منظم و تکرارشونده هستند، در حالی که جامدهای بی‌شكل، نظم مشخصی ندارند. $(0/25)$
- جامدهای بلورین از سرد شدن آرام و جامدهای بی‌شكل از سرد شدن سریع ایجاد می‌شوند. $(0/25)$

- الف) برآمده $(0/25)$ / ب) پایین‌تر $(0/25)$ / ب) مایع $(0/25)$

- ت) کشش سطحی $(0/25)$ / ث) چند ده $(0/25)$ / ج) کاهش $(0/25)$

- الف) پلاسمای $(0/25)$ - دمای های بالا $(0/25)$ / ب) نسبت به $(0/25)$

- نوسانه‌های $(0/25)$ / پ) بلورین $(0/25)$ / ه) فلزها $(0/25)$ - معدنی $(0/25)$

- ت) کندی $(0/25)$ - به تنیدی $(0/25)$ - آمورف $(0/25)$ / ث) رانشی $(0/25)$

- ترکام ناپذیری $(0/25)$

- الف) علمت، کشش سطحی ناشی از هم چسبی مولکول‌های سطح مایع است. $(0/25)$
- (ب) افزایش دما باعث کاهش هم چسبی مولکول‌های مایع شده و سبب راحت‌تر جاری شدن مایع می‌شود $(0/25)$ / پ) علت آن مربوط به اصل برزلوی است. جریان هوای بالای برزنگت باعث کاهش فشارهای در بالای برزنگت شده و فشارهای قسمت زیر برزنگت بیشتر بوده و این سبب پف کردن برزنگت می‌شود. $(0/25)$

- عمق هر سه نقطه یکسان است، بنابراین:

$$h_A = h_B = h_C \Rightarrow P_A = P_B = P_C$$

- اختلاف فشار بر اخلاف ارتفاع قائم دو نقطه درون شاره بستگی دارد.

$$\Delta ABH: \sin 30^\circ = \frac{\Delta h}{AB} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{\Delta h}{50} \Rightarrow \Delta h = 25 \text{ cm}$$

$$\Delta h = 25 \text{ cm} \Rightarrow \Delta h = 0.25 \text{ m}$$

تبديل یکای چگالی:

$$4 \text{ g/cm}^3 = 4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} \times \frac{10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} = 4000 \text{ kg/m}^3$$

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow \Delta P = 4000 \times 10 \times 0.25 \Rightarrow \Delta P = 10000 \text{ Pa} = 1 \text{ kPa}$$

$$P = P_0 + \rho gh$$

$$240000 = 12000 + 12000 \times 10 \times h \Rightarrow h = 12 \text{ m}$$

$$150000 = 12000 \cdot h \Rightarrow h = 12.5 \text{ m}$$

ابتدا فشار ناشی از جیوه را حساب می‌کنیم.

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow P = \frac{135}{2 \times 10^{-4}} \Rightarrow P = 67500 \text{ Pa}$$

ارتفاع جیوه در ظرف را به دست می‌آوریم.


$$\begin{aligned} P &= \rho_{\text{Hg}} gh_{\text{Hg}} \\ &\Rightarrow 67500 = 135 \times 10000 \times h_{\text{Hg}} \\ &\Rightarrow h_{\text{Hg}} = 0.5 \text{ m} \\ &\Rightarrow h = 0.5 - 0.05 = 0.45 \text{ m} \end{aligned}$$

۱۷ راه حل اول: ۱) لوله‌ای مشابه لوله U شکل سؤال کنار آن می‌کشیم تا تغییرات ارتفاع آب در دو شاخه را بستجیم. ۲) در شاخه سمت چپ ۱۰ cm و در شاخه سمت راست ۵ cm روغن ریختیم، پس آب در شاخه سمت چپ پایین آمده و در سمت راست بالا رفته است. ۳) خط تراز لوله دوم را می‌کشیم و مسئله را حل می‌کنیم.

$$V_{\text{پایین آمده}} = V_{\text{بالا رفته}} \Rightarrow Ah' = Ah \Rightarrow h' = h$$

$$\begin{aligned} P_M &= P_N \Rightarrow \rho_{\text{روغن}} g \times 5 + \rho_{\text{آب}} g \times (10 - h) = \rho_{\text{آب}} g \times (10 - h) \\ \Rightarrow \lambda &= 4 + 2h \Rightarrow h = 2\text{cm} \end{aligned}$$

دقت کنید در امتحان نیاز به نوشتن توضیحات نیست.



فشار مایع را بر حسب cmHg بدست می‌آوریم.

$$\begin{aligned} \rho_{\text{مایع}} gh &= \rho_{\text{Hg}} gh_{\text{Hg}} \Rightarrow 3/4 \times 50 = 13/6 \times h \\ \Rightarrow h &= 12.5\text{cm} \Rightarrow P_{\text{مایع}} = 125\text{cmHg} \end{aligned}$$

فشار وارد بر کف ظرف خواهد شد:

$$P = P_0 + P_{\text{مایع}} = 75 + 125 = 200\text{cmHg}$$

۱۹ ارتفاع ستون جیوه در فشارسنج شهر را بدست می‌آوریم:

$$h = 100 - (10 + 20) = 70\text{cm}$$

فشار بر حسب پاسکال خواهد شد:


$$P = P_0 + \rho_{\text{Hg}} gh_{\text{Hg}} = 13600 \times 10 \times \frac{70}{100} = 95200\text{Pa}$$

ارتفاع ستون جیوه در فشارسنج شهر B را به کمک ریاضی بدست می‌آوریم.

۲۰ فشار درون دیگ زودپز با مجموع فشار هوا و فشار وزنه باید برابر باشد.

$$\begin{aligned} \sin 30^\circ &= \frac{h}{150} \Rightarrow h = 150 \times \frac{1}{2} = 75\text{cm} \\ P &= \rho gh = 13600 \times 10 \times \frac{75}{100} \\ \Rightarrow P &= 102000\text{Pa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= P_0 + \frac{W}{A} \Rightarrow P = P_0 + \frac{mg}{\pi r^2} \\ \Rightarrow 2 \times 10^5 &= 10^5 + \frac{m \times 10}{2 \times (10^{-3})^2} \\ 10^5 &= \frac{m \times 10}{3 \times 10^{-4}} \Rightarrow m = 30\text{kg} \end{aligned}$$



الف) مایع با چگالی

$$\rho_1 = 1/2\text{g/cm}^3$$

نهنشین می‌شود. (۰/۰)

ب) ارتفاع h_1 را از روی شکل به دست می‌آوریم.


$$h_1 = 15 - 7 \Rightarrow h_1 = 8\text{cm}$$

فشار نقاط واقع بر خط تراز را برابر قرار می‌دهیم:

$$\begin{aligned} P_A &= P_B \Rightarrow P_0 + \rho_1 gh_1 = P_0 + \rho_1 gh_2 \Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_1 h_2 \\ \Rightarrow 8h_2 &= 1/2 \times 8 \Rightarrow h_2 = 12\text{cm} \end{aligned}$$

د) فشار نقاط واقع بر خط تراز را برابر قرار می‌دهیم:


$$\begin{aligned} P_N &= P_0 + \rho_1 gh_1 \Rightarrow P_M = P_0 + \frac{W}{A} \\ P_N &= P_M \Rightarrow P_0 + \rho_1 gh_1 = P_0 + \frac{W}{A} \Rightarrow \rho_1 gh_1 = \frac{W}{A} \\ 1800 \times \frac{25}{100} &= \frac{m}{10 \times 10^{-4}} \Rightarrow m = 45\text{kg} \end{aligned}$$



الف) فشار روی خط تراز یکسان است.

$$P_0 + \rho_1 gh_1 = P_0 + \rho_2 gh_2 \Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$

$$3 \times 10 = \rho_2 \times 15 \Rightarrow \rho_2 = 2\text{g/cm}^3$$



ب) فشار در هر نقطه را جداگانه حساب کرده و از هم کم می‌کنیم.

$$\begin{aligned} P_A &= P_0 + \rho_1 gh_A \\ \Rightarrow P_A &= P_0 + 2000 \times 10 \times \frac{5}{100} = P_0 + 1000\text{Pa} \\ P_B &= P_0 + \rho_2 gh_B \Rightarrow P_B = P_0 + 3000 \times 10 \times \frac{5}{100} = P_0 + 1500\text{Pa} \\ \Rightarrow P_B &= P_0 + 1500\text{Pa} \\ \Delta P_{AB} &= P_0 + 1500 - (P_0 + 1000) = 500\text{Pa} \end{aligned}$$

د)

$$\begin{aligned} P_A &= P_B \Rightarrow P_0 + \rho_{\text{آب}} gh_{\text{آب}} = P_0 + \rho_{\text{روغن}} gh_{\text{روغن}} \\ \rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}} &= \rho_{\text{روغن}} h_{\text{روغن}} \Rightarrow \frac{\rho_{\text{آب}}}{\rho_{\text{روغن}}} = \frac{h_{\text{آب}}}{h_{\text{روغن}}} = \frac{17}{20} = 0.85 \end{aligned}$$

