

درسنامه ۱

اتحادهای جبری و مثلث خیام

یادآوری اتحادهای سال قبل: به دلیل اهمیت اتحادهای خوانده شده، مجدداً آنها را مرور می‌کنیم:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{اتحاد مربع مجموع دو جمله‌ای}$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{اتحاد مربع تفاضل دو جمله‌ای}$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \quad \text{اتحاد مزدوج}$$

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab \quad \text{اتحاد جمله مشترک}$$

۹

حاصل عبارات زیر را به کمک اتحادها به دست آورید:

$$(10x+1)(10x+6)$$

$$(x-3)(x+8)$$

$$\left(\frac{\sqrt{7}}{2} - 4\right)\left(\frac{\sqrt{7}}{2} + 4\right)$$

$$\left(\sqrt{5}x - \frac{3}{\sqrt{5}}y\right)^2$$

$$\left(\sqrt{5}x - \frac{3}{\sqrt{5}}y\right)^2 = (\sqrt{5}x)^2 - 2(\sqrt{5}x)\left(\frac{3}{\sqrt{5}}y\right) + \left(\frac{3}{\sqrt{5}}y\right)^2 = 5x^2 - 6xy + \frac{9}{5}y^2$$

پاسخ:

$$\left(\frac{\sqrt{7}}{2} - 4\right)\left(\frac{\sqrt{7}}{2} + 4\right) = \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2 - 4^2 = \frac{7}{4} - 16 = -\frac{57}{4}$$

ب)

$$\begin{matrix} & & & \text{جمله مشترک} \\ (x-3)(x+8) & = x^2 + (-3+8)x + (-3)(8) & = x^2 + 5x - 24 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a & b & a \end{matrix}$$

پ)

$$\begin{matrix} & & & \text{جمله مشترک} \\ (10x+1)(10x+6) & = (10x)^2 + (1+6)(10x) + (1)(6) & = 100x^2 + 70x + 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a & b & \end{matrix}$$

ت)

۹

حاصل عبارت $(1000/05)^2 - (999/95)^2$ را به کمک اتحادها به دست آورید.

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

پاسخ:

$$\Rightarrow (1000/05)^2 - (999/95)^2 = \underbrace{(1000/05 - 999/95)}_{0/1} \underbrace{(1000/05 + 999/95)}_{2000} = 0/1 \times 2000 = 200$$

۹

مثلث خیام و کاربرد آن در اتحادها و الگوهای

با اتحادهای $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$ در سال گذشته آشنا شدید. حال می‌خواهیم حاصل عبارت‌هایی مثل $(a \pm b)^3$, $(a \pm b)^4$, $(a \pm b)^5$ و ... را به کمک مثلث خیام به دست آوریم. مثلث خیام در واقع از یک سری اعداد تشکیل شده که با نظم خاصی به دست می‌آیند. به کمک این اعداد است که حاصل عبارت‌های ذکر شده را محاسبه می‌کنیم. (این اعداد ضرایب جملات خواهند بود).

: ردیف اول مثلث خیام

$$\Rightarrow (a+b)^0 = 1$$

: ردیف دوم مثلث خیام

$$\Rightarrow (a+b)^1 = 1a + 1b$$

: ردیف سوم مثلث خیام

$$\Rightarrow (a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

: ردیف چهارم مثلث خیام


$$\Rightarrow (a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$$

: ردیف پنجم مثلث خیام

$$\Rightarrow (a+b)^4 = 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4$$

1 : ردیف ششم مثلث خیام

$$\Rightarrow (a+b)^5 = 1a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + 1b^5$$



<.....>

درستنامه ۱

مثالاً به ردیف ششم مثلث خیام دقت کنید. برای محاسبه $(a+b)^{\Delta}$ چون توان پرانتز ۵ است، برای باز کردن این اتحاد از $a^{\Delta} + b^{\Delta}$ شروع کرده و مرتباً یکی از توان a کم کرده و یک واحد به توان b اضافه می‌کنیم تا در نهایت a حذف شده و به b^{Δ} برسیم.

$$(a+b)^{\Delta} = ۱a^{\Delta} + \Delta a^{\Delta} b^{\Delta} + ۱۰a^{\Delta} b^{\Delta} + \Delta a^{\Delta} b^{\Delta} + ۱۰a^{\Delta} b^{\Delta} + \Delta a^{\Delta} b^{\Delta} + ۱b^{\Delta}$$

+1 +1 +1 +1 +1 +1

ضمناً در باز شده عبارت $(a+b)^{\Delta}$ ضرایب جملات یعنی $۱, ۵, ۱۰, ۵, ۱۰, ۱, ۵$ و همان اعداد ردیف ششم مثلث خیام هستند. حال اگر حاصل $(a-b)^{\Delta}$ را بخواهیم، کافی است در جوابی که برای $(a+b)^{\Delta}$ بهدست آوردهیم، هم‌جا را به $-b$ تبدیل کنیم:

$$\begin{aligned} (a-b)^{\Delta} &= ۱a^{\Delta} + \Delta a^{\Delta} (-b)^{\Delta} + ۱۰a^{\Delta} (-b)^{\Delta} + \Delta a^{\Delta} (-b)^{\Delta} + ۱(-b)^{\Delta} \\ \Rightarrow (a-b)^{\Delta} &= ۱a^{\Delta} - \Delta a^{\Delta} b + ۱۰a^{\Delta} b^{\Delta} - \Delta a^{\Delta} b^{\Delta} + \Delta a^{\Delta} b^{\Delta} - ۱b^{\Delta} \end{aligned}$$

به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت حاصل $(a-b)^{\Delta}$ همان حاصل $(a+b)^{\Delta}$ است که علامت جملات آن یکی در میان \oplus و \ominus شده‌اند.

اتحادهای مکعب دوجمله‌ای

می‌خواهیم به کمک روش گفته‌شده حاصل عبارت‌های $(a+b)^{\Delta}$ و $(a-b)^{\Delta}$ را بهدست آوریم:
 $(a+b)^{\Delta} = ۱a^{\Delta} + ۳a^{\Delta} b^{\Delta} + ۳a^{\Delta} b^{\Delta} + ۱b^{\Delta}$
 اعداد ردیف چهارم مثلث خیام

اتحاد مکعب تفاضل دوجمله‌ای:

$$\frac{(a-b)^{\Delta}}{\text{ها را به } -b \text{ تبدیل می‌کنیم.}} = (a-b)^{\Delta} = ۱a^{\Delta} + ۳a^{\Delta} (-b)^{\Delta} + ۳a^{\Delta} (-b)^{\Delta} + (-b)^{\Delta} = a^{\Delta} - ۳a^{\Delta} b^{\Delta} + ۳a^{\Delta} b^{\Delta} - b^{\Delta}$$

($a+b$) $^{\Delta}$ = $a^{\Delta} + ۳a^{\Delta} b + ۳ab^{\Delta} + b^{\Delta}$ البته در اتحادهای بالا می‌توانیم عدد ۱ را ننویسیم. مثلًا:

حاصل $(a+b)^{\Delta}$ را به کمک اتحاد مکعب دوجمله‌ای بهدست آورید.

پاسخ:

$$(10/1)^{\Delta} = (10+0/1)^{\Delta} = ۱۰^{\Delta} + ۳(10)^{\Delta}(0/1) + ۳(10)(0/1)^{\Delta} + (0/1)^{\Delta} = ۱۰۰۰ + ۳۰ + ۰/۳ + ۰/۰۰۱ = ۱۰۳۰/۳۰۱$$

در حاصل عبارت $(3x^2 - x^3)$ ، ضریب x^5 کدام است؟

پاسخ:

$$\frac{\text{اتحاد مکعب تفاضل}}{\text{دوجمله‌ای}} \rightarrow \text{عبارت} = (3x^2 - x^3)^{\Delta} = (3x^2)^{\Delta} - ۳(3x^2)^{\Delta}(x^3) + ۳(3x^2)(x^3)^{\Delta} - (x^3)^{\Delta} = ۲۷x^6 - ۲۷x^5 + ۹x^4 - x^3$$

بنابراین ضریب x^5 برابر -۲۷ می‌باشد.

اتحادهای مجموع و تفاضل مکعب دوجمله‌ای (اتحادهای چاق و لاغر)

اتحاد مجموع مکعب دوجمله‌ای از ضرب دوجمله‌ای $(a^2 - ab + b^2)$ در سه‌جمله‌ای $(a+b)$ تشکیل می‌شود که حاصل آن برابر است با $a^3 + b^3$. اتحاد تفاضل مکعب دوجمله‌ای هم از ضرب دوجمله‌ای $(a-b)$ در سه‌جمله‌ای $(a^2 + ab + b^2)$ تشکیل شده و جواب آن برابر است با $a^3 - b^3$. بنابراین:

$$(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3 , (a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

$$(1) : \text{مثال} (۱) (x+2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 2^3 = x^3 + 8$$

$$(2) : \text{مثال} (۲) (3x-1)(9x^2 + 3x + 1) = (3x)^3 - 1^3 = 27x^3 - 1$$

$$(3) : \text{مثال} (۳) (\sqrt[۳]{x} + \sqrt[۳]{y})(\sqrt[۳]{x^2} - \sqrt[۳]{xy} + \sqrt[۳]{y^2}) = (\sqrt[۳]{x})^3 + (\sqrt[۳]{y})^3 = x + y$$

درست‌نامه ۱

۹

حاصل عبارت $(x^3 + 4xy + 16y^3) + 63y^3$ را به ازای $x = \frac{1}{3}$ و $y = \sqrt[3]{3}$ بدست آورید.

$$(a - b)(a^3 + ab + b^3) = a^3 - b^3$$

$$\Rightarrow (x - 4y)(x^3 + 4xy + 16y^3) = x^3 - (4y)^3 = x^3 - 64y^3$$

$$x^3 - 64y^3 + 63y^3 = x^3 - y^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 - (\sqrt[3]{3})^3 = \frac{1}{27} - 3 = \frac{1 - 81}{27} = \frac{-80}{27}$$

عبارت مطلوب

پاسخ:

نکات مهم در مورد مثلث خیام

نکته

به الگوی زیر دقت کنید:

$$1 = 2^0 : \text{ سطر اول مثلث خیام}$$

$$1+1 = 2^1 : \text{ مجموع اعداد سطر دوم مثلث خیام}$$

$$1+2+1 = 2^2 : \text{ مجموع اعداد سطر سوم مثلث خیام}$$

$$1+3+1 = 2^3 : \text{ مجموع اعداد سطر چهارم مثلث خیام}$$

طبق روندی که در بالا مشاهده می‌کنیم، می‌توانیم حدس بزنیم که مجموع اعداد سطر n ام مثلث خیام برابر است با 2^{n-1} که n عددی طبیعی است.

۹

به کمک الگوی زیر، مجموع اعداد سطر ششم مثلث خیام را حدس بزنید. سپس مقدار واقعی این مجموع را به کمک مثلث خیام

به دست آورید. آیا حدس شما درست بوده است؟

$$1 = 2^0 : \text{ سطر اول مثلث خیام}$$

$$1+1 = 2^1 : \text{ سطر دوم مثلث خیام}$$

$$1+2+1 = 2^2 : \text{ سطر سوم مثلث خیام}$$

$$1+3+3+1 = 2^3 : \text{ سطر چهارم مثلث خیام}$$

پاسخ: طبق الگویی که کمی قبل با هم بررسی کردیم حاصل جمع اعداد سطر ششم مثلث خیام برابر است با:

البته این جواب، حدسی است. حال جواب واقعی حاصل جمع را محاسبه می‌کنیم:

$$1+5+10+10+5+1 = 32 : \text{ مجموع اعداد سطر ششم مثلث خیام}$$

مالحظه می‌کنید که مقدار حدسی با مقدار واقعی برابر است.

نکته

به الگوی زیر که مربوط به توان‌های مختلف عدد ۱۱ است دقت کنید:

$$11^0 = 1 \rightarrow \text{عدد سطر اول مثلث خیام}$$

$$11^1 = 11 \rightarrow \text{اعداد سطر دوم مثلث خیام}$$

$$11^2 = 121 \rightarrow \text{اعداد سطر سوم مثلث خیام}$$

$$11^3 = 1331 \rightarrow \text{اعداد سطر چهارم مثلث خیام}$$

طبق الگوی بالا می‌توان نتیجه گرفت که حاصل 11^n برابر است با اعداد سطر $(n+1)$ ام مثلث خیام (البته دقت کنید که اگر n برابر ۰ یا ۲ یا ۴ باشد، حاصل 11^n برابر با اعداد سطر $(n+1)$ ام مثلث خیام است. یعنی برای n های بزرگ‌تر از ۴ رابطه ذکر شده صحیح نیست).

۹

به کمک الگوی بالا حاصل 11^4 و 11^5 را حدس زده، سپس مقدار واقعی آن‌ها را نیز حساب کنید. آیا حدس شما درست بوده است؟

پاسخ: جواب‌های حدسی برای 11^4 و 11^5 طبق الگوی بالا عبارتند از:

$$11^4 = 151051 \quad , \quad \text{اعداد سطر پنجم مثلث خیام} = 14641$$

مقدار واقعی 11^4 برابر با ۱۴۶۴۱ و مقدار واقعی 11^5 برابر با ۱۶۱۰۵۱ است. پس مقداری که برای 11^4 حدس زدیم درست و مقدار حدسی برای

11^5 نادرست بوده است.

(مشابه کار در کلاس صفحه ۱۰ کتاب درسی)

$$(2a - 1)^3 = \dots - 4a + \dots \quad \text{ب}$$

$$(\sqrt{5} + \dots)(\sqrt{5} - \dots) = \dots - 2 = \dots \quad \text{ت}$$

با استفاده از اتحادها، تساوی‌های زیر را کامل کنید.

$$(a + 6)^3 = a^3 + \dots + \dots \quad \text{آ}$$

$$(\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} b)^3 = 3 + \dots + \dots \quad \text{پ}$$

$$(5x + 1)(5x + 6) = \dots + (1+6)(5x) + \dots \quad \text{ث}$$

(مشابه تمرين ۱۴ صفحه ۱۶ کتاب درسی)

$$\begin{aligned} & \text{ب) } (3x + 4)(9x^3 - 12x + 16) \\ & \text{ت) } \left(\frac{x}{2} - \frac{y}{5}\right)\left(\frac{x^2}{4} + \frac{xy}{10} + \frac{y^2}{25}\right) \end{aligned}$$

حاصل عبارت‌های زیر را به کمک اتحادها به دست آورید.

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) \quad \text{آ}$$

$$(2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2) \quad \text{پ}$$

(مشابه کار در کلاس صفحه ۱۳ کتاب درسی)

$$\begin{aligned} & \text{ب) } (\frac{1}{2}a - b)^3 = \frac{1}{8}a^3 - \dots + \frac{3}{2}ab^2 - \dots \\ & (\dots - 2y)(9x^3 + 6xy + 4y^2) = 27x^3 - \dots \quad \text{ت) } (\dots + \dots)^3 = 8x^3 + \dots + \dots + 125y^3 \end{aligned}$$

$$(\sqrt{2}x + \sqrt{3}y)(2x^2 - \dots + \dots) = \sqrt{8}x^3 + \sqrt{27}y^3 \quad \text{ث) }$$

حاصل عبارت $(4x^2 + 6x + 9)(2x - 3)$ را به ازای $x = \sqrt[3]{-5}$ به دست آورید.

(کار در کلاس صفحه ۱۱ کتاب درسی)


$$\text{ت) } (10/2)^3 \quad \text{ب) } 10^3 \quad \text{آ) } (999)^3$$

حاصل عبارات زیر را به کمک اتحادها به دست آورید.

$$\begin{aligned} & \text{ب) } (500/01)^3 - (499/99)^3 \quad \text{آ) } (\frac{\sqrt{7}}{2} - \frac{\sqrt{5}}{3})(\frac{\sqrt{7}}{2} + \frac{\sqrt{5}}{3}) \\ & (x - 3)(x + 3)(x^2 + 9x^2 + 81) \quad \text{پ) } (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - (x - 2)(x^2 + 2x + 4) \end{aligned}$$

ضریب عددی $y^2 x^7$ در حاصل عبارت $(xy^2 - 5x^3)^3$ را تعیین کنید.

$$\text{حاصل عبارت } (1 + 1)(\sqrt{x} + 1) = (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1) \quad \text{به ازای } x = \sqrt{3} \quad \text{چقدر است؟}$$

مربع مقابله را که اندازهٔ ضلع آن a است در نظر بگیرید و فرض کنید مساحت آن برابر با S باشد.ضلع‌های آن را به دو پاره خط تقسیم می‌کنیم و طول یکی را b در نظر می‌گیریم:(تمرين ۵ صفحه ۱۵ کتاب درسی) آ) مساحت‌های S_1, S_2, S_3 و S_4 را به دست آورید.ب) مساحت S را بر حسب مساحت‌های S_1, S_2, S_3 و S_4 به دست آورید.

پ) اتحاد مربع دو جمله‌ای را از قسمت (ب) نتیجه بگیرید.

۱۰. حاصل عبارت $(1 + 1)(\sqrt{6}x - 2)^3 + (\sqrt{6}x + 2)^3$ را به ساده‌ترین شکل ممکن، بنویسید.

۱۱. با توجه به الگوی زیر، حاصل جمع اعداد سطر بیست و یکم در مثلث خیام به صورت حدسی کدام است؟

۱ = ۲^۰ : سطر اول۱ + ۱ = ۲^۱ : سطر دوم۱ + ۲ + ۱ = ۲^۲ : سطر سوم۱ + ۳ + ۳ + ۱ = ۲^۳ : سطر چهارم۱۱^۰ = ۱ ، ۱۱^۱ = ۱۱ ، ۱۱^۲ = ۱۲۱ ، ۱۱^۳ = ۱۳۳۱۱۱^۶ و ۱۱^۷ را فقط حدس بزنید. (بدون محاسبه)

آیا حدسی که زده‌اید درست است؟

۱۲. با توجه به الگوی مقابله، حاصل 11^6 و 11^7 را فقط حدس بزنید. (بدون محاسبه)۱۳. به کمک مثلث خیام حاصل عبارت‌های $(x + 5y)^5$ و $\frac{3}{x} - \sqrt{6}$ را به دست آورید. (نیازی به ساده کردن جواب‌ها نیست.)۱۴. اگر $a^2 + b^2 = 857$ و $(a - b)^3 = 625$ باشند، مقدار ab را به دست آورید.

پاسخهای تشریحی

$$\text{عبارت} = (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9) = (2x)^3 - 3^3 = 8x^3 - 27 \quad \text{۴}$$

$$x = \sqrt[3]{-5} \rightarrow \text{جواب نهایی} = 8(\sqrt[3]{-5})^3 - 27 = 8 \times (-5) - 27 = -67$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3ab + b^3 \quad \text{۵}$$

$$\Rightarrow (999)^3 = (1000 - 1)^3 = (1000)^3 - 3(1000)(1) + 1^3$$

$$= 1,000,000 - 3000 + 1 = 998,001$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2 \quad \text{۶}$$

$$97 \times 103 = (100 - 3)(100 + 3) = (100)^2 - 3^2 = 10000 - 9 = 9991$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3ab + b^3 \quad \text{۷}$$

$$\Rightarrow 103^3 = (100 + 3)^3 = (100)^3 + 3(100)(3) + 3^3$$

$$= 10000 + 600 + 9 = 10609$$

$$(10/2)^3 = (10 + 0/2)^3 = 10^3 + 3(10)(0/2) + (0/2)^3 \quad \text{۸}$$

$$= 100 + 4 + 0/04 = 104/04$$

$$\underbrace{\left(\frac{\sqrt{v}}{2} - \frac{\sqrt{d}}{3}\right)\left(\frac{\sqrt{v}}{2} + \frac{\sqrt{d}}{3}\right)}_{\text{اتحاد مزدوج}} = \left(\frac{\sqrt{v}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{d}}{3}\right)^2 \quad \text{۹}$$

$$= \frac{v}{4} - \frac{d}{9} = \frac{43}{36} \quad \text{۱۰}$$

$$\underbrace{(500/01)^3 - (499/99)^3}_{\text{اتحاد مزدوج}} \quad \text{۱۱}$$

$$= \underbrace{(500/01 - 499/99)}_{0/02} \underbrace{(500/01 + 499/99)}_{1000} = 0/02 \times 1000 = 20$$

$$\underbrace{(x+2)(x^2 - 2x + 4)}_{\text{اتحاد چاق و لاغر}} = x^3 + 4 = x^3 + 4 \quad \text{۱۲}$$

$$\underbrace{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}_{\text{اتحاد چاق و لاغر}} = x^3 - 8 = x^3 - 8 \quad \text{۱۳}$$

$$\Rightarrow \text{جواب کلی} = x^3 + 4 - x^3 + 4 = 16 \quad \text{۱۴}$$

$$\underbrace{(x-3)(x+3)(x^4 + 9x^2 + 81)}_{\text{اتحاد مزدوج}} \quad \text{۱۵}$$

$$= \underbrace{(x^2 - 9)(x^2 + 9x^2 + 81)}_{\text{اتحاد چاق و لاغر}} = (x^2)^3 - 9^3 = x^6 - 729 \quad \text{۱۶}$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \Rightarrow (xy)^3 - (ax)^3 \quad \text{۱۷}$$

$$= (xy)^3 - 3(xy)^2(ax) + 3(xy^2)(ax) - (ax)^3 \quad \text{۱۸}$$

$$= x^3y^3 - 15ax^4y^2 + 45ax^2y^4 - 125x^6 \Rightarrow x^3y^3 - 125x^6 = 75 \quad \text{۱۹}$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3ab + b^3 \quad \text{۱}$$

$$\Rightarrow (a + 8)^3 = a^3 + 3(a)(8) + 8^3 = a^3 + 12a + 56 \quad \text{۲}$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3ab + b^3 \quad \text{۳}$$

$$\Rightarrow (2a - 1)^3 = (2a)^3 - 3(2a)(1) + 1^3 = 8a^3 - 6a + 1 \quad \text{۴}$$

$$(\sqrt{v} + \frac{1}{\sqrt{v}}b)^3 = (\sqrt{v})^3 + 3(\sqrt{v})(\frac{1}{\sqrt{v}}b) + (\frac{1}{\sqrt{v}}b)^3 \\ = v + 3b + \frac{b^3}{v} \quad \text{۵}$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad \text{۶}$$

$$\Rightarrow (\sqrt{d} + \sqrt{r})(\sqrt{d} - \sqrt{r}) = (\sqrt{d})^2 - (\sqrt{r})^2 = d - r = 3 \quad \text{۷}$$

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab \quad \text{۸}$$

$$(\Delta x + 1)(\Delta x + 6) = (\Delta x)^2 + (1 + 6)(\Delta x) + 1 \times 6 = 2\Delta x^2 + 3\Delta x + 6 \quad \text{۹}$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3 \quad \text{۱۰}$$

$$\Rightarrow (x - 1)(x^2 + x + 1) = x^3 - 1^3 = x^3 - 1 \quad \text{۱۱}$$

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3 \quad \text{۱۲}$$

$$\Rightarrow (3x + 4)(9x^2 - 12x + 16) = (3x)^3 + (4)^3 = 27x^3 + 64 \quad \text{۱۳}$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3 \quad \text{۱۴}$$

$$\Rightarrow (2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2) = (2x)^3 - y^3 = 8x^3 - y^3 \quad \text{۱۵}$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3 \quad \text{۱۶}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{2} - \frac{y}{5}\right)\left(\frac{x^2}{4} + \frac{xy}{10} + \frac{y^2}{25}\right) = \left(\frac{x}{2}\right)^3 - \left(\frac{y}{5}\right)^3 = \frac{x^3}{8} - \frac{y^3}{125} \quad \text{۱۷}$$

$$(4a + 1)^3 = (4a)^3 + 3(4a)(1) + 3(4a)(1)^2 + 1^3 \quad \text{۱۸}$$

$$= 64a^3 + 48a^2 + 12a + 1 \quad \text{۱۹}$$

$$\left(\frac{1}{3}a - b\right)^3 = \left(\frac{1}{3}a\right)^3 - 3\left(\frac{1}{3}a\right)^2(b) + 3\left(\frac{1}{3}a\right)(b)^2 - b^3 \quad \text{۲۰}$$

$$= \frac{1}{27}a^3 - \frac{3}{9}a^2b + \frac{3}{9}ab^2 - b^3 \quad \text{۲۱}$$

$$(2x + 5y)^3 = (2x)^3 + 3(2x)^2(5y) + 3(2x)(5y)^2 + (5y)^3 \quad \text{۲۲}$$

$$= 8x^3 + 60x^2y + 150xy^2 + 125y^3 \quad \text{۲۳}$$

$$(27x^3)^{1/3} = 27x \quad \text{از ۲۷x^3 که در سمت راست داده شده، می‌فهمیم که a برابر}$$

$$27x^3 = (3x)^3 \quad \text{است، زیرا: b = 3x \text{ و } a = 2x}$$

$$\Rightarrow (3x - 2y)(9x^2 + 6xy + 4y^2) = 27x^3 - (2y)^3 = 27x^3 - 8y^3 = 27x^3 - 8y^3 \quad \text{۲۴}$$

$$(\sqrt{2}x + \sqrt{2}y)(2x^2 - \sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2) = \sqrt{2}x^3 + \sqrt{2}y^3 \quad \text{۲۵}$$

$$= ab = (\sqrt{2}x)(\sqrt{2}y) = \sqrt{2}xy \Rightarrow b^3 = (\sqrt{2}y)^3 = 2y^3 \quad \text{۲۶}$$

حال مثلث خیام را رسم کرده تا به سطرهای هفتم و هشتم آن بررسیم:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & 1 & & & \\
 & & 1 & 1 & & & \\
 & 1 & 2 & 1 & & & \\
 1 & 3 & 3 & 1 & & & \\
 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \\
 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \\
 & 7 & 21 & 35 & 35 & 21 & 7 & 1 \\
 \text{سطر هفتم} & & & & & & \\
 \text{سطر هشتم} & & & & & & \\
 \end{array}$$

$$11^6 = 1615201561 \quad (\text{مقدار حدسی})$$

$$11^7 = 172135352171 \quad (\text{مقدار حدسی})$$

خیر، زیرا گفتیم که در این‌گونه سؤالات، فقط حدس‌هایی که برای جواب‌های $11^1, 11^2, 11^3, 11^4$ و 11^5 می‌زنیم با مقدار واقعی، مطابقت دارند و جواب‌های حدسی برای $11^6, 11^7, 11^8$ و ... همگی نادرست هستند.

طبق مطالب گفته شده در درسنامه خواهیم داشت:

$$\begin{aligned}
 (a+b)^4 &= 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4 \Rightarrow (x+ay)^4 \\
 &= 1(x)^4 + 4(x)^3(ay) + 6(x)^2(ay)^2 + 4(x)(ay)^3 + (ay)^4 \\
 (a+b)^5 &= 1a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + 1b^5 \\
 &\quad \text{ها را به } -b \text{ تبدیل می‌کنیم:} \\
 (a-b)^5 &= 1a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - 1b^5 \\
 \Rightarrow (\sqrt{x} - \frac{3}{x})^5 &= 1(\sqrt{x})^5 - 5(\sqrt{x})^4(\frac{3}{x}) + 10(\sqrt{x})^3(\frac{3}{x})^2 \\
 &\quad - 10(\sqrt{x})^2(\frac{3}{x}) + 5(\sqrt{x})(\frac{3}{x}) - 1(\frac{3}{x})^5
 \end{aligned}$$

۱۴

$$(a-b)^3 = a^3 + b^3 - 2ab \Rightarrow 625 = 857 - 2ab$$

$$\Rightarrow 2ab = 857 - 625 \Rightarrow 2ab = 232 \Rightarrow ab = \frac{232}{2} = 116$$

$$A = \underbrace{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}_{\text{اتحاد مزدوج}}(x + 1)$$

$$= (\sqrt{x}^2 - 1^2)(x + 1) = \underbrace{(x - 1)(x + 1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} = x^2 - 1$$

$$\xrightarrow{x=\sqrt{3}} = (\sqrt{3})^2 - 1 = 3 - 1 = 2 \quad (\text{جواب نهایی})$$

$$S_1 = (a - b)(a - b) = (a - b)^2$$

$$S_2 = (a - b)b = ab - b^2$$

$$S_3 = b \times b = b^2$$

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$$

$$\Rightarrow a^2 = (a - b)^2 + \underbrace{ab - b^2}_{\text{به چپ می‌بریم}} + \underbrace{ab - b^2}_{\text{به چپ می‌بریم}}$$

$$\Rightarrow a^2 - ab + b^2 - ab = (a - b)^2 \Rightarrow (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

اتحاد مکعب تفاضل دوجمله‌ای:

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$\Rightarrow (x - \frac{3}{x})^3 = x^3 - 3x^2(\frac{3}{x}) + 3(x)(\frac{3}{x})^2 - \frac{3}{x}^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2 \quad (\text{اتحاد مزدوج})$$

$$\Rightarrow (\underbrace{\sqrt{x} - 1}_{\text{a}})(\underbrace{\sqrt{x} + 1}_{\text{b}}) = (\sqrt{x})^2 - 1^2 = 6x^2 - 1$$

$$x^3 - 6x^2 + 12x - 8 + 6x^2 - 1 = x^3 + 12x - 9 \quad (\text{کل عبارت})$$

در درسنامه گفتیم که اگر n عددی طبیعی باشد، آن‌گاه مجموع

اعداد سطر n ام مثلث خیام به صورت حدسی برابر با $\binom{n+1}{2}$ است، لذا:

$$\binom{n+1}{2} = 2^{n-1}$$

از الگوی داده شده نتیجه می‌گیریم که اگر n عددی حسابی باشد

: آن‌گاه: $(0, 1, 2, \dots)$

$$11^n = n+1 \quad (\text{اعداد سطر } (n+1) \text{ ام مثلث خیام})$$

$$11^6 = 857 \quad (\text{اعداد سطر هفتم مثلث خیام})$$

$$11^7 = 1615201561 \quad (\text{اعداد سطر هشتم مثلث خیام})$$

درسنامه ۲

تجزیه عبارت‌های جبری

مفهوم تجزیه: منظور از تجزیه یک عبارت جبری این است که آن عبارت را به حاصل ضرب دو یا چند عبارت دیگر با درجه کمتر تبدیل کنیم. این کار را به کمک فاکتورگیری، اتحادها و ... انجام می‌دهیم. به هر یک از جملات حاصل از تجزیه، یک عامل یا مقسوم‌علیه عبارت اصلی می‌گوییم. مثلاً وقتی می‌نویسیم $(x - 5)(x - 5) = x^2 - 10x + 25$ به $x - 5$ عوامل (مقسوم‌علیه‌های) $x^2 - 10x + 25$ هم بر $x - 5$ بخش‌پذیر است. به کمک روش‌های زیر، عبارت‌های جبری را تجزیه می‌کنیم:

روش فاکتورگیری

اگر دو یا چند جمله که بین آن‌ها علامت جمع یا تفریق وجود دارد دارای عامل مشترکی باشند، آن عامل را از دل آن جملات بیرون می‌کشیم. به مثال‌های زیر دقت کنید:

$$(1) \quad 4ab^5 - 18a^3b = 2ab(2b^4 - 9a)$$

عامل مشترک

$\frac{4ab^5}{2ab} = 2b^4$

$\frac{18a^3b}{2ab} = 9a$

$$(2) \quad (x - 6y)^3 - 7(x - 6y) = (x - 6y)[(x - 6y) - 7]$$

عامل مشترک

$$(3) \quad 12x^4(x^3 - 5)^3 + 3x^3(x^3 - 5)^3 = 3x^3(x^3 - 5)^3[4x + (x^3 - 5)]$$

عامل مشترک

تجزیه به کمک اتحاد مزدوج

اگر بین دو جمله (که معمولاً مربع کامل هستند) علامت منفی وجود داشته باشد، از رابطه $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ برای تجزیه عبارت استفاده می‌کنیم:

$$(1) \quad x^2 - 100 = (x - 10)(x + 10)$$

جذر

جذر

$x - 10$

$$(2) \quad 25x^2 - 3 = (5x - \sqrt{3})(5x + \sqrt{3})$$

جذر

جذر

$5x - \sqrt{3}$

$$(3) \quad (x - 3)^2 - 64 = [(x - 3) - 8][(x - 3) + 8] = (x - 11)(x + 5)$$

جذر

جذر

$x - 3 \quad 8$

عبارت $x^4 - 81x$ به کدام عبارت زیر بخش‌پذیر نیست؟

(آ) $x^3 + 9$

(ب) $x^3 - 9$

(ت) $x^3 - 3$

$$x^4 - 81x = x(x^3 - 8) = x(x^2 - 9)(x^2 + 9) = x(x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)$$

اتحاد مزدوج

فاکتور از x

پاسخ:

پس از بین عبارت‌های داده شده، جواب مورد نظر، عبارت $(x^2 - 9)(x^2 + 9)$ است، چون در عوامل تجزیه $x^4 - 81x$ عامل $(x^2 - 9)$ مشاهده نمی‌شود.

تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک

از این اتحاد وقتی استفاده می‌کنیم که ۳ جمله داشته باشیم و حداقل یکی از آن‌ها مربع کامل باشد. این اتحاد به صورت زیر است:

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$\frac{(a + b)x + ab}{(a + b)} = (a + b) + (x + a)(x + b)$$

درستنامه ۲

به عنوان مثال می‌خواهیم $(x^2 - 3x + 2)$ را تجزیه کنیم. جمله مشترک x است چون دو بار تکرار شده، حال به دنبال دو عدد a و b می‌گردیم به طوری که ضربشان 3 و جمع یا تفریقشان 2 شود (فعلاً به علامت‌ها فکر نکنید)، دو عدد موردنظر عبارتند از 7 و 5 چون ضربشان 3 و تفریقشان 2 می‌شود:

$$x^2 + 2x - 3 = (x + 7)(x - 5)$$

جمله مشترک

تذکر: همیشه حواس‌تان باشد که عدد بزرگ‌تر را در پرانتز اول قرار دهید.

$$(1) \quad x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 5x^2 + 4) = (x^2 - 4)(x^2 - 1) \quad \text{هر پرانتز، خودش اتحاد مزدوج است.}$$

جمله مشترک x^2 است، چون دو بار تکرار شده

$$(2) \quad x^3 - 10x^2 + 24x = x(x^2 - 10x + 24) = x(x - 6)(x - 4)$$

فاکتور از x اتحاد جمله مشترک

نکته

گاهی اوقات یک سه‌جمله‌ای به ما داده می‌شود که در آن ضربی x^2 عددی مربع کامل است (به جز ۱)، در این موارد برای تجزیه این سه‌جمله‌ای، کافی است از جمله شامل x^2 جذر گرفته تا جمله مشترک معلوم شود، سپس این جمله مشترک را از درون جمله دیگر که شامل x است بیرون می‌کشیم. به عنوان مثال می‌خواهیم عبارت $x^2 + 18x + 8$ را تجزیه کنیم ۹ مربع کامل است، حال می‌گوییم جذر $9x^2$ می‌شود $3x$ ، پس $3x$ جمله مشترک است و باید $18x$ را نیز طوری بنویسیم که شامل x^2 شود، یعنی $(3x)^2 = 9x^2$ را باید $18x$ به کمک اتحاد جمله مشترک خواهیم داشت:

$$9x^2 + 18x + 8 = (3x)^2 + 6(3x) + 8 = (3x + 4)(3x + 2)$$

عبارت $x^2 + 30x^2 + 25x^2$ را تجزیه کنید.

پاسخ: ضربی x^2 یعنی 25 مربع کامل است پس $25x^2$ را به صورت $(5x)^2$ می‌نویسیم، پس می‌فهمیم $5x$ باید جمله مشترک باشد، لذا x^2 را به صورت $(5x)^2$ می‌نویسیم تا $5x$ را ۲ بار تکرار کرده باشیم:
 $25x^2 + 30x - 7 = (5x)^2 + 6(5x) - 7 = (5x + 7)(5x - 1)$

ملاحظه می‌کنید که ضرب $+7$ و -1 می‌شود -7 و جمع $+7$ و -1 می‌شود 6

۹

تجزیه به کمک اتحادهای مربع دوجمله‌ای

<...>

اگر سه‌جمله‌ای ما به شکل $a^2 + 2ab + b^2$ بود، تجزیه شده‌اش برابر با $(a + b)^2$ است و اگر به شکل $a^2 - 2ab + b^2$ بود، تجزیه شده‌اش به صورت $(a - b)^2$ خواهد بود. به عبارت دیگر اگر سه‌جمله داشتیم که دو تای آن‌ها مربع کامل بودند و سومی، ۲ برابر ضرب جذرهاست دو جمله مربع کامل بود از اتحادهای مربع دوجمله‌ای استفاده می‌کنیم. البته گاهی اوقات فقط یکی از جملات مربع کامل است (مثال ۳).

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$(1) \quad x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$$

جذر
جذر
 x 5

$$= 2 \times x \times 5 = 10x \quad (= \text{جذر آخری}) \quad (= \text{جذر اولی})$$

$$(2) \quad 4t^2 + 4\sqrt{3}tz + 3z^2 = (2t + \sqrt{3}z)^2$$

جذر
جذر
 $2t$ $\sqrt{3}z$

$$= 2(\sqrt{3}z)(2t) = 4\sqrt{3}tz \quad (= \text{جذر آخری}) \quad (= \text{جذر اولی})$$

$$(3) \quad x^2 - 2\sqrt{5}x + 5 = (x - \sqrt{5})^2$$

جذر
جذر
 x $\sqrt{5}$

$$= 2(x)\sqrt{5} = 2\sqrt{5}x \quad (= \text{جذر آخری}) \quad (= \text{جذر اولی})$$

درستنامه ۲

پاسخ: ۹

عبارت $x^2 + x^4 - 6x^3 - 9x^4$ پس از تجزیه به شکل $x^k(mx-n)^f$ تبدیل شده است، مقادیر m, n, f و k را بدست آورید.

$$\frac{9x^4 - 6x^3 + x^2}{x^2} = x^2(9x^2 - 6x + 1) = x^2(3x-1)^2 = x^k(mx-n)^f \Rightarrow k=2, m=3, n=1, f=2$$

اتحاد مربع دو جمله‌ای

فاکتور از x^2

دو طرف را مقایسه می‌کنیم.

محاسبه ک.م.م عبارت‌های جبری

برای این منظور ابتدا عبارت‌ها را تا حد امکان تجزیه می‌کنیم. ک.م.م آن‌ها عبارت است از حاصل ضرب عامل‌های مشترک با توان بیشتر در عامل‌های غیرمشترک. به عنوان مثال می‌خواهیم ک.م.م عبارت‌های $x^3 - 3x^2 - 2x^3 + 8x^2 + 15x$ و $x^4 + 2x^3 - 3x^2$ را بدست آوریم:

$$\left. \begin{array}{l} x^4 + 2x^3 - 3x^2 = x^2(x^2 + 2x - 3) = x^2(x+3)(x-1) \\ \text{اتحاد جمله مشترک} \\ x^3 + 8x^2 + 15x = x(x^2 + 8x + 15) = x(x+5)(x+3) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{ک.م.م} = x^2(x+3)(x-1)(x+5) \\ \text{عوامل مشترک} \\ \text{با توان بزرگ‌تر} \\ \text{غیرمشترک} \end{array}$$

ک.م.م دو عبارت $x^3 + 10x^2 - 7x^3 - 20x^4$ و $x^4 - 25$ را بدست آورید.

پاسخ: همان‌طور که گفتیم ابتدا دو عبارت را تا حد امکان تجزیه می‌کنیم، سپس عوامل مشترک با توان بزرگ‌تر را در عوامل غیرمشترک ضرب می‌کنیم.

$$x^4 - 7x^3 + 10x^2 = x^2(x^2 - 7x + 10) = x^2(x-5)(x-2)$$

$$20x^4(x^2 - 25) = 20x^4(x-5)(x+5)$$

$$\Rightarrow \text{ک.م.م} = 20x^4(x-5)(x+5)(x-2)$$

(مسئله کار در کلاس صفحه ۱۰ و ۱۱ کتاب(درسی))

۱۵. عبارت‌های زیر را تا حد امکان تجزیه کنید.

ب) $x^2 + \frac{2}{5}x + \frac{1}{25}$ (آ) $25x^2 - 36$

ت) $y^2 + 4y - 21$ (پ) $4x^2 - 4x + 1$

ج) $20x^5(x^2 + 3)^3 - 10x^3(x^2 + 3)^4$ (ث) $x^6 - 64x^4$

(ج) $25x^2 + 25x + 6$

(تمرین ۳ صفحه ۱۶ کتاب(درسی))

۱۶. به کمک اتحادها، عبارت‌های زیر را تجزیه کنید.

ب) $x^6 - 1$ (آ) $1 + z^3$

ت) $9x^2 - 12x + 4$ (پ) $27 - t^6$

(ث) $4x^2 + 14x + 12$

۱۷. عبارت‌های زیر را تا حد امکان تجزیه کنید.

ب) $25x^4 + 30x^3 + 9x^2$ (آ) $4x^2 - 4x - 24$

(پ) $bx^2 - 5bx - 50b$

۱۸. کوچک‌ترین مضرب مشترک عبارت‌های زیر را بدست آورید.

ب) $a^3 - b^3$ ، $a^4 - b^4$ (آ) $x^3 - x^2 - 6x$ ، $x^6 - 81x^2$

۱۹. به کمک تجزیه، حاصل عبارت $(48/8)^2 - (51/2)^2$ را بدست آورید.

۲۰. عبارت $-64x^{14} - x^{10}$ را تجزیه کرده‌ایم. جاهای خالی را پر کنید:

$$x^{14} - 64x^{10} = x^{10}(x^4 - \dots) = x^{10}(\dots - \dots)(\dots + \dots) = x^{10}(\dots - \dots)(x + \sqrt{\lambda})(\dots + \dots)$$

.۲۱. عبارت‌های زیر را تا حد امکان تجزیه کنید.

$$(x - 4)(x + 6) + xy + 6y \quad (ب)$$

$$a^{\varepsilon} - b^{\varepsilon} \quad (ت)$$

$$(x + 4)^{\varepsilon} - (5x - 1)^{\varepsilon} \quad (\bar{ا})$$

$$\frac{1}{125} + m^{\varepsilon} \quad (پ)$$

.۲۲. اگر $2a - b = 5$ و $9a^{\varepsilon} - b^{\varepsilon} = 100$ باشد، مقادیر a و b را به دست آورید.

.۲۳. در تجزیه عبارت $(x^{\varepsilon} - 6x - 4)^{\varepsilon} - 144$ کدام عامل زیر وجود ندارد؟

$$x + 8 \quad (ت)$$

$$x - 4 \quad (پ)$$

$$x - 8 \quad (ب)$$

$$x - 2 \quad (\bar{ا})$$

.۲۴. در تجزیه شده عبارت‌های $x^{\varepsilon} + 8x^{\varepsilon} + 8x - 2x - 2x^{\varepsilon} - 2x^{\varepsilon} - 8x^{\varepsilon} + 6x^{\varepsilon} + 6x^{\varepsilon}$ چه عامل مشترک وجود دارد؟ ک.م.م. این دو عبارت را نیز به دست آورید.

.۲۵. کوچک‌ترین مضرب مشترک (ک.م.م.) عبارت‌های $-3 - 3x^{\varepsilon} + 2x^{\varepsilon}$ و $(-1 - x^{\varepsilon})$ را به دست آورید.

.۲۶. عبارت‌های زیر را تا حد امکان تجزیه کنید:

$$x^{\varepsilon} - 3x^{\varepsilon} + 3x - 1 \quad (ت)$$

$$x^{\varepsilon} - x + (x - 1)(y + 1) \quad (پ)$$

$$x^{\varepsilon} + 3x^{\varepsilon} - x - 3 \quad (ب)$$

$$2x^{\varepsilon} + 2x^{\varepsilon} - 4x \quad (\bar{ا})$$

پاسخ‌های تشریحی

$$\begin{aligned} 27 - t^{\varepsilon} &= 3^{\varepsilon} - (t^{\varepsilon})^{\varepsilon} = (3 - t^{\varepsilon})(9 + 3t^{\varepsilon} + t^{\varepsilon}) \\ &= (\sqrt{3} - t)(\sqrt{3} + t)(9 + 3t^{\varepsilon} + t^{\varepsilon}) \\ a^{\varepsilon} - 2ab + b^{\varepsilon} &= (a - b)^{\varepsilon} \quad (ت) \\ &\Rightarrow 9x^{\varepsilon} - 12x + 4 = (3x - 2)^{\varepsilon} \quad (جذر اولی) \\ &\qquad \text{جذر} \quad \text{جذر} \\ &\qquad 3x \quad 2 \\ 4x^{\varepsilon} + 14x + 12 &= \underbrace{(2x)^{\varepsilon} + 7(2x)}_{\text{اتحاد جمله مشترک}} + 12 = (2x + 4)(2x + 3) \quad (ش) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4x^{\varepsilon} - 4x - 24 &= 4(x^{\varepsilon} - x - 6) = 4(x - 3)(x + 2) \quad (آ) \quad 17 \\ &\qquad \text{فاکتور از} \quad \text{اتحاد جمله مشترک} \\ &\qquad 4 \quad 2 \\ &\qquad (جذر اولی) \quad 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25x^{\varepsilon} + 30x^{\varepsilon} + 9x^{\varepsilon} &= x^{\varepsilon}(25x^{\varepsilon} + 30x + 9) = x^{\varepsilon}(5x + 3)^{\varepsilon} \quad (ب) \\ &\qquad \text{جذر} \quad \text{جذر} \\ &\qquad 5x \quad 3 \\ bx^{\varepsilon} - 5bx - 5b &= b(x^{\varepsilon} - 5x - 5) = b(x - 10)(x + 5) \quad (پ) \\ &\qquad \text{اتحاد جمله مشترک} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^{\varepsilon} - 8x^{\varepsilon} &= x^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} - 8) \quad (آ) \quad 18 \\ &\qquad \text{فاکتور از} \quad \text{اتحاد مزدوج} \\ &\qquad x \quad 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= x^{\varepsilon}(\underbrace{x^{\varepsilon} - 9}_{\text{اتحاد مزدوج}})(x^{\varepsilon} + 9) = x^{\varepsilon}(x - 3)(x + 3)(x^{\varepsilon} + 9) \\ x^{\varepsilon} - x^{\varepsilon} - 6x &= x(\underbrace{x^{\varepsilon} - x - 6}_{\text{اتحاد جمله مشترک}}) = x(x - 2)(x + 2) \\ &\qquad \text{فاکتور از} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{ک.م.م.} = x^{\varepsilon}(x - 3)(x + 3)(x + 2)(x^{\varepsilon} + 9)$$

$$\begin{aligned} a^{\varepsilon} - b^{\varepsilon} &= (a - b)(a + b) \quad (آ) \quad 15 \\ \Rightarrow 25x^{\varepsilon} - 36 &= (5x - 6)(5x + 6) \\ &\qquad \text{جذر} \quad \text{جذر} \\ &\qquad 5x \quad 6 \\ &\qquad (جذر آخری) \quad (جذر اولی) \quad 2 = 2(x)\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5}x \\ a^{\varepsilon} + 2ab + b^{\varepsilon} &= (a + b)^{\varepsilon} \Rightarrow \underbrace{x^{\varepsilon} + \frac{2}{5}x}_{\text{جذر}} + \frac{1}{25} = \left(x + \frac{1}{5}\right)^{\varepsilon} \quad (ب) \\ &\qquad \text{جذر} \quad \text{جذر} \\ &\qquad x \quad \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^{\varepsilon} - 2ab + b^{\varepsilon} &= (a - b)^{\varepsilon} \quad (پ) \\ \Rightarrow 4x^{\varepsilon} - 4x + 1 &= (2x - 1)^{\varepsilon} \quad (جذر اولی) \quad 2 \\ &\qquad \text{جذر} \quad \text{جذر} \\ &\qquad 2x \quad 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y^{\varepsilon} + 4y - 21 &= (y + 7)(y - 3) \quad (ت) \\ &\qquad \text{اتحاد جمله مشترک} \end{aligned}$$

$$x^{\varepsilon} - 64x^{\varepsilon} = x^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} - 64) = x^{\varepsilon}(x - 8)(x + 8) \quad (ث)$$

اتحاد مزدوج

$$\begin{aligned} 20x^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} + 3)^{\varepsilon} - 10x^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} + 3)^{\varepsilon} &= 10x^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} + 3)^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} - 3) \\ &= 10x^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} + 3)^{\varepsilon}(2x^{\varepsilon} - (x^{\varepsilon} + 3)) = 10x^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} + 3)^{\varepsilon}(x^{\varepsilon} - 3) \\ 25x^{\varepsilon} + 25x + 6 &= \underbrace{(5x)^{\varepsilon} + 5(5x)}_{\text{اتحاد جمله مشترک}} + 6 = (5x + 3)(5x + 2) \quad (ق) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^{\varepsilon} + b^{\varepsilon} &= (a + b)(a^{\varepsilon} - ab + b^{\varepsilon}) \quad (آ) \quad 16 \\ \Rightarrow 1 + z^{\varepsilon} &= 1^{\varepsilon} + z^{\varepsilon} = (1 + z)(1^{\varepsilon} - 1 \times z + z^{\varepsilon}) = (1 + z)(1 - z + z^{\varepsilon}) \\ a^{\varepsilon} - b^{\varepsilon} &= (a - b)(a^{\varepsilon} + ab + b^{\varepsilon}) \quad (ب) \\ \Rightarrow x^{\varepsilon} - 1 &= (x^{\varepsilon})^{\varepsilon} - 1^{\varepsilon} = (x^{\varepsilon} - 1)(x^{\varepsilon} + x^{\varepsilon} + 1) \\ &= (x - 1)(x + 1)(x^{\varepsilon} + x^{\varepsilon} + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \underbrace{(x^3 - 6x^2 - 4)^2 - 12^2}_{\text{اتحاد مزدوج}} = (x^3 - 6x^2 - 4 - 12)(x^3 - 6x^2 - 4 + 12) \\ & = \underbrace{(x^3 - 6x^2 - 16)}_{\text{اتحاد جمله مشترک}} \underbrace{(x^3 - 6x^2 + 8)}_{\text{اتحاد جمله مشترک}} = (x - 8)(x + 2)(x - 4)(x - 2) \\ & \text{پس در تجزیه عبارت مذکور، عامل } x + 8 \text{ وجود ندارد.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \underbrace{x^3 + 6x^2 + 8x}_{\substack{\text{فاکتور از} \\ \text{اتحاد جمله مشترک}}} = x(x^2 + 6x + 8) = x(x + 4)(x + 2) \\ & x^3 - 2x^2 - 8 = (x - 4)(x + 2) \\ & \text{اتحاد جمله مشترک} \\ & \Rightarrow \begin{cases} \text{عامل مشترک} = x + 2 \\ \text{م.م.} = x(x + 2)(x + 4)(x - 4) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 3x^3 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1) \\ & \text{اتحاد مزدوج} \\ & x^3 - 3x^2 + 2 = (x - 2)(x - 1) \\ & (x - 1)^3 \text{ دیگر قابل تجزیه نیست.} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \text{م.م.} = 3(x - 1)^3 (x + 1)(x - 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 2x^3 + 2x^2 - 4x = 2x \underbrace{(x^2 + x - 2)}_{\substack{\text{اتحاد جمله مشترک}}} = 2x(x + 2)(x - 1) \quad (\text{۱}) \\ & x^4 + 3x^3 - x^2 - 3 = x^3(x + 3) - (x + 3) = (x + 3)(x^2 - 1) \quad (\text{۲}) \\ & \substack{\text{فاکتور از } x^3 \\ \text{فاکتور از منفی}} \quad \substack{\text{فاکتور از } x^2 \\ \text{اتحاد چاق و لاغر}} \\ & = (x + 3)(x - 1)(x^2 + x + 1) \\ & \underbrace{x^2 - x + (x - 1)(y + 1)}_{\substack{\text{فاکتور از } x \\ \text{فاکتور از } (x - 1)}} = \underbrace{x(x - 1) + (x - 1)(y + 1)}_{(x - 1)} \quad (\text{۳}) \\ & = (x - 1)(x + y + 1) \\ & x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 \quad (\text{۴}) \end{aligned}$$

البته تشخیص تجزیه به کمک اتحاد مکعب دو جمله‌ای کمی دشوار است ولی این تمرین خیلی مهم است حتیماً آن را حفظ کنید.

$$\begin{aligned} & a^3 - b^3 = \underbrace{(a^2 - b^2)}_{\text{اتحاد مزدوج}} (a^2 + b^2) = (a - b)(a + b)(a^2 + b^2) \quad (\text{۵}) \\ & a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \\ & \Rightarrow \text{م.م.} = (a - b)(a + b)(a^2 + b^2)(a^2 + ab + b^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & a^3 - b^3 = (a - b)(a + b) \\ & \Rightarrow (5/2)^3 - (4/2)^3 = \underbrace{(5/2 - 4/2)}_{\substack{\text{یک} \\ \text{این}}} \underbrace{(5/2 + 4/2)}_{\text{یوو}} = 240 \quad (\text{۶}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & x^4 - 64x^1 = x^1 \underbrace{(x^3 - 64)}_{\substack{\text{دواهه مزدوج} \\ \text{اتحاد مزدوج}}} = x^1 \underbrace{(x^2 - 8)}_{\substack{\text{دوباره مزدوج} \\ \text{اتحاد مزدوج}}} (x^2 + 8) \\ & = x^1 (x - \sqrt{8})(x + \sqrt{8})(x^2 + 8) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & a^3 - b^3 = (a - b)(a + b) \quad (\text{۷}) \\ & \underbrace{(x + 4)^3 - (5x - 1)^3}_{\substack{\text{این} \\ \text{این}}} = [(x + 4) - (5x - 1)][(x + 4) + (5x - 1)] \\ & = (-4x + 5)(6x + 3) = 3(-4x + 5)(2x + 1) \quad (\text{۸}) \\ & (x - 4)(x + 6) + xy + 6y = \underbrace{(x - 4)(x + 6)}_{\substack{\text{فاکتور از } y \\ \text{فاکتور از } (x + 6)}} + y(x + 6) \quad (\text{۹}) \\ & = (x + 6)(x - 4 + y) \quad (\text{۱۰}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{125} + m^3 = \underbrace{\left(\frac{1}{5}\right)^3 + m^3}_{\text{اتحاد چاق و لاغر}} = \left(\frac{1}{5} + m\right)\left(\left(\frac{1}{5}\right)^2 - \frac{1}{5} \times m + m^2\right) \\ & = \left(\frac{1}{5} + m\right)\left(\frac{1}{25} - \frac{m}{5} + m^2\right) \\ & a^3 - b^3 = \underbrace{(a^2 - b^2)^3}_{\substack{\text{اتحاد چاق و لاغر} \\ \text{اتحاد مزدوج}}} = (a^2 - b^2)((a^2)^2 + a^2b^2 + (b^2)^2) \quad (\text{۱۱}) \\ & = (a - b)(a + b)(a^2 + a^2b^2 + b^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 9a^3 - b^2 = 100 \Rightarrow \underbrace{(3a - b)}_{\text{اتحاد مزدوج}} (3a + b) = 100 \Rightarrow 3a + b = \frac{100}{5} \\ & \Rightarrow 3a + b = 20 \\ & \text{اکنون با حل یک دستگاه مقادیر } a \text{ و } b \text{ را به دست می‌آوریم:} \\ & \begin{cases} 3a - b = 5 \\ 3a + b = 20 \end{cases} \\ & 6a = 25 \Rightarrow a = \frac{25}{6} \xrightarrow{\substack{\text{در یکی از روابط} \\ \text{قرار می‌دهیم}}} b = \frac{15}{2} \end{aligned}$$